

Programi zaštite u povrtlarstvu



 **BASF**

We create chemistry



Sadržaj

Program zaštite kupusa

4

Program zaštite luka

8

Program zaštite salate

12

Program zaštite graha i graška

16

Program zaštite mrkve

20

Program zaštite rajčice

22

Program zaštite paprike

27

Program zaštite krastavca

31

Program zaštite za male namjene

32

Herbicidi

Fungicidi

Insekticidi


Ovaj tiskani materijal savjetodavnog je karaktera.
Prije korištenja pripravka obavezno pročitati uputu za uporabu.

® = registrirani zaštićeni znak tvrtke BASF.

®₁ = registrirani zaštićeni znak tvrtke Chromos Agro.



Program zaštite kupusa



PROGRAMI ZAŠTITE U POVRTLARSTVU

Program zaštite kupusa

Predstavljamo vam okviran program zaštite kupusa koji obuhvaća njegu i zaštitu od korova našim herbicidnim pripravcima **Stomp® Aqua** ili **Butisan® S**. Protiv prstenaste pjegavosti i pjegavosti kupusnjača predstavljamo fungicidni pripravak **Signum®** s **AgCelence®** efektom dok protiv

štetocina predstavljamo novost iz BASFove palete insekticida proizvoda, pripravak **Fastac® 10 EC** koji suzbija: stakleničkog štitastog moljca, lisne uši, gusjenicu sovicu pozemljuš, kupusnog buhača, kupusnog bijelca, malog kupusara i kupusnog moljca.

Stomp® Aqua

AKTIVNA TVAR: 455 g/l pendimetalin

FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

Stomp® Aqua je selektivan kontaktni i zemljišni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova i smanjenju zakoravljenosti jednogodišnjim širokolistnim korovima.

SPEKTAR DJELOVANJA:

Jednogodišnji travni korovi:

- osjetljivi korovi: obični koštan (*Echinochloa crus-galli*), zeleni muhar (*Setaria viridis*), pršlenasti muhar (*Setaria verticillata*), obična svračica (*Digitaria sanguinalis*), lisičji repak (*Alopecurus myosuroides*), jednogodišnja vlasnjakača (*Poa annua*).
- umjereno osjetljivi: divlja zob (*Avena sterilis*), ljluljevi (*Lolium spp.*).

Jednogodišnji širokolistni korovi:

- osjetljivi korovi: ispruženi ščir (*Amaranthus blitoides*), ščir (*Amaranthus retroflexus*), poljska krika (*Anagallis arvensis*), pastirska torbica (*Capsella bursa-pastoris*), bijela loboda (*Chenopodium album*), sjetveni ravan (*Chrysanthemum segetum*), ljekovita dimnjaka (*Fumaria officinalis*), broćike (*Galium spp.*), europska bradavka (*Heliotropium europaeum*), sljez (*Malva spp.*), ptičji dvornik (*Polygonum aviculare*), veliki dvornik (*Polygonum persicaria*), tušanj (*Portulaca olearacea*), divlji mak (*Papaver rhoeas*), žabnjaci (*Ranunculus spp.*), divlja rotkva (*Raphanus raphanistrum*), sikavica (*Silybum marianum*), oranž (*Sisymbrium spp.*), mišjakinja (*Stellaria media*), poljska gorušica (*Spinapis arvensis*), bijela gorušica (*Spinapis alba*), crna pomoćnica (*Solanum nigrum*), obični svinjak (*Sonchus oleraceus*), babin zub (*Tribulus terrestris*), bršljenasta čestoslavica (*Veronica hederifolia*), perzijska čestoslavica (*Veronica persica*), divlja salata (*Lactuca serriola*).

- umjereno osjetljivi: Trputci (*Plantago spp.*), kovrčava kiselica (*Rumex crispus*), obični kostriš (*Senecio vulgaris*), europski mračnjak (*Abutilon theophrasti*), prava kamilica (*Matricaria chamomilla*).

PREPORUKA ZA PRIMJENU:

Butisan® S se koristi u količini od 2,0 l/ha na lakšim do srednje teškim tipovima tala i u količini od 2,5 l/ha na srednje teškim i teškim tipovima tala. Tretirati treba 8-10 dana nakon presađivanja kupusa na dobro pripremljeno tlo na kojem su mehanički uništeni postojeći korovi.

Nakon navodnjavanja pripravak se koristi u količini od 2,0 l/ha.

KARENCA:
70 dana

POSEBNE NAPOMENE:
Koristi se ukoliko prethodno nije korišten Stomp® Aqua.

PREPORUKA ZA PRIMJENU:

Stomp® Aqua primjenjuje se prije presađivanja u količini 2,5-3 l/ha.

KARENCA: 100 dana

Butisan® S

AKTIVNA TVAR: 500 g/l metazaklor

FORMULACIJA: tekuća koncentrirana suspenzija (SC)

Butisan® S je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih travnih korova.

SPEKTAR DJELOVANJA:

Butisan® S suzbija sjemenske monokotiledonske korove - **korovske trave**:

- mišji repak (*Alopecurus myosuroides*)
- obične saloperke (*Apera spica-venti*)
- divlje zobi (*Avena fatua*)
- svračice (*Digitaria spp.*)
- koštan (*Echinochloa crus-galli*)
- jednogodišnje vlasnjake (*Poa annua*)
- muharice (*Setaria spp.*)

i širokolistne korove:

- hrapavi ščir (*Amaranthus retroflexus*)
- kamilice (*Matricaria spp.*)
- bijeli lobodu (*Chenopodium album*)
- ptičjeg i slakastog dvornika (*Polygonum aviculare* i *P.convolvulus*)
- poljsku gorušicu (*Sinapis arvensis*)
- pomoćnice (*Solanum spp.*)
- poljsku mišjakinju (*Stellaria media*)
- malu koprivu (*Urtica urens*)
- čestoslavice (*Veronica spp.*)
- jarmene (*Anthemis spp.*)

PREPORUKA ZA PRIMJENU:

Butisan® S se koristi u količini od 2,0 l/ha na lakšim do srednje teškim tipovima tala i u količini od 2,5 l/ha na srednje teškim i teškim tipovima tala. Tretirati treba 8-10 dana nakon presađivanja kupusa na dobro pripremljeno tlo na kojem su mehanički uništeni postojeći korovi.

Nakon navodnjavanja pripravak se koristi u količini od 2,0 l/ha.

KARENCA:
70 dana

POSEBNE NAPOMENE:
Koristi se ukoliko prethodno nije korišten Stomp® Aqua.

Focus® Ultra

AKTIVNA TVAR: 100 g/l cikloksidim

FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

Focus® Ultra namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih travnih korova.

SPEKTAR DJELOVANJA:

Focus® Ultra je herbicid za suzbijanje travnih korova. Uništava uskolisne korove, posebno one koji se teško suzbijaju i to u korijenu.

Visoko je učinkovit na slijedeće korovne vrste:

- muharice (*Setaria spp.*)
- obični koštan (*Echinochloa crus-galli*)
- divlji sirak iz rizoma i iz sjemena (*Sorghum halepense*)
- svračice (*Digitaria sanguinalis*)
- pirika (*Agropyrum repens*)
- zubača (*Cynodon dactylon*)


PREPORUKA ZA PRIMJENU:

Focus® Ultra ne bi trebalo prskati na temperaturama ispod 14°C i iznad 26°C. Međuredna kultivacija može se obavljati 12 dana poslije primjene pripravka Focus® Ultra. Pripravak Focus® Ultra ne treba miješati ni s jednim drugim pripravkom.

KOLIČINA PRIMJENE:

- jednogodišnji travni korovi - 1,0-1,5 l/ha
- višegodišnji uskolisni korovi - 3,0-4,0 l/ha

KARENCA: 28 dana





Signum®

AKTIVNA TVAR: 267 g/kg boskalid i 67 g/kg piraklostrobina

FORMULACIJA: vodotopive granule (WG)

Signum® je kombinirani sistemični preventivni fungicid vrlo širokog spektra djelovanja. Kombinacija novih aktivnih tvari osigurava visok stupanj zaštite i dugotrajan učinak. **Signum®** je više od obične zaštite bilja! **Signum®** je jedinstveni pripravak s **AgCelence®** efektom od kojeg možete očekivati:

1. veći prinos
2. bolju toleranciju na stres
3. bolju kvalitetu
4. povećanu uspješnost proizvodnje

SPEKTAR DJELOVANJA:

Koncentrična pjegavost lista (*Altemaria solani*)

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Koristi se protiv prestenaste pjegavosti (*Mycosphaerella brassicicolla*) i pjegavost kuperšnjača (*Altemaria spp.*) u dozi 1,0 kg/ha.

Koristi se 2 puta u toku vegetacije: prvi put u fazi rozete; tj u fazi formiranja glavice (suzbijanje alternarije) a drugi put ukoliko je jaki infekcijski potencijal bolesti i nepovoljne vremenske prilike, tretiranje preparatom **Signum®** se ponavlja 10 dana nakon prvog tretiranja.

Ukoliko su vremenske prilike povoljne 2. tretiranje se ponavlja tri tjedna prije berbe i uloga tog prskanja je suzbijanje skladišnih bolesti.

KARENCA: 21 dan

Alverde®

AKTIVNA TVAR: 240 g/l metaflumizon

FORMULACIJA: tekuća koncentrirana suspenzija (SC)

Alverde® je novi sistemični insekticid s kontaktnim i želučanim djelovanjem. Zbog novog mehanizma djelovanja na živčani sustav kukaca pripravak **Alverde®** odlično se uklapa u antirezistentne strategije pri suzbijanju štetnika rajčice.

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Sovice: kuperšna sovica (*Mamestra brassicae*), žuta kukuruzna sovica (*Heliothis armigera*), sovica (*Plusia spp.*), kuperšni moljac (*Plutella spp.*) i kuperšni bijelac (*Pieris brassicae*): u količini 1 l/ha ili 100 ml/h; Primjena u količini 1 l/ha ili 100 ml/h.

VRIJEME PRIMJENE: Tretirati na početku napada ličnici u prvim razvojnim stadijima. U slučaju jakih napada ponovno primjeniti nakon 7 do 10 dana. Može se primjeniti na istoj površini najviše 2x godišnje.

KARENCA: 3 dana

Fastac® 10 EC

AKTIVNA TVAR: 100 g/l alfa-cipermetrin

FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

Fastac® 10 EC je formuliran u obliku koncentrata za emulziju (EC) koja sadrži 100 g/l aktivne tvari alfa-cipermetrina; ovaj se spoj smatra najaktivnijim piretroidom. Zbog toga je **Fastac® 10 EC** registriran u velikom broju usjeva za suzbijanje širokog spektra štetnika koji sišu i grizu. On je visokoučinkovit insekticid širokog spektra s vrlo brzim djelovanjem u vrlo niskim dozama. Primjenjuje se u koncentraciji od 0,01-0,015%.

PRIMJENA:

- staklenički štitasti moljac (*Trialeurodes vaporariorum*) i duhanovog štitasti moljac (*Bemisia tabaci*) u količini 300 ml/ha. Može se primijeniti na istoj površini jedan puta godišnje;
- lisne uši (*Myzus persicae* i *Aphis spp.*) u količini 150 ml/ha. Može se primijeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;
- gusjenica sovica pozemljuna (*Agrotis spp.*) i sovica (*Spodoptera spp.*) u količini 150 ml/ha. Može se primijeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje. Kod suzbijanja sovica pozemljuna sredstvo je potrebno primijeniti predvečer na vlažnu zemlju jednim tretiranjem tla prije sjetve kulture ili jednim tretiranjem vrata biljke nakon što se primijete prva oštećenja;
- kuperšni buhač (*Phyllotreta sp.*) u količini 75 ml/ha. Može se primijeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;
- kuperšni bijelac (*Pieris brassicae*) u količini 100 ml/ha. Može se primijeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;
- mali kuperšar (*Pieris rapae*) u količini 100 ml/ha. Može se primijeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;
- kuperšni moljac (*Plutella xylostella*) u količini 100 ml/ha. Može se primijeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;

POSEBNE NAPOMENE:

- Ne prskati na temperaturama iznad 28°C
- Ne miješa se s diotiokarbamatnim fungicidima i fungicidima na osnovi folpeta, kaptana, bordoškom suspenzijom, diklofluanidom, tolifluanidom i lužnatim preparatima

KARENCA:

42 dana



Perfekthion®

AKTIVNA TVAR: 400 g/l dimetoat

FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

Perfekthion® je sistemični (digestivni) i kontaktni organo-fosforni insekticid. Dvostruki mehanizam djelovanja omogućuje mu primjenu protiv velikog broja insekata koji sišu ili grizu. **Perfekthion®** se akropetalno translucira u više dijelove biljke štiteći nove, mlade listove koje biljne uši najčešće napadaju.

PRIMJENA:


1 l/ha uz utrošak vode od 600 l/ha; Suzbijanje kuperšnu muhu kod koje se mora obratiti pažnja na let odrasle jedinke muhe prije izlijeganja jaja (lete u travnju, lipnju i kolovozu). Npr. kod proljetnog kupusa, let muhe u Dalmaciji počinje početkom travnja kada je kuperš u fazi rozete, međutim to pravilo ne vrijedi za ljetni kuperš kojeg muha napada kad je kuperš u fazi 2-3 prava lista. Primjenjuje se rano ujutro ili predvečer.

PREDNOSTI:

- Širok spektar djelovanja
- Produceno djelovanje
- Pogodan za primjenu u kulturama u kojima se javlja više vrsta štetnika istovremeno
- Biljke ga brzo usvajaju čak i u hladnjim vremenskim uvjetima



Program zaštite luka



PROGRAMI ZAŠTITE U POVRTLARSTVU

Program zaštite luka

U okvirnom programu zaštite luka predstavljamo herbicid **Stomp® 330 E** za suzbijanje jednogodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u periodu bića.

Za suzbijanje bolesti u luku preporučamo preparat **Signum®** s **AgCelence®** efektom. Proizvodi **AgCelence®** dokazano poboljšavaju zdravlje i vitalnost Vaših kultura, povećavaju tolerantnost na stres i time omogućuju veće prinose i bolju tržišnu kakvoću pobranih usjeva. Za zaštitu od štetnika predstavljamo novu formulaciju proizvoda **Fastac® 10 EC** koji suzbija lisne uši i gusjenice sovice pozemljuše.

Stomp® Aqua

AKTIVNA TVAR: 455 g/l pendimetalin

FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

Stomp® Aqua je selektivan kontaktni i zemljinski herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova i smanjenju zakorovljenosti jednogodišnjim širokolisnim korovima.

SPEKTAR DJELOVANJA:

Jednogodišnji travni korovi:

- osjetljivi korovi: obični koštan (*Echinochloa crus-galli*), zeleni muhar (*Setaria viridis*), pršlenasti muhar (*Setaria verticillata*), obična svračica (*Digitaria sanguinalis*), lisičji repak (*Alopecurus myosuroides*), jednogodišnja vlasnjača (*Poa annua*).
- umjereno osjetljivi: divlja zob (*Avena sterilis*), ljljevi (*Lolium spp.*).

Umjereno osjetljivi: Trputci (*Plantago spp.*), kovrčava kiselica (*Rumex crispus*), obični kostriš (*Senecio vulgaris*), europski mračnjak (*Abutilon theophrasti*), prava kamilica (*Matricaria chamomilla*).

Jednogodišnji širokolisni korovi:

- osjetljivi korovi: ispruženi ščir (*Amaranthus blitoides*), ščir (*Amaranthus retroflexus*), poljska krika (*Anagallis arvensis*), pastirska torbica (*Capsella bursa pastoris*), bijela loboda (*Chenopodium album*), sjetveni ravan (*Chrysanthemum segetum*),

ljekovita dimnjača (*Fumaria officinalis*), broćike (*Galiu spp.*), europska bradavka (*Heliotropium europaeum*), sljez (*Malva spp.*), ptičji dvornik (*Polygonum aviculare*), veliki dvornik (*Polygonum persicaria*), tušanj (*Portulaca olearacea*), divlji mak (*Papaver rhoeas*), žabnjaci (*Ranunculus spp.*), divlja rotkva (*Raphanus raphanistrum*), sikavica (*Silybum marianum*), oranž (*Sisymbrium spp.*), mišjakinja (*Stellaria media*), poljska gorušica (*Sinapis arvensis*), bijela gorušica (*Sinapis alba*), crna pomoćnica (*Solanum nigrum*), obični svinjak (*Sonchus oleraceus*), babin Zub (*Tribulus terrestris*), bršljenasta čestoslavica (*Veronica hederifolia*), perzijska čestoslavica (*Veronica persica*), divlja salata (*Lactuca serriola*).

umjereno osjetljivi: Trputci (*Plantago spp.*), kovrčava kiselica (*Rumex crispus*), obični kostriš (*Senecio vulgaris*), europski mračnjak (*Abutilon theophrasti*), prava kamilica (*Matricaria chamomilla*).

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Stomp® Aqua primjenjuje se nakon nicanja kulture (post-em) kada se kultura nalazi u stadiju razvoja 'bića' (BBCH 10) u količini 2,5 – 3,0 l/ha.

KARENCA: 75 dana

Focus® Ultra

AKTIVNA TVAR: 100 g/l cikloksidim

FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

Focus® Ultra namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih travnih korova.

SPEKTAR DJELOVANJA:

Focus® Ultra je herbicid za suzbijanje travnih korova. Uništava uskolisne korove, posebno one koji se teško suzbijaju i to u korijenu.

Visoko je učinkovit na slijedeće korovne vrste:

- muharike (*Setaria spp.*)
- obični koštan (*Echinochloa crus-galli*)
- divlji sirak iz rizoma i iz sjemena (*Sorghum halepense*)
- svračica (*Digitaria sanguinalis*)
- pirika (*Agropyrum repens*)
- zubača (*Cynodon dactylon*)

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Focus® Ultra ne bi trebalo prskati na temperaturama ispod 14°C i iznad 26°C.

Međuredna kultivacija može se obavljati 12 dana poslije primjene pripravka Focus® Ultra.

Pripravak Focus® Ultra ne treba miješati ni s jednim drugim pripravkom.

KOLIČINA PRIMJENE:

▪ jednogodišnji travni korovi - 1,0-1,5 l/ha

▪ višegodišnji uskolisni korovi - 3,0-4,0 l/ha

KARENCA: 21 dan



Acrobat® MZ WG

AKTIVNA TVAR: 90 g/kg dimetomorf i 600 g/kg mankozeb

FORMULACIJA: vodotopive granule (WG)

Acrobat® MZ WG je preventivni i kurativni fungicid nove generacije, pripravak kontaktnog i dubinskog djelovanja, izuzetno učinkovit u suzbijanju plamenjače.

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

- Luk iz lučice (na otvorenom): plamenjača (*Peronospora destructor*) 2,5 kg/ha, na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti;
- Poriluk (na otvorenom): plamenjača (*Phytophthora porri*) 2,0 kg/ha.

KARENCA: 14 dana

ACROBAT® MZ WG PROŠIRENJE UPORABE NA MALE KULTURE



Polyram® DF

AKTIVNA TVAR: metiram 70%

FORMULACIJA: močive samodispergirajuće mikrogranule - koncentrat za suspenziju

Polyram® DF je kontaktni (preventivni) fungicid iz skupine ditiokarbamata namijenjen za suzbijanje polijeganja rasada i peronospora/plamenjača.

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Polyram® DF koristi se kod povrtnje kulture do stadija 2 prava lista (BBCH 12) – za suzbijanje polijeganja rasada i peronospora/plamenjača (*Peronosporaceae*) u zaštićenom prostoru. Sredstvo se primjenjuje u količini 0,2 g/m² u 40-60 ml vode/m². Za suzbijanje glijiva koje uzrokuju polijeganje rasada potrebno je tretiranje obaviti nakon sjetve, dok je tretiranje za peronospore/plamenjače potrebitno obaviti kod pojave povoljnijih uvjeta za zarazu. Dozvoljena su najviše 2 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 10-14 dana.

KARENCA: OVP

Vrsta bilja i/ili uvjeti primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karenca (dana)	Vrijeme primjene
Luk iz lučice (na otvorenom)	Plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)	3	7-14	2,5 kg/ha	200-500	14	Na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti.
Česnjak (na otvorenom)	Plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)	3	7-14	2,5 kg/ha	200-500	14	
Poriluk (na otvorenom)	Plamenjača (<i>Phytophthora porri</i>)	3	7-14	2,0 kg/ha	200-500	21	



Signum®

AKTIVNA TVAR: 267 g/kg boskalid i 67 g/kg piraklostrobin

FORMULACIJA: vodotopive granule (WG)

Signum® je kombinirani sistemični preventivni fungicid vrlo širokog spektra djelovanja. Kombinacija novih aktivnih tvari osigurava visok stupanj zaštite i dugotrajan učinak. Signum® je više od obične zaštite bijjal! Signum® je jedinstveni pripravak s **AgCelence®** efektom od kojeg možete očekivati:

1. veći prinos
2. bolju toleranciju na stres
3. bolju kvalitetu
4. povećanu uspješnost proizvodnje

SPEKTAR DJELOVANJA:
Siva pljesan (*Botrytis spp.*)

PREPORUKE ZA PRIMJENU: 1,5 kg/ha

KARENCA: 21 dan

Fastac® 10 EC

AKTIVNA TVAR: 100 g/l alfa-cipermetrin

FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

Fastac® 10 EC je formuliran u obliku koncentrata za emulziju (EC) koja sadrži 100 g/l aktivne tvari alfa-cipermetrina; ovaj se spoj smatra najaktivnijim piretroidom. Zbog toga je Fastac® 10 EC registriran u velikom broju usjeva za suzbijanje širokog spektra štetnika koji sišu i grizu. On je visokoučinkovit insekticid širokog spektra s vrlo brzim djelovanjem u vrlo niskim dozama. Primjenjuje se u dozi od 150 ml/ha.

PRIMJENA:

- lisne uši (*Myzus persicae* i *Aphis spp.*) u količini 150 ml/ha. Može se primijeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;
- gusjenica sovica pozemljuša (*Agrotis spp.*) i sovica (*Spodoptera spp.*) u količini 150 ml/ha. Može se primijeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje. Kod suzbijanja sovica pozemljuša sredstvo je potrebno primijeniti predvečer na vlažnu zemlju jednim tretiranjem tla prije sjetve kulture ili jednim tretiranjem vrata biljke nakon što se primijete prva oštećenja.

PREDNOSTI:

- Fastac® 10 EC je učinkovit protiv većine ekonomski značajnih štetnika
- suzbija sve razvojne stadije insekata
- uspješan protiv insekata rezistentnih na druge insekticide
- ima repellentno i "anti-feeding" djelovanje
- upotrebljava se u velikom broju kultura
- ne pokazuje fitotoksičnost u preporučenim dozama
- duže djeluju nego klasični insekticidi
- visoko je otporan na ispiranje kišom
- niske doze umanjuju utjecaj na okoliš
- neznatno opasan za vrste koje nisu objekt tretiranja

KARENCA: 7 dana

Perfekthion®

AKTIVNA TVAR: 400 g/l dimetoat

FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

Perfekthion® je sistemski (digestivni) i kontaktni organo-fosforni insekticid. Dvostruki mehanizam djelovanja omogućuje mu primjenu protiv velikog broja insekata koji sišu ili grizu. Perfekthion® se akropetalno translacirom u više dijelove biljke štiteći nove, mlade listove koje biljne uši najčešće napadaju.

PREDNOSTI:

- Širok spektar djelovanja
- Produceno djelovanje
- Pogodan za primjenu u kulturama u kojima se javlja više vrsta štetnika istovremeno
- Biljke ga brzo usvajaju čak i u hladnjim vremenskim uvjetima


POSEBNE NAPOMENE:

- Ne prskati na temperaturama iznad 28°C
- Ne miješa se s diotiokarbamatnim fungicidima i fungicidima na osnovi folpeta, kaptana, bordoškom suspenzijom, diklofluanidom, tolifluanidom i lužnatim preparatima

KARENCA: 42 dana



Program zaštite salate



PROGRAMI ZAŠTITE U POVRTLARSTVU

Program zaštite salate

Proizvođači salate su svjesni kako je salata posebno osjetljiva na glična oboljenja. BASFov program zaštite nudi proizvode protiv dvije najvažnije bolesti salate: bijele truleži i sive plijesni. Bijela trulež se najčešće javlja u vrijeme formiranja glavice. Listovi se opuste i cijela biljka polegne na tlo. Na donjem dijelu glavice javi se vodenasta trulež koja ubrzo zahvaća cijelu glavicu. Kako bi se izbjegla glična

oboljenja vrlo je važna preventivna zaštita. Sivoj plijesni pogoduje visoka vlaga i visoka temperatura i u takvim uvjetima se bolest jako brzo širi. Zaraženo lišće, najčešće u osnovi pri dnu glavice požuti, nekrotira i dobije sivu prevlaku. Za zaštitu od navedenih bolesti preporučamo preparat **Signum® s AgCelence® efektom**. Proizvodi s **AgCelence®** efektom poboljšavaju zdravlje i vitalnost vaših kultura, povećavaju

tolerantnost na stres i time omogućuju veće prinose i bolju tržišnu kakvoću pobranih usjeva. Za njegu i zaštitu protiv korova preporučamo naš prepoznatljiv i dugogodišnji preparat **Stomp® 330E** koji se primjenjuje prije presadišanja. Novost u zaštiti od štetnika je preparat **Fastac® 10 EC** s novom formulacijom koji suzbija relevantne štetnike brzo i učinkovito.

Stomp® Aqua

AKTIVNA TVAR: 455 g/l pendimetalin

FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

Stomp® Aqua je selektivan kontaktni i zemljinski herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova i smanjenju zakorovljenosti jednogodišnjim širokolisnim korovima.

SPEKTAR DJELOVANJA:

Jednogodišnji travni korovi:

- osjetljivi korovi: obični koštan (*Echinochloa crus-galli*), zeleni muhar (*Setaria viridis*), pršljenasti muhar (*Setaria verticillata*), obična svačica (*Digitaria sanguinalis*), lisičji repak (*Alopecurus myosuroides*), jednogodišnja vlasnjača (*Poa annua*).
- umjereno osjetljivi: divlja zob (*Avena sterilis*), ljljivevi (*Lolium spp.*).

Jednogodišnji širokolisni korovi:

- osjetljivi korovi: ispruženi ščir (*Amaranthus blitoides*), ščir (*Amaranthus retroflexus*), poljska krika (*Anagallis arvensis*), pastirska torbica (*Capsella bursa pastoris*), bijela loboda (*Chenopodium album*), sjetveni ravan (*Chrysanthemum segetum*), ljekovita dimnjača (*Fumaria officinalis*), broćike (*Galium spp.*), europska bradavka (*Heliotropium europaeum*), sljez (*Malva spp.*), ptičiji dvornik (*Polygonum aviculare*), veliki dvornik (*Polygonum persicaria*), tušanj (*Portulacea olearacea*), divlji mak (*Papaver rhoeas*), žabnjaci (*Ranunculus spp.*), divlja rotkva (*Raphanus raphanistrum*), sikavica (*Silybum marianum*), oranji (*Sisymbrium spp.*), mišjakinja (*Stellaria media*), poljska gorušica (*Sinapis arvensis*), bijela gorušica (*Sinapis alba*), crna pomoćnica (*Solanum nigrum*), obični svinjak (*Sonchus oleraceus*), babin zub (*Tribulus terrestris*), bršljenasta čestoslavica (*Veronica hederifolia*), perzijska čestoslavica (*Veronica persica*), divlja salata (*Lactuca serriola*).
- umjereno osjetljivi: Trputci (*Plantago spp.*), kovrčava kiselica (*Rumex crispus*), obični kostris (*Senecio vulgaris*), europski mračnjak (*Abutilon theophrasti*), prava kamilica (*Matricaria chamomilla*).

PREPORUKE ZA PRIMJENU:
Stomp® Aqua primjenjuje se prije presadišanja u količini 2,5-3 l/ha.

KARENCA: OVP





Focus® Ultra

AKTIVNA TVAR: 100 g/l cikloksidim

FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

Focus® Ultra namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih travnih korova.

SPEKTAR DJELOVANJA:

Focus® Ultra je herbicid za suzbijanje travnih korova. Uništava uskolisne korove, posebno one koji se teško suzbijaju i to u korijenu.

Visoko je učinkovit na slijedeće korovne vrste:

- muharike (*Setaria spp*)
- obični koštan (*Echinochloa cruss-galli*)
- divlji sirak iz rizoma i iz sjemena (*Sorghum halepense*)
- svračica (*Digitaria sanguinalis*)
- pirika (*Agropyrum repens*)
- zubača (*Cynodon dactylon*)

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Focus® Ultra ne bi trebalo prskati na

temperaturama ispod 14°C i iznad 26°C.

Međureduna kultivacija može se obavljati 12 dana poslije primjene pripravka Focus® Ultra. Pripravak Focus® Ultra ne treba miješati ni s jednim drugim pripravkom.

KOLIČINA PRIMJENE:

- jednogodišnji travni korovi - 1,0-1,5 l/ha
- višegodišnji uskolisni korovi - 3,0-4,0 l/ha

KARENCA: 21 dan



Polyram® DF

AKTIVNA TVAR: metiram 70%

FORMULACIJA: močive samodispergirajuće mikrogranule - koncentrat za suspenziju

Polyram® DF je kontaktni (preventivni) fungicid iz skupine ditiokarbamata namijenjen suzbijanju plamenjače salate.

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Polyram® DF namijenjen je za suzbijanje plamenjače (*Bremia lactucae*) u količini 1,2 kg/ha (12 g na 100 m²). Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu do stvaranja glavica (BBCH 40). Dozvoljena su 2 tretiranja na istom zemljištu u vegetaciji. Tretiranje se obavlja u vremenskim razmacima 7-10 dana ovisno o vremenskim uvjetima i intenzitetu zaraze.

KARENCA: 21 dan

Signum®

AKTIVNA TVAR: 267 g/kg boskalid i 67 g/kg piraklostrobin

FORMULACIJA: vodotopive granule (WG)

Signum® je kombinirani sistemski preventivni fungicid vrlo širokog spektra djelovanja. Kombinacija novih aktivnih tvari osigurava visok stupanj zaštite i dugotrajan učinak. Signum® je više od obične zaštite bilja! Signum® je jedinstveni pripravak s AgCelence® efektom od kojeg možete očekivati:

1. veći prinos
2. bolju toleranciju na stres
3. bolju kvalitetu
4. povećanu uspješnost proizvodnje

SPEKTAR DJELOVANJA:

Bijela trulež (*Sclerotinia sclerotiorum*)
Siva pljesan (*Botrytis cinerea*)

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

1,0 kg/ha. Dozvoljena su dva tretiranja.

KARENCA: 14 dana



Fastac® 10 EC

AKTIVNA TVAR: 100 g/l alfa-cipermetrin

FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

Fastac® 10 EC je formuliran u obliku koncentrata za emulziju (EC) koja sadrži 100 g/l aktivne tvari alfa-cipermetrina; ovaj se spoj smatra najaktivnijim piretroidom. Zbog toga je Fastac® 10 EC registriran u velikom broju usjeva za suzbijanje širokog spektra štetnika koji sišu i grizu. On je visokoučinkovit insekticid širokog spektra s vrlo brzim djelovanjem u vrlo niskim dozama. Primjenjuje se u dozi od 150 ml/ha.

PRIMJENA:

- lisne uši (*Myzus persicae* i *Aphis spp.*) u količini 150 ml/ha. Može se primijeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;
- gusjenica sovica pozemljuša (*Agrotis spp.*) i sovica (*Spodoptera spp.*) u količini 150 ml/ha. Može se primijeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje. Kod suzbijanja sovica pozemljuša sredstvo je potrebno primijeniti predvečer na vlažnu zemlju jednim tretiranjem tla prije sjetve kulture ili jednim tretiranjem vrata biljke nakon što se primijete prva oštećenja.

PREDNOSTI:


- Fastac® 10 EC je učinkovit protiv većine ekonomski značajnih štetnika
- suzbija sve razvojne stadije insektaka
- uspješan protiv insektaka rezistentnih na druge insekticide
- ima repellentno i "anti-feeding" djelovanje
- upotrebljava se u velikom broju kultura
- ne pokazuje fitotoksičnost u preporučenim dozama
- duže djeluje nego klasični insekticidi
- visoko je otporan na ispiranje kišom
- niske doze umanjuju utjecaj na okoliš
- neznatno opasan za vrste koje nisu objekt tretiranja

KARENCA:

7 dana



Program zaštite graha / graška



PROGRAMI ZAŠTITE U POVRTLARSTVU

Program zaštite graha i graška

Basagran® 480

AKTIVNA TVAR: 480 g/l bentazon

FORMULACIJA: koncentrirana otopina (SL)

Basagran® 480 je herbicid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i smanjenje zakoravljenosti nekim višegodišnjim širokolisnim korovima u grahu.


SPEKTAR DJELOVANJA:

Jednogodišnji širokolisni korovi: europski mračnjak (*Abutilon theophrasti*), obični šćir (*Amaranthus retroflexus*), ambrozija (*Ambrosia elatior* - do dva lista), jarmeni (*Anthemis spp.*), lobode (*Atriplex spp.* i *Chenopodium spp.* - do dva lista), pastirska torbica (*Capsella bursa-pastoris*), obična konica (*Galinago parviflora*), ljepljiva bročika (*Galium aparine*), kamilice (*Matricaria spp.*), poljska potočnica (*Myosotis arvensis*), dvornici (*Polygonum spp.*, osim *P. aviculare*), divlja rotkva (*Raphanus raphanistrum*), poljska gorušica (*Sinapis arvensis*), crna pomoćnica (*Solanum nigrum*), srednja mišjakinja (*Stellaria media*), dikice (*Xanthium spp.*) i dr. kada su razvijena 2-4 lista korova.

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

U fazi razvoja 4. lista (BBCH 14) u količini 1,5-2 l/ha (150-200 ml u 20-40 l vode na 1000 m²); Za postizanje najvećeg učinka, preporuča se kod prskanja osigurati dobru pokrovnost listova i stabilike korova škropivom. Prilikom upotrebe sredstva mora se utrošiti najmanje 200 l vode/ha.

KARENCA: OVP



Focus® Ultra

AKTIVNA TVAR: 100 g/l cikloksidim

FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

Focus® Ultra namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih travnih korova.

SPEKTAR DJELOVANJA:

Focus® Ultra je herbicid za suzbijanje travnih korova. Uništava uskolisne korove, posebno one koji se teško suzbijaju i to u korijenu. Visoko je učinkovit na slijedeće korovne vrste:

- muharike (*Setaria spp.*)
- obični koštan (*Echinochloa crus-galli*)
- divlji sirak iz rizoma i iz sjemena (*Sorghum halepense*)
- svračica (*Digitaria sanguinalis*)
- pirika (*Agropyrum repens*)
- zubača (*Cynodon dactylon*)

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Focus® Ultra ne bi trebalo prskati na temperaturama ispod 14°C i iznad 26°C. Međuredna kultivacija može se obavljati 12 dana poslije primjene pripravka Focus® Ultra. Pripravak Focus® Ultra ne treba miješati ni s jednim drugim pripravkom.

Grah:

- jednogodišnji uskolisni korovi, kada je korov u fazi 3-5 listova do punog razvoja korova, u količini 1-1,5 l/ha uz upotrebu 200-400 l/ha vode;
- višegodišnji uskolisni korovi, kada je korov visok 20-30 cm ili pred cvatnjem korova, u količini 3-4 l/ha uz upotrebu 200-400 l/ha vode;
- samonikle žitarice u količini 2,5 l/ha uz upotrebu 200-400 l/ha vode.

Grašak:

- jednogodišnji uskolisni korovi, kada je korov u fazi 3-5 listova do punog razvoja korova, u količini 1-1,5 l/ha uz upotrebu 200-400 l/ha vode
- višegodišnji uskolisni korovi, kada je korov visok 20-30 cm ili pred cvatnjem korova, u količini 3-4 l/ha uz upotrebu 200-400 l/ha vode.

BROJ PRIMJENA:

1 ili razdvojena primjena (split aplikacija u 2 puta).

KARENCA:

28 dana grah, 35 dana grašak

Novo!

Corum®

AKTIVNA TVAR: bentazon (480,0 g/l), imazamoks (22,4 g/l)

FORMULACIJA: koncentrat za otopinu (SL)

Corum® je kontaktno-sistemični herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u grahu (zrnaš i mahunar) i grašku.

SPEKTAR DJELOVANJA:

europski mračnjak (*Abutilon theophrasti*), ambrozija (*Ambrosia artemisifolia*), šćirevi (*Amaranthus spp.*), gorki koromač (*Ammi majus*), crna gorušica (*Brassica nigra*), obična rusomača, (*Capsella bursa-pastoris*), bijela loboda (*Chenopodium album*), smokvasta loboda (*Chenopodium ficifolium*), bijeli kužnjak (*Datura stramonium*), koštan (*Echinochloa crus-galli*), dimnjake (*Fumaria spp.*), ljepljiva broćika (*Galium aparine*), obična konica (*Galinsoga parviflora*), mjeđurasta sljezolika (*Hibiscus trionum*), kamilice (*Matricaria spp.*), mak turčinak (*Papaver rhoeas*), veliki dvornik (*Polygonum persicaria*), kiseličasti dvornik (*Polygonum lapathifolium*), slakasti dvornik (*Polygonum convolvulus*), ptičji dvornik (*Polygonum aviculare*), tušt (*Portulaca oleracea*), poljska gorušica (*Sinapis arvensis*), bijela gorušica (*Sinapis alba*), crna pomoćnica (*Solanum nigrum*), korovi iz roda svinjak (*Sonchus spp.*), ornji (*Sisymbrium spp.*), čestoslavice (*Veronica spp.*)

PREDNOSTI:

- Do sada najsnasniji herbicid sa najširim spektrom djelovanja protiv korova u leguminozama

- Izuzetno dobre selektivnosti kada se pravilno upotrebljava!
- Za postizanje najboljih rezultata u soji obavezna je upotreba okvašivača Dash® HC

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Jednokratno u količini 1,25 l/ha nakon ranog nicanja (rani post-em), kada su usjevi razvili prva 2 - 3 prava lista (2 lista cijela, 1. trolik, BBCH 12) i kada su širokolisni korovi u ranim razvojnim stadijima.

Dodavanjem okvašivača **Dash® HC** u količini 0,25 - 0,3 litara na 100 litara smjese postiže se veća učinkovitost sredstva **Corum®** na nekim cilijanim korovnim vrstama, posebice u nepovoljnim uvjetima primjene.

Dvokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji u količini 0,625 l/ha + 0,625 l/ha nakon nicanja (post-em). Prvi puta tretirati kada grašak razvije 1 cijeli list (BBCH 11), a grah (zrnaš i mahunar) 2 cijela lista (BBCH 12). Drugi puta sredstvo se primjenjuje u razmaku 7 - 10 dana.

Ograničenje: Ne primjenjivati u grahu (zrnašu i mahunaru) i grašku nakon stadija formiranja bočnih izdanaka (BBCH 21).

Kod primjene u grašku, u slučajevima jake zakoravljenosti i kada su korovi u graničnom razvojnom stadiju za osjetljivost na sredstvo **Corum®**, koristiti sredstvo **Dash® HC** u količini od 0,5 litara na 100 litara smjese. U slučaju jake zakoravljenosti uskolisnim korovima preporuča se naknadna primjena **Focus® Ultra**.

KARENCA:

60 dana

**PREPORUKE ZA PRIMJENU:**

Stomp® Aqua primjenjuje se u:

- **grašku** nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em) u količini 2,5-3,0 l/ha;
- **grašku i bobu (namijenjenima za sušenje zrna)** prije sjetve kulture uz inkorporaciju ili nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em) u količini 2,0 - 2,5 l/ha.

KARENCA: OVP

Stomp® Aqua

AKTIVNA TVAR: 455 g/l pendimetalin

FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

Stomp® Aqua je selektivan kontaktni i zemljinski herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova i smanjenju zakoravljenosti jednogodišnjim širokolisnim korovima.

SPEKTAR DJELOVANJA:**Jednogodišnji travni korovi:**

- osjetljivi korovi: obični koštan (*Echinochloa crus-galli*), zeleni muhar (*Setaria viridis*), pršlenasti muhar (*Setaria verticillata*), obična svračica (*Digitaria sanguinalis*), lisici repak (*Alopecurus myosuroides*), jednogodišnja vlasnjača (*Poa annua*).
- umjereno osjetljivi: divlja zob (*Avena sterilis*), ljljevi (*Lolium spp.*).

Jednogodišnji širokolisni korovi:

- osjetljivi korovi: ispruženi šćir (*Amaranthus blitoides*), šćir (*Amaranthus retroflexus*), poljska krika (*Anagallis arvensis*), pastirska torbica (*Capsella bursa-pastoris*), bijela loboda (*Chenopodium album*), sjeverni ravan (*Chrysanthemum segetum*), ljekovita dimnjaka (*Fumaria officinalis*), broćike (*Galium spp.*), europska bradavka (*Heliotropium europaeum*), sljez (*Malva spp.*), ptičji dvornik (*Polygonum aviculare*), veliki dvornik (*Polygonum persicaria*), tušanj (*Portulacea olearacea*), divlji mak (*Papaver rhoeas*), žabnjaci (*Ranunculus spp.*), divlja rotkva (*Raphanus raphanistrum*), sikavica (*Silybum marianum*), oranjski (*Sisymbrium spp.*), mišjakinja (*Stellaria media*), poljska gorušica (*Sinapis arvensis*), bijela gorušica (*Sinapis alba*), crna pomoćnica (*Solanum nigrum*), obični svinjak (*Sonchus oleraceus*), babin Zub (*Tribulus terrestris*), bršljenasta čestoslavica (*Veronica hederifolia*), perzijska čestoslavica (*Veronica persica*), divlja salata (*Lactuca serriola*).
- umjereno osjetljivi: Trputci (*Plantago spp.*), krvavičica kiselica (*Rumex crispus*), obični kostrš (*Senecio vulgaris*), europski mračnjak (*Abutilon theophrasti*), prava kamilica (*Matricaria chamomilla*).

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Stomp® Aqua primjenjuje se u:

- **grašku** nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em) u količini 2,5-3,0 l/ha;
- **grašku i bobu (namijenjenima za sušenje zrna)** prije sjetve kulture uz inkorporaciju ili nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em) u količini 2,0 - 2,5 l/ha.

KARENCA: OVP



AgCelence®
Očekujte više.

- prugaste pipe mahunarke (*Sitona lineatus*) u količini 125 ml/ha. Može se primjeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje.

PRIMJENA U GRAŠKU:

- stakleničkog štitastog moljca (*Trialeurodes vaporariorum*) i duhanovog štitastog moljca (*Bemisia tabaci*) u količini 300 ml/ha. Može se primjeniti na istoj površini jedan puta godišnje;

- lisni uši (*Myzus persicae* i *Aphis spp.*) u količini 150 ml/ha. Može se primjeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;

- gusjenica sovica pozemljusa (*Agrotis spp.*) i sovica (*Spodoptera spp.*) u količini 150 ml/ha. Može se primjeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje.

- kod suzbijanja sovica pozemljusa (*Agrotis spp.*) i sovica (*Spodoptera spp.*) u količini 150 ml/ha. Može se primjeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje.

- prugaste pipe mahunarke (*Sitona lineatus*) u količini 125 ml/ha. Može se primjeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;

- crnog graškovog savijača (*Cydia nigricana*) u količini 100 ml/ha. Može se primjeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;

- prugaste pipe mahunarke (*Sitona lineatus*) u količini 125 ml/ha. Može se primjeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;

- gusjenica sovica pozemljusa (*Agrotis spp.*) i sovica (*Spodoptera spp.*) u količini 150 ml/ha. Može se primjeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje.

- prugaste pipe mahunarke (*Sitona lineatus*) u količini 125 ml/ha. Može se primjeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;

- prugaste pipe mahunarke (*Sitona lineatus*) u količini 125 ml/ha. Može se primjeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;

- prugaste pipe mahunarke (*Sitona lineatus*) u količini 125 ml/ha. Može se primjeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;

- prugaste pipe mahunarke (*Sitona lineatus*) u količini 125 ml/ha. Može se primjeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;

- prugaste pipe mahunarke (*Sitona lineatus*) u količini 125 ml/ha. Može se primjeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;

- prugaste pipe mahunarke (*Sitona lineatus*) u količini 125 ml/ha. Može se primjeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;

- prugaste pipe mahunarke (*Sitona lineatus*) u količini 125 ml/ha. Može se primjeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;

- prugaste pipe mahunarke (*Sitona lineatus*) u količini 125 ml/ha. Može se primjeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;

- prugaste pipe mahunarke (*Sitona lineatus*) u količini 125 ml/ha. Može se primjeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;

- prugaste pipe mahunarke (*Sitona lineatus*) u količini 125 ml/ha. Može se primjeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;

- prugaste pipe mahunarke (*Sitona lineatus*) u količini 125 ml/ha. Može se primjeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;

- prugaste pipe mahunarke (*Sitona lineatus*) u količini 125 ml/ha. Može se primjeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;

Pulsar® 40

AKTIVNA TVAR: 40 g/l imazamox

FORMULACIJA: koncentrirana otopina (SL)

Pulsar® 40 je novi sistemični i zemljinski herbicid za suzbijanje velikog broja jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i travnih korova. Pulsar® 40 suzbija iznkle širokolisne i travne korove i preko tla u fazi klijanja. Pulsar® 40 se primjenjuje nakon nicanja usjeva.

SPEKTAR DJELOVANJA:

Pulsar® 40 uspješno suzbija većinu širokolisnih i travnih korova iz sjemena i korjena.

Širokolisni korovi: mračnjak (*Abutilon theophrasti*), ambrozija (*Ambrosia artemisifolia*), šćirevi (*Amaranthus spp.*), obična rusomača (*Capsella bursa-pastoris*), lobode (*Chenopodium spp.*), bijeli kužnjak (*Datura stramonium*), različak (*Delphinum consolida*), divlji mak (*Papaver rhoes*), dvornici (*Polygonum spp.*), goršica (*Sinapis arvensis*), crna pomoćnica (*Solanum nigrum*), čičak (*Xanthium strumarium*).

Travni korovi: koštan-kostrova (*Echinochloa crus galli*), muhari (*Setaria spp.*), sirak iz sjemena (*Sorghum halepense* iz sjemena).

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

1,0 l/ha u vrijeme kada usjev razvije 1 do 3 trolike.

Kod jake zakoravljenosti jednogodišnjim širokolisnim korovima (ambrozija, loboda) u soji, grahu, grašku i lucerni preporuča se puna doza Pulsar® 40 u količini od 1,0 l/ha uz dodatak herbicida Basagran® 480 u količini od 1,5 l/ha. Suzbijanje višegodišnjih širokolisnih korova: osjak (*Cirsium arvense*) i slati (*Convolvulus spp.*) obavlja se punom dozom od 1,0 l/ha, a u grašku i grahu uz prethodnu provjeru selektivnosti pri uzgoju novih nepoznatih sorti.

NAPOMENE:

U nepovoljnim vremenskim uvjetima (hladno i kišno vrijeme) može doći do kratkotrajne pojave bljedila (nijansa ka žutoj boji) kod svih navedenih kultura, koja traje 3-10 dana i nema nikakav utjecaj na razvoj i prinos užgajane kulture.

KARENCA: 63 dana

**Signum®**

AKTIVNA TVAR: 267 g/kg boskalid i 67 g/kg piraklostrobin


FORMULACIJA: vodotopive granule (WG)

Signum® je kombinirani sistemični preventivni fungicid vrlo širokog spektra djelovanja. Kombinacija novih aktivnih tvari osigurava visok stupanj zaštite i dugotrajan učinak. Signum® je više od obične zaštite bilja! Signum® je jedinstveni pripravak s **AgCelence®** efektom od kojeg možete očekivati:

1. veći prinos
 2. bolju toleranciju na stres
 3. bolju kvalitetu
 4. povećanu uspješnost proizvodnje
- </

Program zaštite mrkve

BASF
We create chemistry



PROGRAMI ZAŠTITE U POVRTLARSTVU

Program zaštite mrkve

Mrkva je dvogodišnja povrtna kultura koja zahtjeva učinkovitu zaštitu od bolesti paleža lišća i pepelnice za što preporučamo **Signum® s AgCelence® efektom**. Proizvodi s **AgCelence® efektom** dokazano poboljšavaju zdravlje i vitalnost Vaših kultura, povećavaju tolerantnost na stres i time omogućuju

veće prinose i bolju tržišnu kakvoću pobranih usjeva. Za zaštitu od štetnika preporučamo **Perfekthion®** - insekticid s dvostrukim mehanizmom djelovanja koji suzbija više štetnika istovremeno. Protiv korova preporučamo naš provjereni preparat **Stomp® 330 E**.



Stomp® Aqua

AKTIVNA TVAR: 455 g/l pendimetalin

FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

Stomp® Aqua je selektivan kontaktni i zemljinski herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova i smanjenju zakoravljenosti jednogodišnjim širokolistnim korovima.

SPEKTAR DJELOVANJA:

Jednogodišnji travni korovi:

- osjetljivi korovi: obični koštan (*Echinochloa crus-galli*), zeleni muhar (*Setaria viridis*), pršlenasti muhar (*Setaria verticillata*), obična svačica (*Digitaria sanguinalis*), lisičji repak (*Alopecurus myosuroides*), jednogodišnja vlasnjača (*Poa annua*).
- umjereno osjetljivi: divlja zob (*Avena sterilis*), ljluljevi (*Lolium spp.*).

Jednogodišnji širokolistni korovi:

- osjetljivi korovi: ispruženi šćir (*Amaranthus blitoides*), šćir (*Amaranthus retroflexus*), poljska krika (*Anagallis arvensis*), pastirska torbica (*Capsella bursa-pastoris*), bijela loboda (*Chenopodium album*), sjetveni ravan (*Chrysanthemum segetum*), ljekovita dimnjaka (*Fumaria officinalis*), broćike (*Galium spp.*), europska bradavka (*Heliotropium europaeum*), sljez (*Malva spp.*), ptičji dvornik (*Polygonum aviculare*), veliki dvornik (*Polygonum persicaria*), tušanj (*Portulaca olearacea*), divlji mak (*Papaver rhoeas*), žabnjaci (*Ranunculus spp.*), divlja rotkva (*Raphanus raphanistrum*), sikkavica (*Silybum marianum*), oranž (*Sisymbrium spp.*), mišjakinja (*Stellaria media*), poljska gorušica (*Spinapis arvensis*), bijela gorušica (*Spinapis alba*), crna pomoćnica (*Solanum nigrum*), obični svinjak (*Sonchus oleraceus*), babi Zub (*Tribulus terrestris*), bršljenasta čestoslavica (*Veronica hederifolia*), perzijska čestoslavica (*Veronica persica*), divlja salata (*Lactuca serriola*).
- umjereno osjetljivi: Trputci (*Plantago spp.*), kovrčava kiselica (*Rumex crispus*), obični kostriš (*Senecio vulgaris*), europski mračnjak (*Abutilon theophrasti*), prava kamilica (*Matricaria chamomilla*).

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Stomp® Aqua primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em) u količini 2,0 - 2,5 l/ha.

KARENCA: 90 dana

Focus® Ultra

AKTIVNA TVAR: 100 g/l cikloksidim

FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

Focus® Ultra namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih travnih korova.

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

- jednogodišnji uskolisni korovi, kada je korov u fazi 3-5 listova do punog razvoja korova, u količini 1-1,5 l/ha uz upotrebu 200-400 l/ha vode;
- višegodišnji uskolisni korovi, kada je korov visok 20-30 cm ili pred cvatnjem korova, u količini 3-4 l/ha uz upotrebu 200-400 l/ha vode;
- samonika žitarice u količini 2,5 l/ha uz upotrebu 200-400 l/ha vode.

BROJ PRIMJENA:

1 ili razdvojena primjena (split aplikacija u 2 puta).

KARENCA: 28 dana

Perfekthion®

AKTIVNA TVAR: 400 g/l dimetoat

FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

Perfekthion® je sistemski (digestivni) i kontaktni organo-fosforni insekticid. Dvostruki mehanizam djelovanja omogućuje mu primjenu protiv velikog broja insektaka koji sišu ili grizu. Perfekthion® se akropetalno translocira u više dijelove biljke štiteći nove, mlade listove koje biljne uši najčešće napadaju.

PREDNOSTI:

- Širok spektar djelovanja
- Produženo djelovanje
- Pogodan za primjenu u kulturama u kojima se javlja više vrsta štetnika istovremeno
- Biljke ga brzo usvajaju čak i u hladnjim vremenskim uvjetima

POSEBNE NAPOMENE:

- Ne prskati na temperaturama iznad 28°C
- Ne miješa se s ditiokarbamatnim fungicidima i fungicidima na osnovi folpeta, kaptana, bordoškom suspenzijom, diklofluanidom, tolifluanidom i lužnatim preparatima

KARENCA: 42 dana

Signum®

AKTIVNA TVAR: 267 g/kg boskalid i 67 g/kg piraklostrobin

FORMULACIJA: vodotopive granule (WG)

Signum® je kombinirani sistemični preventivni fungicid vrlo širokog spektra djelovanja. Kombinacija novih aktivnih tvari osigurava visok stupanj zaštite i dugotrajan učinak. Signum® je više od obične zaštite bilja! Signum® je jedinstveni pripravak s **AgCelence®** efektom od kojeg možete očekivati:

- veći prinos
- bolju toleranciju na stres
- bolju kvalitetu
- povećanu uspješnost proizvodnje

SPEKTAR DJELOVANJA:

Palež lišća (*Alternaria dauci*)
Pepelnica (*Erysiphe heraclei*)

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

0,75 - 1,0 kg/ha.
Dopuštene su dvije primjene u vegetaciji.

KARENCA: 14 dana

Polyram® DF

AKTIVNA TVAR: metiram 70%

FORMULACIJA: moćive samodispergirajuće mikrogranule - koncentrat za suspenziju


Polyram® DF je kontaktni (preventivni) fungicid iz skupine ditiokarbamatova namijenjen suzbijanju polijeganja rasada i plamenjače mrkve.

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Sredstvo se primjenjuje u količini 0,2 g/m² u 40-60 ml vode/m². Tretiranje za plamenjaču potrebno je obaviti kod pojave povoljnijih uvjeta za zarazu. Dozvoljena su najviše 2 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 10-14 dana.

KARENCA: OVP

Program zaštite rajčice



PROGRAMI ZAŠTITE U POVRTLARSTVU

Program zaštite rajčice

Rajčica je jedna od najraširenijih povrtnih kultura. Zahtjeva jako dobru zaštitu od bolesti plamenjače i pepelnice. Protiv pepelnice i sive plijesni preporučamo **Signum® s AgCelence®** efektom. Proizvodi s **AgCelence®** efektom dokazano poboljšavaju zdravlje i vitalnost

Vaših kultura, povećavaju tolerantnost na stres i time omogućuju veće prinose i bolju tržišnu kakvoću pobranih usjeva. Za zaštitu od plamenjače preporučamo fungicid **Polyram® DF**. Za zaštitu od štetnika predstavljamo novu formulaciju proizvoda

Fastac® 10 EC koji suzbija stakleničkog štitastog moljca, duhanovog štitastog moljca, lisne uši i gusjenice sovice pozemljuše. Protiv korova preporučamo naš provjereni preparat **Stomp® 330 E**.

Stomp® Aqua

AKTIVNA TVAR: 455 g/l pendimetalin

FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

Stomp® Aqua je selektivan kontaktni i zemljinski herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova i smanjenju zakoravljenosti jednogodišnjim širokolistnim korovima.

SPEKTAR DJELOVANJA:

Jednogodišnji travni korovi:

- osjetljivi korovi: ispruženi šćir (*Amaranthus blitoides*), šćir (*Amaranthus retroflexus*), poljska krika (*Anagallis arvensis*), pastirska torbica (*Capsella bursa-pastoris*), bijela loboda (*Chenopodium album*), sjeverni ravan (*Chrysanthemum segetum*), ljekovita dimnjača (*Fumaria officinalis*), broćike (*Galium spp.*), europska bradavka (*Heliotropium europaeum*), sljez (*Malva spp.*), ptičji dvornik (*Polygonum aviculare*), veliki dvornik (*Polygonum persicaria*), tušanj (*Portulaca olearacea*), divlji mak (*Papaver rhoeas*), žabnjaci (*Ranunculus spp.*), divlja rotkva (*Raphanus raphanistrum*), sikavica (*Silybum marianum*), oranjski (*Sisymbrium spp.*), mišjakinja (*Stellaria media*), poljska gorušica (*Sinapis arvensis*), bijela gorušica (*Sinapis alba*), crna pomoćnica (*Solanum nigrum*), obični svinjak (*Sonchus oleraceus*), babin zub (*Tribulus terrestris*), bršljenasta čestoslavica (*Veronica hederifolia*), perzijska čestoslavica (*Veronica persica*), divlja salata (*Lactuca serriola*).
- umjereno osjetljivi: Trputci (*Plantago spp.*), kovrčava kiselica (*Rumex crispus*), obični kostriš (*Senecio vulgaris*), europski mračnjak (*Abutilon theophrasti*), prava kamilica (*Matricaria chamomilla*).

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Stomp® Aqua primjenjuje se prije presadijanja u količini 2,5-3 l/ha.

KARENCA: 75 dana



Strobby® WG

AKTIVNA TVAR: 500 g/kg krezoksim-metil

FORMULACIJA: vodotopive granule (WG)

Strobby® WG je visokoučinkovit fungicid s protektivnim, kurativnim i eradicativnim djelovanjem namijenjen suzbijanju plamenjače rajčice.

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Pomoćnice (*Solanaceae*) - rajčica - za suzbijanje pepelnice (*Leveillula taurica*) u koncentraciji 0,02-0,05% (20-50 g na 100 litara vode). Strobby® WG se primjenjuje preventivno ili na početku zaraze.

MEHANIZAM DJELOVANJA:

Kemijski spoj Strobilurin A proizvodi gljiva Strobilurus tenacellus koja raste na palim iglicama bora. Producijom Strobilurina A gljiva Strobilurus tenacellus je sposobna držati dalje od sebe druge gljivice koje bi joj inače mogle oduzeti hranjive tvari. Pripravak Strobby® WG djeluje na nivou mitohondrija. Aktivna tvar se širi po površini lista i djelomično ulazi u list, što je čini termostabilnom i izuzetno otpornom na ispiranje. Unutar samog lista širenje je ograničeno, zato je pripravak označen kao kvazi-sistemik.

KARENCA: 3 dana





Chromosul 80®¹

AKTIVNA TVAR: sumpor 800 g/kg

FORMULACIJA: vodotopive granule (WG)

Chromosul 80®¹ je kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje pepelnice u rajčici (*Leveillula taurica*) u koncentraciji 0,3-0,4% (30-40 g/10 l vode).

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Chromosul 80^{®1} namijenjen je za suzbijanje bolesti rajčice - pepelnice (*Leveillula taurica*) u koncentraciji 0,3-0,4% (30-40 g/10 l vode).

PREDNOSTI:

Uporaba pripravaka Chromosul 80^{®1} pruža brojne prednosti zbog svoje formulacije u obliku močivih samodispergirajućih mikrogranula:

- pripravak se jednostavno koristi
- nema prašine
- lako se dozira
- lako i brzo se otapa u vodi
- nema taloženja u prskalici zbog visoke kvalitete koloida
- nema začepljenja dizni
- ne pjeni se
- ispunjava ekološke zahtjeve
- može se miješati sa većinom drugih pripravaka
- nema ožegotina na lišću i izbojima
- nije štetan za pčele

POSEBNA NAPOMENA:

Najbolje rezultate ostvaruje ukoliko se koristi preventivno (prije početka razvoja bolesti).

KARENCA: 14 dana

Polyram® DF

AKTIVNA TVAR: metiram 70%

FORMULACIJA: močive samodispergirajuće mikrogranule - koncentrat za suspenziju

Polyram® DF je kontaktni (preventivni) fungicid iz skupine ditiokarbamata namijenjen suzbijanju plamenjače rajčice.

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Polyram® DF namijenjen je za suzbijanje bolesti rajčice - plamenjače (*Phytophthora infestans*) u količini 2 kg/ha (200 g na 1000 m²). Dozvoljeno je 5 tretiranja na istom zemljištu u vegetaciji. Tretiranje se obavlja u vremenskim razmacima 7-10 dana ovisno o vremenskim uvjetima i intenzitetu zaraze.

KARENCA: 14 dana

Signum®

AKTIVNA TVAR: 267 g/kg boskalid i 67 g/kg piraklostrobin

FORMULACIJA: vodotopive granule (WG)

Signum® je kombinirani sistemični preventivni fungicid vrlo širokog spektra djelovanja. Kombinacija novih aktivnih tvari osigurava visok stupanj zaštite i dugotrajan učinak. Signum® je više od obične zaštite bilja! Signum® je jedinstveni pripravak s **AgCelence®** efektom od kojeg možete očekivati:

1. veći prinos
2. bolju toleranciju na stres
3. bolju kvalitetu
4. povećanu uspješnost proizvodnje

SPEKTAR DJELOVANJA:

Pepelnica (*Leveillula taurica*)
Siva plijesan (*Botrytis cinerea*)

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

0,25 kg/ha. Dozvoljeni broj tretiranja 3 puta.

KARENCA: 3 dana

Alverde®

AKTIVNA TVAR: 240 g/l metaflumizon

FORMULACIJA: tekuća koncentrirana suspenzija (SC)

Alverde® je novi sistemični insekticid s kontaktnim i želučanim djelovanjem. Zbog novog mehanizma djelovanja na živčani sustav kukaca pripravak Alverde® odlično se uklapa u antirezistentne strategije pri suzbijanju štetnika rajčice.

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Žuta kukuruzna sovica (*Heliothis armigera*), sovica (*Helicoverpa spp.*, *Plusia spp.* i *Spodoptera spp.*) i moljci: južnoamerički moljac rajčice (*Tuta absoluta*); Primjena u količini 1 l/ha ili 100 ml/ha.

VRIJEME PRIMJENE:

Tretirati na početku napada ličnici u prvim razvojnim stadijima. U slučaju jakih napada ponovno primjeniti nakon 7 do 10 dana. Može se primjeniti na istoj površini najviše 2x godišnje.

KARENCA: 3 dana



Fastac® 10 EC

AKTIVNA TVAR: 100 g/l alfa-cipermetrin

FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

Fastac® 10 EC je formuliran u obliku koncentrata za emulziju (EC) koja sadrži 100 g/l aktivne tvari alfa-cipermetrina; ovaj se spoj smatra najaktivnijim piretroidom. Zbog toga je Fastac® 10 EC registriran u velikom broju usjeva za suzbijanje širokog spektra štetnika koji sišu i grizu. On je visokoučinkovit insekticid širokog spektra s vrlo brzim djelovanjem u vrlo niskim dozama. Primjenjuje se u dozi 150 ml/ha.

PRIMJENA:

- staklenički štitasti moljac (*Trialeurodes vaporariorum*) i duhanov štitasti moljac (*Bemisia tabaci*) u količini 300 ml/ha. Može se primijeniti na istoj površini jedan puta godišnje;
- lisne uši (*Myzus persicae* i *Aphis spp.*) u količini 150 ml/ha. Može se primijeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;
- gusjenica sovica pozemljusa (*Agrotis spp.*) i sovica (*Spodoptera spp.*) u količini 150 ml/ha. Može se primijeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje. Kod suzbijanja sovica pozemljusa sredstvo je potrebno primijeniti predvečer na vlažnu zemlju jednim tretiranjem tla prije sjetve kulture ili jednim tretiranjem vrata biljke nakon što se primijete prva oštećenja.


PREDNOSTI:

- Fastac® 10 EC je učinkovit protiv većine ekonomski značajnih štetnika
- suzbija sve razvojne stadije insekata
- uspješan protiv insekata rezistentnih na druge insekticide
- ima repellentno i "anti-feeding" djelovanje
- upotrebljava se u velikom broju kultura
- ne pokazuje fitotoksičnost u preporučenim dozama
- duže djeluje nego klasični insekticidi
- visoko je otporan na ispiranje kišom
- niske doze umanjuju utjecaj na okoliš
- neznatno opasan za vrste koje nisu objekt tretiranja

KARENCA:

- prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne pojaseve i sprječiti kontaminaciju voda (vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda) tretirajući na najmanje 20 m udaljenosti
- u tijeku godine na istoj površini ili nasadu može se primjeniti najviše dva puta
- ne smije se miješati s bordoškom suspenzijom, lužnatim preparatima i herbicidima

KARENCA: 7 dana



Program zaštite paprike

BASF
We create chemistry



PROGRAMIZACIJA PAPRIČARSTVU

Program zaštite paprike

Paprika kao jedna od najraširenijih povrtnih kultura kod nas zahtjeva jako dobru zaštitu od bolesti plamenjače i pepelnice. Protiv pepelnice preporučamo **Signum®** s **AgCelence®** efektom. Proizvodi s **AgCelence®** efektom

dokazano poboljšavaju zdravlje i vitalnost Vaših kultura, povećavaju tolerantnost na stres i time omogućuju veće prinose i bolju tržišnu kakvoću pobranih usjeva. Za zaštitu od štetnika predstavljamo novu formulaciju proizvoda

Fastac® 10 EC koji suzbija stakleničkog štitastog moljca, duhanovog štitastog moljca, lisne uši i gusjenice sovice pozemljuše. Protiv korova preporučamo naš provjereni preparat **Stomp® 330 E**.

Jednogodišnji širokolistni korovi:

- osjetljivi korovi: ispruženi šćir (*Amaranthus blitoides*), šćir (*Amaranthus retroflexus*), poljska krika (*Anagallis arvensis*), pastirska torbica (*Capsella bursa pastoris*), bijela loboda (*Chenopodium album*), sjetveni ravan (*Chrysanthemum segetum*), ljekovita dimnjača (*Fumaria officinalis*), broćike (*Gailia spp.*), europska bradavka (*Heliotropium europaeum*), sljez (*Malva spp.*), ptičji dvornik (*Polygonum aviculare*), veliki dvornik (*Polygonum persicaria*), tušanj (*Portulaca olearacea*), divlji mak (*Papaver rhoeas*), žabnjaci (*Ranunculus spp.*), divlja rotkva (*Raphanus raphanistrum*), sivakica (*Silybum marianum*), oranjski (*Sisymbrium spp.*), mišjakinja (*Stellaria media*), poljska gorušica (*Spinapis arvensis*), bijela gorušica (*Spinapis alba*), crna pomoćnica (*Solanum nigrum*), obični svinjak (*Sonchus oleraceus*), babin zub (*Tribulus terrestris*), bršljenasta čestoslavica (*Veronica hederifolia*), perzijska čestoslavica (*Veronica persica*), divlja salata (*Lactuca serriola*).
- umjereno osjetljivi: trputci (*Plantago spp.*), kovrčava kiselica (*Rumex crispus*), obični koščić (*Senecio vulgaris*), europski mračnjak (*Abutilon theophrasti*), prava kamilica (*Matricaria chamomilla*).

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Stomp® 330 E primjenjuje se prije presađivanja u količini 4-5 l/ha (40-50 ml/100 m²).

NAPOMENE:

U slučaju prijevremenog preoravanja, tlo se mora preorati na dubini od najmanje 15 cm. Šest mjeseci nakon primjene sredstva Stomp® 330 E smiju se sijati ili saditi samo kulture u kojima je odobrena primjena.

Sredstvo Stomp® 330 E smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini.

KARENCA: OVP

Stroby® WG

AKTIVNA TVAR: 500 g/kg krezoksim-metil

FORMULACIJA: vodotopive granule (WG)

Stroby® WG je visokoučinkovit fungicid s protektivnim, kurativnim i eradicativnim djelovanjem namijenjen suzbijanju plamenjače paprike.

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Pomoćnice (*Solanaceae*) - paprika - za suzbijanje pepelnice (*Leveillula taurica*) u koncentraciji 0,02-0,05% (20-50 g na 100 litara vode). Stroby® WG se primjenjuje preventivno ili na početku zaraze.

MEHANIZAM DJELOVANJA:

Kemijski spoj Strobilurin A proizvodi gljiva Strobilurus tenaceus koja raste na palim iglicama bora. Producijom Strobilurina A gljiva Strobilurus tenaceus je sposobna držati dalje od sebe druge gljivice koje bi joj inače mogle oduzeti hranjive tvari. Pripravak Stroby® WG djeluje na nivou mitohondrija. Aktivna tvar se širi po površini lista i djelomično ulazi u list, što je čini termostabilnom i izuzetno otpornom na ispiranje. Unutar samog lista širenje je ograničeno, zato je pripravak označen kao kvazi-sistemik.

KARENCA: 3 dana





Chromosul 80®¹

AKTIVNA TVAR: sumpor 800 g/kg

FORMULACIJA: vodotopive granule (WG)

Chromosul 80®¹ je kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje pepelnice u paprići (*Leveillula taurica*).

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Chromosul 80®¹ namijenjen je za suzbijanje bolesti paprike - pepelnice (*Leveillula taurica*) u koncentraciji 0,3-0,4% (30-40 g/l i vode).

PREDNOSTI:

Uporaba pripravaka Chromosul 80®¹ pruža brojne prednosti zbog svoje formulacije u obliku močivih samodispergirajućih mikrogranula:

- pripravak se jednostavno koristi
- nema prašine
- lako se dozira
- lako i brzo se otapa u vodi
- nema taloženja u prskalici zbog visoke kvalitete koloida
- nema začepljenja dizni
- ne pjeni se
- ispunjava ekološke zahtjeve
- može se miješati sa većinom drugih pripravaka
- nema ožegotina na lišću i izbojima
- nije štetan za pčele

POSEBNA NAPOMENA:

Najbolje rezultate ostvaruje ukoliko se koristi preventivno (prije početka razvoja bolesti).

KARENCA: 14 dana



Signum®

AKTIVNA TVAR: 267 g/kg boskalid i 67 g/kg piraklostrobin

FORMULACIJA: vodotopive granule (WG)

Signum® je kombiniran sistemski preventivni fungicid vrlo širokog spektra djelovanja. Kombinacija novih aktivnih tvari osigurava visok stupanj zaštite i dugotrajan učinak. Signum® je više od obične zaštite bilja! Signum® je jedinstveni pripravak s **AgCelence®** efektom od kojeg možete očekivati:

1. veći prinos
2. bolju toleranciju na stres
3. bolju kvalitetu
4. povećanu uspješnost proizvodnje

SPEKTAR DJELOVANJA:

Pepelnica (*Leveillula taurica*)

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

0,1 - 0,15%. Dozvoljeni broj tretiranja 3 puta.

KARENCA:

7 dana za slatke sorte, 21 dan za ljute sorte



Polyram® DF

AKTIVNA TVAR: metiram 70%

FORMULACIJA: močive samodispergirajuće mikrogranule - koncentrat za suspenziju

Polyram® DF je kontaktni (preventivni) fungicid iz skupine ditiokarbamata namijenjen suzbijanju plamenjače paprike.

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Polyram® DF namijenjen je za suzbijanje bolesti paprike - plamenjača paprike - tretiranje potrebno obaviti kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu. Dozvoljena su najviše 2 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 10-14 dana; u količini 0,2 g/m² u 40-60 ml vode/m².

KARENCA: OVP



Alverde®

AKTIVNA TVAR: 240 g/l metaflumizon

FORMULACIJA: tekuća koncentrirana suspenzija (SC)

Alverde® je novi sistemski insekticid s kontaktnim i želučanim djelovanjem. Zbog novog mehanizma djelovanja na živčani sustav kukaca pripravak Alverde® odlično se uklapa u antirezistentne strategije pri suzbijanju štetnika rajčice.

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Sovice: chrysodeixis chalcites (*Chrysodeixis chalcites*), žuta kukuruzna sovica (*Heliothis armigera*) i sovica (*Spodoptera spp.*), molci: južnoamerički moljac rajčice (*Tuta absoluta*). Primjena u količini 1 l/ha ili 100 ml/hl.

VRIJEME PRIMJENE:

Tretirati u razdoblju polaganja jajašaca, prije otvaranja jajašaca. Može se primijeniti na istoj površini jedan puta godišnje;

- lisne uši (*Myzus persicae* i *Aphis spp.*) u količini 150 ml/ha. Može se primijeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;

- gusjenica sovica pozemljuša (*Agrotis spp.*) i sovica (*Spodoptera spp.*) u količini 150 ml/ha. Može se primijeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje. Kod suzbijanja sovica pozemljuša sredstvo je potrebno primijeniti

KARENCA:

3 dana

Fastac® 10 EC

AKTIVNA TVAR: 100 g/l alfa-cipermetrin

FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

Fastac® 10 EC je formuliran u obliku koncentrata za emulziju (EC) koja sadrži 100 g/l aktivne tvari alfa-cipermetrina; ovaj se spoj smatra najaktivnijim piretroidom. Zbog toga je Fastac® 10 EC registriran u velikom broju usjeva za suzbijanje širokog spektra štetnika koji sišu i grizu. On je visokoučinkovit insekticid širokog spektra s vrlo brzim djelovanjem u vrlo niskim dozama. Primjenjuje se u dozi 150 - 300 ml/ha ovisno o štetniku.

PRIMJENA:

- staklenički štitasti moljac (*Trialeurodes vaporariorum*) i duhanov štitasti moljac (*Bemisia tabaci*) u količini 300 ml/ha. Može se primijeniti na istoj površini jedan puta godišnje;

- lisne uši (*Myzus persicae* i *Aphis spp.*) u količini 150 ml/ha. Može se primijeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;

- gusjenica sovica pozemljuša (*Agrotis spp.*) i sovica (*Spodoptera spp.*) u količini 150 ml/ha. Može se primijeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje. Kod suzbijanja sovica pozemljuša sredstvo je potrebno primijeniti

KARENCA: 7 dana



predvečer na vlažnu zemlju jednim tretiranjem tla prije sjetve kulture ili jednim tretiranjem vrata biljke nakon što se primijete prva oštećenja.


PREDNOSTI:

- Fastac® 10 EC je učinkovit protiv većine ekonomski značajnih štetnika
- suzbija sve razvojne stadije insekata
- uspješan protiv insekata rezistentnih na druge insekticide
- ima repelentno i "anti-feeding" djelovanje
- upotrebljava se u velikom broju kultura
- ne pokazuje fitotoksičnost u preporučenim dozama
- duže djeluje nego klasični insekticidi
- visoko je otporan na ispiranje kišom
- niske doze umanjuju utjecaj na okoliš
- neznatno opasan za vrste koje nisu objekt tretiranja

KARENCA:

- prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne pojaseve i spriječiti kontaminaciju voda (vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda) tretirajući na najmanje 20 m udaljenosti
- u tijeku godine na istoj površini ili nasadu može se primjeniti najviše dva puta
- ne smije se miješati s bordoškom suspenzijom, lužnatim preparatima i herbicidima

KARENCA: 7 dana



PROGRAMI ZAŠTITE U POVRTLARSTVU

Program zaštite krastavca

Acrobat® MZ WG

AKTIVNA TVAR: 90 g/kg dimetomorf i 600 g/kg mankozeb

FORMULACIJA: vodotopive granule (WG)

Acrobat® MZ WG je preventivni i kurativni fungicid nove generacije, pripravak kontaktnog i dubinskog djelovanja, izuzetno učinkovit u suzbijanju plamenjače.

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Plamenjača (*Pseudoperonospora cubensis*) za kratko vrijeme može prouzročiti potpuno propadanje krastavaca. Acrobat® MZ WG izvršnim preventivnim i antisporulantrnim djelovanjem čuva krastavce od plamenjače. Ne koristi se u krastavcima za kiseljenje (kornišoni). Doza: 2 kg/ha.

KARENCA: 7 dana

Chromosul 80®¹

AKTIVNA TVAR: sumpor 800 g/kg

FORMULACIJA: vodotopive granule (WG)

Chromosul 80®¹ je kontaktni preventivni fungicid s popratnim akaricidnim djelovanjem na grinje šiškarice (*Eryophyidae*).

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Chromosul 80®¹ namijenjen je za suzbijanje bolesti paprike - pepelnice (*Oidium spp*) u koncentraciji 0,3-0,4% (30-40 g/10 l vode).

PREDNOSTI:

Uporaba pripravaka Chromosul 80®¹ pruža brojne prednosti zbog svoje formulacije u obliku močivih samodispergirajućih mikrogranula:

- pripravak se jednostavno koristi
- nema prašine
- lako se dozira
- lako i brzo se otapa u vodi

- nema taloženja u prskalici zbog visoke kvalitete koloida
- nema začepljenja dizni
- ne pjeni se
- ispunjava ekološke zahtjeve
- može se miješati sa većinom drugih pripravaka
- nema ožegotina na lišću i izbojima
- nije štetan za pčele

POSEBNA NAPOMENA:

Najbolje rezultate ostvaruje ukoliko se koristi preventivno (prije početka razvoja bolesti).

KARENCA: 7 dana

Stroby® WG

AKTIVNA TVAR: 500 g/kg krezoksim-metil

FORMULACIJA: vodotopive granule (WG)

Stroby® WG je visokoučinkovit fungicid s protektivnim, kurativnim i eradicativnim djelovanjem namijenjen suzbijanju plamenjače krastavca.

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Za suzbijanje pepelnice (*Sphaerotheca fuliginea* i *Erysiphe cichoracearum*) u koncentraciji 0,02-0,03% (20-30 g na 100 litara vode). Stroby® WG se primjenjuje preventivno ili kod prvih simptoma zaraze.

MEHANIZAM DJELOVANJA:

Kemijski spoj Strobilurin A proizvodi gljiva Strobilurus tenacellus koja raste na palim iglicama bora. Producijom Strobilurina A gljiva Strobilurus tenacellus je sposobna držati dalje od sebe druge gljivice koje bi joj inače mogle oduzeti hranjive tvari. Pripravak Stroby® WG djeluje na nivou mitohondrija. Aktivna tvar se širi po površini lista i djelomično ulazi u list, što je čini termostabilnom i izuzetno otpornom na ispiranje. Unutar samog lista širenje je ograničeno, zato je pripravak označen kao kvazi-sistemik.

KARENCA: 3 dana

Fastac® 10 EC

AKTIVNA TVAR: 100 g/l alfa-cipermetrin

FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

Fastac® 10 EC je formuliran u obliku koncentrata za emulziju (EC) koja sadrži 100 g/l aktivne tvari alfa-cipermetrina; ovaj se spoj smatra najaktivnijim piretroidom. Zbog toga je Fastac® 10 EC registriran u velikom broju usjeva za suzbijanje širokog spektra štetnika koji sišu i grizu. On je visokoučinkovit insekticid širokog spektra s vrlo brzim djelovanjem u vrlo niskim dozama. Primjenjuje se u dozi 150 - 300 ml/ha ovisno o štetniku.

PRIMJENA:

- staklenički štitasti moljac (*Trialeurodes vaporariorum*) i duhanov štitasti moljac (*Bemisia tabaci*) u količini 300 ml/ha. Može se primijeniti na istoj površini jedan puta godišnje;
- lisne uši (*Myzus persicae* i *Aphis spp.*) u količini 150 ml/ha. Može se primijeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje;
- gusjenica sovica pozemljuša (*Agrotis spp.*) i sovica (*Spodoptera spp.*) u količini 150 ml/ha. Može se primijeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje. Kod suzbijanja sovica pozemljuša sredstvo je potrebno primijeniti predvečer na vlažnu zemlju jednim tretiranjem tla prije sjetve kulture ili jednim tretiranjem vrata biljke nakon što se primijete prva oštećenja.

PREDNOSTI:

- Fastac® 10 EC je učinkovit protiv većine ekonomski značajnih štetnika
- suzbija sve razvojne stadije insekata
- uspiješan protiv insekata rezistentnih na druge insekticide
- ima repelentno i "anti-feeding" djelovanje
- upotrebljava se u velikom broju kultura
- ne pokazuje fitotoksičnost u preporučenim dozama
- duže djeluje nego klasični insekticidi
- visoko je otporan na ispiranje kišom
- niske doze umanjuju utjecaj na okoliš
- neznatno opasan za vrste koje nisu objekt tretiranja

KARENCA:

- prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne pojaseve i sprječiti kontaminaciju voda (vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda) tretirajući na najmanje 20 m udaljenosti
- u tijeku godine na istoj površini ili nasadu može se primjeniti najviše dva puta
- ne smije se miješati s bordoškom suspenzijom, lužnatim preparatima i herbicidima

KARENCA: 7 dana



Program zaštite povrća za male namjene

Signum® proširenje za male namjene

Primjena za male namjene na:

- **maslačku** za suzbijanje rizoktonije (*Rhizoctonia spp.*) u količini 1,5 kg/ha. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji,
- **lukolisnoj kozjoj bradi** (bijeli korijen, vrtni turovac) za suzbijanje pepelnice (*Oidium spp.*) i koncentrične pjegavosti (*Alternaria spp.*) u količini 0,4 kg/ha. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji,
- **endiviji na otvorenom i u zaštićenom prostoru**, za suzbijanje bijele truleži (*Sclerotinia spp.*), sive pljesni (*Botrytis spp.*) i rizoktonije (*Rhizoctonia spp.*) u količini 1,5 kg/ha, s razmakom između tretiranja od 7-10 dana, može se primjeniti odmah nakon sadnje. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji,
- **cikoriji na otvorenom i u zaštićenom prostoru**, za suzbijanje bijele truleži (*Sclerotinia spp.*), sive pljesni (*Botrytis spp.*) i rizoktonije (*Rhizoctonia spp.*) u količini 1,5 kg/ha. Dopuštena je jedna primjena u vegetaciji,
- **poriluku** za suzbijanje:
 - a) pjegavosti lišća (*Alternaria porii*) u količini 0,6 kg/ha,
 - b) plamenjače (*Peronospora destructor*) u količini 1,0 kg/ha.
- **blitvi na otvorenom i u zaštićenom prostoru**, za suzbijanje sive pljesni (*Botrytis spp.*) u količini 1,5 kg/ha, s razmakom između tretiranja od 7-10 dana. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji,
- **češnjaku, luku kozjaku (ljutiku) na otvorenom prostoru**, za suzbijanje sive



pljesni (*Botrytis spp.*), hrda (*Puccinia allii*) i bijele truleži (*Sclerotium cepivorum*) u količini 1,5 kg/ha, u vremenskom razmaku između tretiranja od 7 dana. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji,

■ **patlidžanu na otvorenom i u zaštićenom prostoru**, za suzbijanje pepelnice (*Leveillula taurica*) i sive pljesni (*Botrytis spp.*) u količini 1,5 kg/ha s razmakom između tretiranja od 7- 10 dana. Dopuštene su maksimalno tri primjene u vegetaciji,

■ **začinskom bilju na otvorenom i u zaštićenom prostoru**, za suzbijanje sive pljesni (*Botrytis spp.*) i bijele truleži (*Sclerotinia spp.*) u količini 1,5 kg/ha, s razmakom između tretiranja od 7-10 dana. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji,

■ **ukrasnom bilju i cvijeću u zaštićenom prostoru**, za suzbijanje sive pljesni (*Botrytis spp.*) i pepelnice (*Oidium spp.*) u količini 1,0-1,5 kg/ha s razmakom između tretiranja od 7-10 dana. Dopuštene su maksimalno tri primjene u vegetaciji,

■ **ukrasnom drveću i grmlju** za suzbijanje:

- a) pjegavosti (*Septoria spp.*) u količini 1,0 kg/ha Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji,
- b) pepelnice (*Oidium spp.*) u količini 0,6 kg/ha Dopuštene su maksimalno tri primjene u vegetaciji.

Karenca

3 dana za patlidžan; 14 dana za maslačak, lukolisnu kozju bradu (bijeli korijen, vrtni turovac), endiviju, blitvu, češnjak, luk kozjak i začinsko bilje; 21 dan za poriluk i cikoriju na otvorenom prostoru; 28 dana za cikoriju u zaštićenom prostoru.

Nije primjenjiva za ukrasno bilje i cvijeće te za ukrasno drveće i grmlje.





Tehnička podrška

Agrotim - BASF Croatia d.o.o.

Maria Mikas

Tehnička podrška

- Zadarska županija
- Šibensko-kninska županija
- Splitsko-dalmatinska županija
- Dubrovačko-neretvanska županija
- Hercegovina

Mob.: +385 99 6000 020

E-mail: maria.katalinic@basf.com



Robert Baćaj

Tehnička podrška

- Virovitičko-podravska županija
- Krapinsko-zagorska županija
- Varaždinska županija
- Koprivačko-križevačka županija
- Bjelovarsko-bilogorska županija
- Međimurska županija

Mob.: +385 98 481 435

E-mail: robert.bacaj@basf.com



Martin Androšević

Tehnička podrška

- Požeško-slavonska županija
- Brodsko-posavska županija
- Osječko-baranjska županija
- Vukovarsko-srijemska županija

Mob.: +385 99 4818 505

E-mail: martin.androsevic@basf.com



Petar Šoda

Tehnička podrška

- Zagrebačka županija
- Sisačko-moslavačka županija
- Karlovačka županija
- Primorsko-goranska županija
- Ličko-senjska županija
- Istarska županija

Mob.: +385 98 251 076

E-mail: petar.soda@basf.com



Nikola Ettinger

Tehnički menadžer

Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb


Tel.: +385 1 600 00 21

Faks: +385 1 600 00 90

E-mail: nikola.ettinger@basf.com



Za sva pitanja i savjete
slobodno nazovite naš tim
za podršku. **Tu smo za vas!**





www.agro.bASF.hr

Pronadite sve informacije o našim proizvodima, programima zaštite različitih kultura i novostima u svijetu zaštite bilja.



Distributer:

Chromos Agro d.d.

Radnička cesta 173n, 10002 Zagreb
T 01 6040 356, 6040 357, F 01 6040 399
www.chromos-agro.hr

 Chromos Agro d.d.

Zastupnik i distributer:

BASF Croatia d.o.o.

I. Lučića 2a, 10000 Zagreb
T 01 6000 000, F 01 6000 090
www.agro.bASF.hr