


The BASF logo, consisting of a white square with a smaller white square inside, followed by the letters "BASF" in white, all on a green background.


□ - BASF

We create chemistry

ZAŠTITA PŠENICE I JEČMA

BASF. JER BIRAM SIGURNOST.





Duett® Turbo

Fungicid na bazi Revysol® tehnologije. Suzbija najvažnije bolesti lista i pozitivno djeluje na kondiciju biljke. Zahvaljujući fleksibilnoj dozi primjene može se prilagoditi različitim uvjetima zaraze u polju.

- ✓ Jednostavan i pouzdan izbor za prvi tretman pšenice
- ✓ Učinkovito i ekonomski isplativo rješenje
- ✓ Osnova za stabilne prinose



Aktivna tvar:	Revysol®, 100 g/L, Krezoksim-metil, 150 g/L
Usjevi:	Pšenica, ječam, raž, pšenoraž
Količina primjene:	0,6 - 1 L/ha
Vrijeme primjene:	Od kraja busanja (BBCH 30) do završetka cvatnje (BBCH 69)
Preporučeno vrijeme primjene:	Od drugog koljenca do faze lista zastavice
Spektar djelovanja:	Pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Zymoseptoria tritici</i>), smeđa hrđa (<i>Puccinia triticina/recondita</i>), žuta hrđa (<i>Puccinia striiformis</i>), žuto smeđa pjegavost (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), parazitsko polijeganje (<i>Oculimacula yallundae</i>), fuzarijska palež klasa (<i>Fusarium spp.</i>), mrežasta pjegavosti (<i>Pyrenophora teres</i>)

Priaxor® EC

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim djelovanjem. Omogućuje zaštitu novoizraslih listova zahvaljujući jedinstvenoj pokretljivosti u biljci. Suzbija pjegavosti, hrđe i pepelnicu u pšenici, a istovremeno predstavlja rješenje koje je bez premca u ječmu protiv mrežaste pjegavosti i ramularije.

- ✓ Idealan izbor za pšenicu i ječam
- ✓ Dugotrajno djelovanje i zaštita novog porasta
- ✓ Osigurava zdravije i zelenije biljke, duže nalijevanje zrna i veći rod



Aktivna tvar:	Fluksapiroksad, 75 g/L i piraklostrobin, 150 g/L
----------------------	--

Usjevi:	Pšenica, durum pšenica, ječam, raž, pšenoraž, pir, zob
----------------	--

Preporučena količina primjene:	0,8 – 1,0 L/ha
---------------------------------------	----------------


Vrijeme primjene:	Od kraja busanja (BBCH 30) do početka klasanja (BBCH 49)
--------------------------	--

Spektar djelovanja:	Pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i>), hrđa (<i>Puccinia spp.</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), ramularijska pjegavost lista (<i>Ramularia collo-cygni</i>), smeđa hrđa (<i>Puccinia hordei</i>), pepelnica zobi (<i>Blumeria graminis</i>), narančasta hrđa zobi (<i>Puccinia coronata</i>)
----------------------------	---

Revycare®

Fungicid na bazi revolucionarne aktivne tvari Revysol® je kompletno rješenje za zaštitu pšenice i ječma. Osigurava jednostavniju i sigurniju zaštitu u svim uvjetima proizvodnje. Primjenjen na početku cvatnje štiti klas ali i za prinos najvažnije listove čime je omogućeno kvalitetnije i duže nalijevanje zrna.

- ✓ Kompletno rješenje za dugotrajnu zaštitu pšenice i ječma
- ✓ Zaustavlja bolest i nakon infekcije
- ✓ Učinkovit i na niskim temperaturama, otporan na UV zračenje i ispiranje kišom




Aktivna tvar:	Revysol® 100 g/L, piraklostrobin, 100 g/L
Usjevi:	Pšenica, ječam, raž, pšenoraž
Količina primjene:	0,75 - 1,0 L/ha
Vrijeme primjene:	Od kraja busanja (BBCH 30) do kraja cvatnje (BBCH 69)
Spektar djelovanja:	Pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria</i> = <i>Zymoseptoria tritici</i>), smeđa hrđa (<i>Puccinia triticina/recondita</i>), žuta hrđa (<i>Puccinia striiformis</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), ramularijska pjegavost (<i>Ramularia collo-cygni</i>), palež klasa (<i>Fusarium spp.</i>)

Caramba®

Caramba® je fungicid na bazi aktivne tvari metkonazol, koja slovi za jednu od najučinkovitijih rješenja za zaštitu žitarica protiv fuzarijuma.

- ✓ Prvoklasna zaštita klasa od bolesti (*Fusarium spp.*, *Septoria spp.*)
- ✓ Učinkovito smanjenje količine mikotoksina u zrnu (DON)
- ✓ Isplativo rješenje za visok prinos i kvalitetu zrna



Aktivna tvar:	Metkonazol 60 g/L
----------------------	-------------------

Usjevi:	Pšenica, ječam, uljana repica
----------------	-------------------------------

Količina primjene:	1,2 - 1,5 L/ha
---------------------------	----------------

Vrijeme primjene u pšenici:	Od klasanja do početka cvatnje
------------------------------------	--------------------------------

Spektar djelovanja:	Pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), smeđa pjegavost lišća i pljevica (<i>Septoria tritici</i> i <i>Stagnospora nodorum</i>), hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), palež klasa (<i>Fusarium spp.</i>), siva pjegavost ječma (<i>Rhynchosporium secalis</i>) i mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>)
----------------------------	---

Biathlon® 4D

Najkompletniji herbicid u pšenici, ječmu i zobi koji suzbija najznačajnije širokolisne korove, uključujući broćiku, mrtvu koprivu, kamilicu, mak, samoniklu uljanu repicu i suncokret.

- ✓ Bez konkurencije u borbi protiv najotpornijih korova
- ✓ Biathlon® 4D je idealan partner proizvodima koji suzbijaju travne korove (pinoksaden ili piroksulam)
- ✓ Fleksibilno vrijeme primjene –od trećeg lista do zastavice



Aktivna tvar:	Tritosulfuron 714 g/kg i Florasulam 54 g/kg
Usjevi:	Pšenica, ječam, raž, pšenoraž, zob, pir
Količina primjene:	40 - 55 g/ha
Vrijeme primjene:	Od stadija razvijena 3 lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 13-39). Jednogodišnji širokolisni korovi najosjetljiviji su u stadijima razvoja 2-4 lista, a ljepljiva broćika (<i>Galium aparine</i>) u stadijima razvoja 3-5 listova
Spektar djelovanja:	Mrtva kopriva (<i>Lamium purpureum</i>), kamilica (<i>Matricaria spp.</i>), mišjakinja (<i>Stellaria media</i>), broćika (<i>Galium spp.</i>), osjak (<i>Cirsium arvense</i>), slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), štavelj (<i>Rumex spp.</i>), poljski mak (<i>Papaver rhoeas</i>), samonikla uljana repica i suncokret (ALS tolerantni i konvencionalni) i drugi

Medax® Top

Najnovija generacija regulatora rasta kojim osiguravamo ujednačenost usjeva, veću stabilnost, izostanak polijeganja i manje gubitke u žetvi i u konačnici stabilnije prinose.

- ✓ Skraćuje i zadebljava stabljiku
- ✓ Jedini regulator rasta jednako učinkovit pri višim i nižim temperaturama
- ✓ Potiče rast korijena, bolje usvajanje hranjiva i povećava snagu biljke



Aktivna tvar:	Mepikvat 300 g/L, proheksadion 50 g/L
----------------------	---------------------------------------

Usjevi:	Pšenica, ječam, zob, raž, pšenoraž
----------------	------------------------------------

Količina primjene:	0,6 – 1,0 L/ha
---------------------------	----------------

Vrijeme primjene:	Od početka vlatanja do stadija lista zastavice (BBCH 30 - 39)
--------------------------	---

Systiva®

Jedini fungicid koji se nanosi na sjeme, a štiti i sjeme i list, od jeseni pa do ranog proljeća. Istovremeno Systiva® osigurava jači razvoj korijena, intenzivnije busanje, bolji sklop i povećava otpornost na nepovoljne vanjske uvjete.

- ✓ Jedina prava preventiva u sprječavanju rane pojave bolesti u proljeće
- ✓ Zdravije biljke i manje rizika za kašnjenje s prvim fungicidnim tretmanom
- ✓ Investicija koja se uvijek isplati



Aktivna tvar:	Fluksapiroksad® 333 g/L
----------------------	-------------------------

Usjevi:	Ozima, jara i tvrda (durum) pšenica, ozimi i jari ječam, pšenoraž, raž, zob
----------------	---

Količina primjene:	100 - 150 ml/100 kg sjemena
---------------------------	-----------------------------

Vrijeme primjene:	Prije sjetve, tretiranjem sjemena
--------------------------	-----------------------------------

Spektar djelovanja:	Smrdljiva snijet pšenice (<i>Tilletia caries</i>), snježna plijesan (<i>Microdochium nivale</i>), fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), smeđa hrđa pšenice (<i>Puccinia recondita</i>), žuta hrđa pšenice (<i>Puccinia striiformis</i>), prašna snijet ječma (<i>Ustilago nuda</i>), prugavost ječma (<i>Pyrenophora graminea</i>), snježna plijesan (<i>Microdochium nivale</i>), mrežasta pjegavost ječma (<i>Pyrenophora teres</i>), smeđa hrđa ječma (<i>Puccinia hordei</i>), siva pjegavost lista ječma (<i>Rhynchosporium secalis</i>), ramularijska pjegavost ječma (<i>Ramularia collo-cygni</i>), snježna plijesan pšenoraži, raži i zobi (<i>Microdochium nivale</i>)
----------------------------	---

Vaša podrška na terenu

**VEDRAN IŠASEGI**

Menadžer prodaje
Hrvatska

☎ +385 99 6000 071

✉ vedran.isasegi@basf.com

**BERNARD KALAC**

Predstavnik prodaje
Baranja, Vukovarsko-srijemska,
Brodsko-posavska (istočni dio)

☎ +385 99 5400 030

✉ bernard.kalac@basf.com

**IVAN NAIMAREVIĆ**

Predstavnik prodaje
Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska,
Sisačko-moslavačka, Zagrebačka i Grad Zagreb (istok)

☎ +385 99 6000 020

✉ ivan.naimarevic@basf.com

**ANTE VOLAREVIĆ**

Predstavnik prodaje
Zagrebačka i Grad Zagreb (zapad), Međimurska,
Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Karlovačka,
Ličko-senjska, Primorsko-goranska, Istra i Dalmacija

☎ +385 91 6017 005

✉ ante.volarevic@partners.basf.com

**SEBASTIJAN LJEVAR**

Predstavnik prodaje
Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska,
Brodsko-posavska (zapadni dio), Osječko-baranjska
(Našice, Donji Miholjac i Valpovo)

☎ +385 99 6000 078

✉ sebastijan.ljevar@partners.basf.com

Skeniraj i zaprati
BASF Hrvatska



Web
stranica



YouTube
kanal



Facebook
stranica



Pravilna
upotreba pesticida



We create chemistry



BASF CROATIA D.O.O.
Slavonska avenija 1b
HR — 10 000 Zagreb
+385 1 60 000 20
+385 1 60 000 90

agro.basf.hr

Ova brošura je savjetodavnog karaktera. Sredstva za zaštitu bilja upotrebljavajte pažljivo.
Prije upotrebe obavezno pročitajte upute za upotrebu. ® — registrirani zaštićeni znak tvrtke BASF SE.