

Priručnik za zaštitu voća i povrća



Tvrtka Bayer CropScience zapošljava visoko obrazovane stručnjake osposobljene za:

stručne savjete	savjetovanje o dozama i karencama, uporabi primjerenih zaštitnih sredstava (rukavica, naočala, zaštitne odjeće)
edukaciju kupaca	pripremu programa zaštite poljoprivrednih usjeva (integrirane zaštite, antirezistentne strategije)
determinaciju štetočina, bolesti i korova	prepoznavanje fitotoksičnosti
pridržavanje propisane uporabe registriranih proizvoda	savjetovanje o odgovarajućim kombinacijama zaštitnih sredstava i praktično savjetovanje na terenu
testiranje koncentracije dušika u vašim usjevima	ispitivanje pH vrijednosti tla na vašim poljima

U zdravom voću zdrav duh!



Što je Luna® Experience?

Luna® Experience je novi kombinirani fungicid širokog spektra djelovanja s primjenom u vinovoj lozi, voću i povrću.

Aktivna tvar: ■ Fluopiram

■ Tebukonazol

Formulacija: SC, tekuća koncentrirana tekućina

Pakiranje: 100 ml, 1 L

Primjena:



KULTURA	BOLEST	DOZA l/ha	KARENCA	BR. PRIMJENA
JABUKA	peplnica, krstavost, alternarijska pjegavost, smeđa pjegavost	0,25 - 0,75	14	2
KRUŠKA				
BRESKVA, TREŠNJA	peplnica	0,5	3	3
	<i>Monilia</i> spp.	0,25 - 0,75		2
VINOVA LOZA	peplnica	0,375	14	3
LUK, ČEŠNJAK	rđa, smeđa pjegavost	0,6 - 1	7	1
ŠPAROGA	rđa	0,75	OVP	2


Investirajte u budućnost svojih usjeva

S Luna® Experience ostvarujemo više proizvoda po mjeri kupca.

Od 100 plodova uzgojenih u voćnjaku koliko će ih dospjeti do krajnjeg korisnika u dobrom stanju.

- bolja kvaliteta
- duži rok trajanja
- manje gubitaka
- bolja tržišnost

Gubici u polju



Kontrola

Gubici nakon berbe



Standardni program

Proizvod po mjeri kupca



Luna program



Vrijeme primjene



- Širok spektar bolesti
- Izvrsno štiti lišće, izboje i plodove
- Kontrola bolesti u skladištu



- Izvrsna zaštita od monilije
- Osigurava više plodova koji se duže i sigurnije skladište
- Kratka karenca: 3 dana



POVRĆE

KULTURA	CILJ TRETIRANJA	PROIZVOD	DOZA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE	
POVRĆE	sve vrste štetnih puževa u zatvorenom prostoru (staklenici, plastenici) i u polju	MESUROL [®] Granulat	3-5 kg/ha	21 dan	Prvo rasipanje granula samo oko biljaka treba obaviti kada su puževi mali (veličina do 1 cm).	
	rovac				Granule rasipati samo u 6. i 7. mjesecu kada rovcu izlaze na površinu tla.	
KORABA	plamenjača	INFINITO	1,6 l/ha za male namjene	14 dana	Nakon trećeg pravog lista.	
	lisna uš	calypso SC 480	0,2 l/ha za male namjene	7 dana na otvorenom	Suzbijanje je potrebno obaviti na početku napada štetnika. Sredstvo se smije primijeniti 2 puta godišnje.	
	kukci koji krizu (osim gusjenica leptira)					
KRUMPIR	desikacija cime krumpira	blasitla 15	2,5-3 l/ha	14 dana	2-3 tjedna prije vađenja gomolja.	
	jednogodišnji travni korovi: obični koštan, muharike, obična svračica i divlje proso	Plateen WG 41,5	2-2,5 kg/ha	56 dana	Sredstvo se primjenjuje nakon sjetve ili sadnje, a prije nicanja usjeva.	
	jednogodišnji širokolisni korovi: bijela loboda, šćir, ambrozija, veliki dvornik i dr.					
	suzbijanje sjemenskih širokolisnih i nekih uskolisnih korova	sencor WG 70	0,75-1,5 kg/ha	42 dana	Nakon sadnje, a prije nicanja krumpira.	
	plamenjača krumpira		Antracol WG 70	2,5 kg/ha	14 dana	U vegetaciji preventivno.
			Antracol Combi	2,5 kg/ha	14 dana	
			INFINITO	1,2 -1,6 l/ha	14 dana	
			Melody duo WP 66,8	3 kg/ha	14 dana	
	koncentrična pjegavosti lišća krumpira		Antracol WG 70	2,5 kg/ha	14 dana	U vegetaciji preventivno, a najviše tri puta.
			Antracol Combi	2,5 kg/ha	14 dana	
			Melody duo WP 66,8	3 kg/ha	14 dana	
	krumpirova zlatica		calypso SC 480	Jednokratno 0,1 l/ha ili split 0,05 l/ha + 0,05 l/ha nakon ponovne pojave štetnika	21 dan	Po pojavi štetnika.
			Confidor SL 200	0,25-0,5 l/ha	42 dana	
			decis 2,5 EC	0,3 l/ha	7 dana	
			proteus	0,5-0,7 l/ha	21 dan	
lisne uši		decis 2,5 EC	0,3-0,5 l/ha	7 dana	Po pojavi štetnika najviše 2 puta u razmacima od 14 dana.	
breskvina zelena uš						
mlječikina lisna uš						
duhanov trips						
krumpirov moljac						
BATAT	suzbijanje sjemenskih širokolisnih i nekih uskolisnih korova	sencor WG 70	0,35-1 kg/ha	7 dana	Po pojavi štetnika.	
HREN	koncentrična pjegavost	NATIVO 75 WG	0,3 kg/ha za male namjene	21 dan	Preventivno tretirati od faze pred cvatnju do prije berbe, najviše tri puta.	
MRKVA	palež lišća	NATIVO 75 WG	0,3 kg/ha za male namjene	21 dan	Primijeniti kod prvih simptoma zaraze.	
	bijela trulež					
	pepelnica					
	lisna uš	decis 2,5 EC	0,3-0,5 l/ha	7 dana	Po pojavi štetnika najviše 3 puta u razmacima od 14 dana.	
	lisni miner					
	kupusni buhač					
lisna uš	calypso SC 480	0,2 l/ha za male namjene	7 dana na otvorenom	Suzbijanje je potrebno obaviti na početku napada štetnika. Sredstvo se smije primijeniti 2 puta godišnje.		
CELER KORJENAŠ I CELER REBRAŠ	lisna uš	calypso SC 480	0,2 l/ha za male namjene	14 dana na otvorenom	Suzbijanje je potrebno obaviti na početku napada štetnika. Sredstvo se smije primijeniti 2 puta godišnje.	

POVRĆE

	KULTURA	CILJ TRETIRANJA	PROIZVOD	DOZA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE			
KORJENASTO I GOMOLJASTO POVRĆE	ŠPAROGA	hrđa	Luna EXPERIENCE	0,75 L/ha	Osigurana vremenom primjene	Nakon berbe.			
		šparogina zlatica	calypso SC 480	0,2 l/ha		Primjeniti po pojavi štetnika, a nakon berbe šparoga. Razmak između prskanja 21 dan.			
		šparogina zlatica	decis 2,5 EC	0,3-0,5 l/ha		Kod mladih šparoga koje nisu u rodu, kod šparoga u rodu nakon berbe. Najviše 2 puta u razmaku od 14 dana.			
		duhanov trips							
		lisna uš							
	ROTKVICA	lisna uš	decis 2,5 EC	0,3-0,5 l/ha	7 dana	Po pojavi štetnika najviše 3 puta u razmacima od 14 dana.			
lisni miner									
kupusni buhač									
PLODOVITO POVRĆE	RAJČICA	suzbijanje sjemenskih širokolisnih i nekih uskolisnih korova	sencor WG 70	0,5-0,75 kg/ha	42 dana	8-10 dana nakon presađivanja.			
		polijeganje nasada	PREVICUR ENERGY	6 ml/m ² 2-3 l/ha	Osigurana je dozvoljenim vremenom primjene	U rasadnicima jedno tretiranje prilikom sjetve ili u razdvojenoj primjeni, prvi put prilikom sjetve a drugi put nakon dva tjedna.			
		koncentrična pjegavost	Melody duo WP 66,8	2,5 kg/ha		10 dana za rajčicu u zaštićenom prostoru, 14 dana za rajčicu u polju	U vegetaciji preventivno.		
			Antracol WG 70	3 kg/ha	14 dana na otvorenom, 28 dana u zaštićenom.				
		plamenjača	Melody duo WP 66,8	2,5 kg/ha	10 dana za rajčicu u zaštićenom prostoru, 14 dana za rajčicu u polju	U vegetaciji preventivno.			
			Antracol WG 70	3 kg/ha	14 dana na otvorenom, 28 dana u zaštićenom.				
		pepelnica	NATIVO 75 WG	0,3 kg/ha	3 dana	U vegetaciju preventivno, a najviše tri puta u razmacima od 8-12 dana.			
		siva plijesan	TELDOR SC 500	1-2 l/ha	3 dana	Primjena na otvorenom. Prvi puta kod visine biljaka do 50 cm.			
		bijela trulež							
		odrasli stadij štitastog moljca	Confidor SL 200	1 l/ha	14 dana	Po pojavi štetnika.			
		lisne uši	calypso SC 480	0,45 l/ha	3 dana	Po pojavi štetnika.			
		ujednačeno dozrijevanje i lakša berba	Ethrel	2 l/ha	7 dana	Tretiranje treba obaviti u početku dozrijevanja rajčica.			
		breskvina zelena uš	decis 2,5 EC	0,3-0,5 l/ha na otvorenom, 0,5-0,7 l/ha u zaštićenom	3 dana	Po pojavi štetnika najviše 3 puta u razmacima od 14 dana na otvorenom, 4 puta u razmacima od 7 dana u zaštićenom.			
		pamukova lisna uš							
		žuta kukuruzna soвица							
		duhanov trips							
		kukuruzni moljac							
		gama soвица							
		stjenica Nezara viridula					0,3-0,5 l/ha na otvorenom	3 dana	Po pojavi štetnika najviše 3 puta u razmacima od 14 dana.
		duhanov štitasti moljac					0,5-0,7 l/ha u zaštićenom	3 dana	Po pojavi štetnika najviše 4 puta u razmacima od 7 dana.
staklenički štitasti moljac									
zelena stjenica									

POVRĆE

KULTURA	CILJ TRETIRANJA	PROIZVOD	DOZA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
PAPRIKA	plamenjača	PREVICUR ENERGY	2 l/ha	3 dana za slatke sorte paprike, 21 dan za ljute sorte paprike	Prva aplikacija nakon presađivanja, 7-10 dana nakon prve aplikacije primijeniti folijarno, treća aplikacija prema potrebi folijarno.
	pepelnica	NATIVO 75 WG	0,3 kg/ha	3 dana	U vegetaciji preventivno, a najviše tri puta u razmacima od 8-12 dana.
	lisne uši	calypso SC 480	0,45 l/ha	3 dana	Po pojavi štetnika.
	breskvina zelena uš	decis 2,5 EC	0,3-0,5 l/ha na otvorenom, 0,5-0,7 l/ha u zaštićenom	3 dana	Po pojavi štetnika najviše 3 puta u razmacima od 14 dana na otvorenom, 4 puta u razmacima od 7 dana u zaštićenom.
	pamukova lisna uš				
	žuta kukuruzna sovica				
	duhanov trips				
	kukuruzni moljac				
	gama sovica				
	stjenica Nezara viridula				
	duhanov štitasti moljac				
	staklenički štitasti moljac				
	zelena stjenica				
GRAH, GRAŠAK	lisne uši	Confidor SL 200	0,25-0,5 l/ha	14 dana	Po pojavi štetnika.
	crna repina (bobova) uš	calypso SC 480	0,3-0,5 l/ha	7 dana	Po pojavi štetnika najviše 2 puta u razmacima od 14 dana.
	graškova zelena uš	decis 2,5 EC	0,3-0,5 l/ha	7 dana	Po pojavi štetnika najviše 2 puta u razmacima od 14 dana.
	kukuruzni moljac				
	prugasta pipa mahunarka				
	duhanov trips				
NISKI GRAH	lisna uš	calypso SC 480	0,2 l/ha za male namjene	7 dana na otvorenom	Suzbijanje je potrebno obaviti na početku napada štetnika te od stadija razvoja BBCH 15. Sredstvo se smije primijenjivati 2 puta godišnje.
GRAH MAHUNAR	siva plijesan	TELDOR SC 500	1,5 l/ha za male namjene u zaštićenom prostoru	3 dana	Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana.
	lisna uš	calypso SC 480	0,2 L/ha kod visine biljke do 50 cm, 0,3 L/ha kod visine biljke do 50 - 125 cm za male namjene	7 dana	Suzbijanje je potrebno obaviti na početku napada štetnika te od stadija razvoja BBCH 15. Sredstvo se smije primijenjivati jednom godišnje.
MAHUNE, BOB	graškova zelena uš	decis 2,5 EC	0,3-0,5 l/ha	7 dana	Po pojavi štetnika najviše 2 puta u razmacima od 14 dana.
	kukuruzni moljac				
	prugasta pipa mahunarka				
	duhanov trips				

PLODOVITO POVRĆE

POVRĆE

POVRĆE

	KULTURA	CILJ TRETIRANJA	PROIZVOD	DOZA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
PLODOVITO POVRĆE	PATLIDŽAN	polijeganje nasada	PREVICUR ENERGY	6 ml/m ²	Osigurana je dozvoljenim vremenom primjene.	U rasadnicima jedno tretiranje prilikom sjetve ili u razdvojenoj primjeni, prvi put prilikom sjetve a drugi put nakon dva tjedna.
				2-3 l/ha		U tlu putem sustava za navodnjavanje kap-po-kap ili lokaliziranim nanošenjem. Prvi put tretirati prilikom presađivanja, a drugi put nakon 14 dana.
		siva plijesan	TELDOR SC 500	1-1,5 l/ha za male namjene	3 dana	Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-14 dana.
		lisne uši	calypso SC 480	0,45 l/ha	3 dana	Po pojavi štetnika.
		breskvina zelena uš	decis 2,5 EC	0,3-0,5 l/ha na otvorenom, 0,5-0,7 l/ha u zaštićenom	3 dana	Po pojavi štetnika najviše 3 puta u razmacima od 14 dana na otvorenom, 4 puta u razmacima od 7 dana u zaštićenom.
		pamukova lisna uš				
		žuta kukuruzna soвица				
		duhanov trips				
		kukuruzni moljac				
		gama soвица				
		stjenica Nezara viridula				
		duhanov štitasti moljac				
		staklenički štitasti moljac				
		zelena stjenica				
		ARTIČOKA	šljivina uš	0,3-0,5 l/ha	3 dana	Po pojavi štetnika najviše 3 puta u razmacima od 7 dana.
soвица						
moljac						
spodoptera littoralis						
karadrina						
BROKULA	plamenjača	INFINITO	1,6 l/ha (Kelj pupčar za male namjene)	14 dana	Nakon trećeg pravog lista.	
	polijeganje nasada	PREVICUR ENERGY	6 ml/m ²	Osigurana je dozvoljenim vremenom primjene.	U rasadnicima jedno tretiranje prilikom sjetve ili u razdvojenoj primjeni, prvi put prilikom sjetve a drugi put nakon dva tjedna.	
	koncentrična pjegavost, prstenasta pjegavost, svijetla pjegavost	NATIVO 75 WG	0,4 kg/ha za male namjene	21 dan	Primjeniti kod prvih simptoma zaraze, najviše 2 puta u vegetaciji.	
	suha trulež					
	bijela hrđa					
pepelnica						
CVJETAČA	plamenjača	INFINITO	1,6 l/ha (Kelj pupčar za male namjene)	14 dana	Nakon trećeg pravog lista.	
	polijeganje nasada	PREVICUR ENERGY	6 ml/m ²	Osigurana je dozvoljenim vremenom primjene.	U rasadnicima jedno tretiranje prilikom sjetve ili u razdvojenoj primjeni, prvi put prilikom sjetve a drugi put nakon dva tjedna.	
	koncentrična pjegavost, prstenasta pjegavost, svijetla pjegavost	NATIVO 75 WG	0,4 kg/ha za male namjene	21 dan	Primjeniti kod prvih simptoma zaraze.	
	suha trulež					
	bijela hrđa					
	pepelnica					
	lisna uš	calypso SC 480	0,2 l/ha za male namjene	7 dana na otvorenom	Suzbijanje je potrebno obaviti na početku napada štetnika. Sredstvo se smije primijeniti 2 puta godišnje.	
kukci koji krizu (osim gusjenica leptira)						

POVRĆE

	KULTURA	CILJ TRETIRANJA	PROIZVOD	DOZA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE	
LISNATO POVRĆE I KUPUSNJAČE	KELJ PUPČAR I KELJ	plamenjača	INFINITO	0,4pt	14 dana	Nakon trećeg pravog lista.	
		polijeganje nasada	PREVICUR ENERGY	6 ml/m ²	Osigurana je dozvoljenim vremenom primjene.	U rasadnicima jedno tretiranje prilikom sjetve ili u razdvojenoj primjeni, prvi put prilikom sjetve a drugi put nakon dva tjedna.	
		koncentrična pjegavost, prstenasta pjegavost, svijetla pjegavost					
		suha trulež	NATIVO 75 WG	0,4 kg/ha za male namjene	21 dan	Primjeniti kod prvih simptoma zaraze, najviše 3 puta u vegetaciji.	
		bijela hrđa					
		pepelnica					
		lisna uš	calypso SC 480	0,2 l/ha za male namjene	7 dana na otvorenom	Suzbijanje je potrebno obaviti na početku napada štetnika. Sredstvo se smije primijeniti 2 puta godišnje.	
		kukci koji krizu (osim gusjenica leptira)					
	kupusni šiljasti moljac						
	KUPUS	plamenjača	INFINITO	1,6 l/ha	14 dana	Nakon trećeg pravog lista.	
		polijeganje nasada	PREVICUR ENERGY	6 ml/m ²	Osigurana je dozvoljenim vremenom primjene.	U rasadnicima jedno tretiranje prilikom sjetve ili u razdvojenoj primjeni, prvi put prilikom sjetve a drugi put nakon dva tjedna.	
		koncentrična pjegavost, prstenasta pjegavost, svijetla pjegavost					
		suha trulež	NATIVO 75 WG	0,4 kg/ha za male namjene	21 dan	Primjeniti kod prvih simptoma zaraze, najviše 3 puta u vegetaciji.	
		bijela hrđa					
		pepelnica					
		kupusne lisne uši	Confidor SL 200	1 l/ha	21 dan	Po pojavi štetnika.	
		lisne sovica					
	DUHAN	polijeganje nasada	PREVICUR ENERGY	6 ml/m ²	Osigurana je dozvoljenim vremenom primjene.	U rasadnicima jedno tretiranje prilikom sjetve ili u razdvojenoj primjeni, prvi put prilikom sjetve a drugi put nakon dva tjedna.	
		lisne uši	Confidor SL 200	0,25-0,5 l/ha	21 dan	Po pojavi štetnika.	
		breskvina lisna uš	decis 2,5 EC	0,3-0,5 l/ha	Nije primjenjiva	Po pojavi štetnika.	
		sovica pozemljuša					
	MATOVILAC, VALERIJANA, POTOČARKA, CIKORIJA, RADIČ, LAVLJI ZUB	polijeganje nasada	PREVICUR ENERGY	6 ml/m ²	20 dana	U rasadnicima jedno tretiranje prilikom sjetve ili u razdvojenoj primjeni, prvi put prilikom sjetve a drugi put nakon dva tjedna.	
		plamenjača		2-3 l/ha		U vegetaciji preventivno.	
		siva plijesan	TELDOR SC 500	1-1,5 l/ha za male namjene	3 dana	Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana.	
		bijela trulež					
	RIKOLA, ENDIVIJA	polijeganje nasada	PREVICUR ENERGY	6 ml/m ²	20 dana	U rasadnicima jedno tretiranje prilikom sjetve ili u razdvojenoj primjeni, prvi put prilikom sjetve a drugi put nakon dva tjedna.	
		plamenjača		2-3 l/ha		U vegetaciji preventivno.	
		siva plijesan	TELDOR SC 500	1-1,5 l/ha za male namjene	3 dana	Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana.	
bijela trulež							
lisna uš		calypso SC 480	0,2 l/ha za male namjene	7 dana na otvorenom	Suzbijanje je potrebno obaviti na početku napada štetnika. Sredstvo se smije primijeniti 2 puta godišnje.		

















POVRĆE

KULTURA	CILJ TRETIRANJA	PROIZVOD	DOZA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
ZELENA SALATA	polijeganje nasada	PREVICUR ENERGY	6 ml/m ²	20 dana	U rasadnicima jedno tretiranje prilikom sjetve ili u razdvojenoj primjeni, prvi put prilikom sjetve a drugi put nakon dva tjedna.
	plamenjača		2-3 l/ha		U vegetaciji preventivno.
	siva plijesan	TELDOR SC 500	1-1,5 l/ha za male namjene	3 dana	Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana.
	bijela trulež				
	salatina lisna uš	decis 2,5 EC	0,3-0,5 l/ha	7 dana u zaštićenom, 3 dana na otvorenom	Po pojavi štetnika najviše 3 puta u razmacima od 7 dana.
	spodoptera littoralis				
	karadrina				
	kupusna soвица				
	repičina osa listarica	calypso SC 480	0,2 l/ha za male namjene	7 dana na otvorenom	Suzbijanje je potrebno obaviti na početku napada štetnika. Sredstvo se smije primijeniti 2 puta godišnje.
	lisna uš				
KRSTAŠICA	siva plijesan	TELDOR SC 500	1-1,5 l/ha za male namjene	3 dana	Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana.
	bijela trulež				
PERŠIN	lisne pjegavosti	NATIVO 75 WG	0,3 kg/ha za male namjene	21 dan	Primjeniti kod prvih simptoma zaraze, najviše 3 puta u vegetaciji.
	siva plijesan	TELDOR SC 500	1-1,5 l/ha za male namjene	3 dana	Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana.
	bijela trulež		1,5 l/ha za male namjene		
SALATA GLAVATICA	plamenjača	Alette Flash	2,5-3,7 kg/ha	14 dana	U vegetaciji preventivno.
		INFINITO	1,4-1,6 l/ha	14 dana u zaštićenom prostoru, 7 dana na otvorenom	Nakon trećeg pravog lista.
KUPUSNJAČE	kupusni moljac	decis 2,5 EC	0,3-0,5 l/ha	7 dana	Po pojavi štetnika najviše 2 puta u razmacima od 7 dana.
	kupusna lisna uš				
	kupusna soвица				
	mali kupusar				
	kupusni bjelac				
	kupusni buhač				
	trips				
CELER LISTAŠ	siva plijesan	TELDOR SC 500	1-1,5 l/ha za male namjene	3 dana	Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana.
	bijela trulež	TELDOR SC 500	1,5 l/ha za male namjene	3 dana	Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana.
ŠPINAT	crna bobova uš	decis 2,5 EC	0,35 l/ha	3 dana	Po pojavi štetnika najviše 2 puta u razmacima od 14 dana.
	repin štitasti kornjaš				
RAŠTIKA	lisna uš	calypso SC 480	0,2 l/ha za male namjene	7 dana na otvorenom	Suzbijanje je potrebno obaviti na početku napada štetnika. Sredstvo se smije primijeniti 2 puta godišnje.
	kukci koji krizu (osim gusjenica leptira)				
KINESKI KUPUS	lisna uš	calypso SC 480	0,2 l/ha za male namjene	7 dana na otvorenom	Suzbijanje je potrebno obaviti na početku napada štetnika. Sredstvo se smije primijeniti 2 puta godišnje.
	kukci koji krizu (osim gusjenica leptira)				

LISNATO POVRĆE I KUPUSNJAČE

POVRĆE

POVRĆE

KULTURA	CILJ TRETIRANJA	PROIZVOD	DOZA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
BUNDEVA, TIKVICE	plamenjača	 Aliette Flash	2,5-3,7 kg/ha	21 dan	U vegetaciji preventivno.
		 PREVICUR ENERGY	2 l/ha	14 dana	
		 INFINITO	1,2-1,6 l/ha	1 dan u zaštićenom prostoru, 3 dana na otvorenom	
	pepelnica	 NATIVO 75 WG	0,3 kg/ha	3 dana	Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-14 dana.
	siva plijesan	 TELDOR SC 500	1-1,5 l/ha za male namjene	3 dana	
	pamukova lisna uš	 decis 2,5 EC	0,3-0,5 l/ha na otvorenom, 0,5-0,7 l/ha u zaštićenom	3 dana	Po pojavi štetnika najviše 3 puta u razmacima od 14 dana na otvorenom, 3 puta u razmacima od 7 dana u zaštićenom.
	breskvina zelena uš				
	duhanov trips				
	duhanov štitasti moljac				
	staklenički štitasti moljac	0,5-0,7 l/ha u zaštićenom	3 dana	Po pojavi štetnika najviše 3 puta u razmacima od 7 dana.	
kukci koji krizu (osim gusjenica leptira)	 calypso SC 480	0,2 L/ha kod visine biljke do 50 cm; 0,3 L/ha kod visine biljke 50 - 125 cm na zaštićenom prostoru; 0,4 L/ha kod visine biljke do 125 cm; 0,2 l/ha na otvorenom prostoru za male namjene	3 dana	Suzbijanje je potrebno obaviti na početku napada štetnika te u vremenskom razmaku 8-10 dana. Sredstvo se smije primijeniti 2 puta godišnje.	
KRSTAVAC	polijeganje nasada	 PREVICUR ENERGY	6 ml/m ²	3 dana	U rasadnicima jedno tretiranje prilikom sjetve ili u razdvojenoj primjeni, prvi put prilikom sjetve a drugi put nakon dva tjedna.
			2-3 l/ha		Prvi puta tretirati prilikom presađivanja, a drugi puta nakon otprilike 2 tjedna nakon prve primjene. Preporuča se sredstvo primijeniti u završnoj fazi ciklusa navodnjavanja.
	plamenjača	 PREVICUR ENERGY	2 l/ha	3 dana	U vegetaciji preventivno.
		 Aliette Flash	2,5-3,7 kg/ha	4 dana	U vegetaciji preventivno, najviše 3 puta u razmacima od 7-10 dana.
		 INFINITO	1,2-1,6 l/ha	1 dan u zaštićenom prostoru, 3 dana na otvorenom	U vegetaciji preventivno, najviše 3 puta u razmacima od 8-12 dana.
	antraknoza	 Antracol WG 70	3 kg/ha	7 dana	U vegetaciji preventivno.
	pepelnica	 NATIVO 75 WG	0,3 kg/ha	3 dana	U vegetaciji preventivno, najviše 3 puta u razmacima od 8-12 dana.
	lisne uši	 calypso SC 480	0,3 l/ha	3 dana	Po pojavi štetnika.
	duhanov štitasti moljac	 Confidor SL 200	0,75 l/ha	14 dana	
	pamukova lisna uš	 decis 2,5 EC	0,3-0,5 l/ha na otvorenom, 0,5-0,7 l/ha u zaštićenom	3 dana	Po pojavi štetnika najviše 3 puta u razmacima od 14 dana na otvorenom, 3 puta u razmacima od 7 dana u zaštićenom.
	breskvina zelena uš				
	duhanov trips				
	staklenički štitasti moljac				

TIKVENJACE

POVRCE

POVRĆE

	KULTURA	CILJ TRETIRANJA	PROIZVOD	DOZA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
TIKVENJAČE	LUBENICA, DINJA	polijeganje nasada	PREVICUR ENERGY	6 ml/m ² 2-3 l/ha	Osigurana je dozvoljenim vremenom primjene.	U rasadnicima jedno tretiranje prilikom sjetve ili u razdvojenoj primjeni, prvi put prilikom sjetve a drugi put nakon dva tjedna.
		plamenjača	Aliette Flash INFINITO	2,5-3,7 kg/ha 1,2-1,6 l/ha		21 dan 1 dan u zaštićenom prostoru, 3 dana na otvorenom
		antraknoza	Antracol WG 70	3 kg/ha	7 dana	U vegetaciji preventivno.
		pepelnica	NATIVO 75 WG	0,3 kg/ha	3 dana	Preventivno tretirati od faze pred cvatnju do prije berbe u razmacima 8-12 dana.
		lisne uši	calypso SC 480	0,3 l/ha	3 dana	Po pojavi štetnika.
		pamukova lisna uš	decis 2,5 EC	0,3-0,5 l/ha na otvorenom, 0,5-0,7 l/ha u zaštićenom	3 dana	Po pojavi štetnika najviše 3 puta u razmacima od 14 dana na otvorenom, 3 puta u razmacima od 7 dana u zaštićenom.
		breskvina zelena uš				
		duhanov trips				
		ČEŠNJAK	siva plijesan	Folicur EW 250	2 l/ha	21 dan
bijela trulež						
čadavica						
hrđa	Luna EXPERIENCE		0,6-1 l/ha	7 dana	"Preventivno početka rasta lisne mase do odumiranja lisne mase i završetka rasta lukovice"	
smeđa pjegavost						
gljive roda <i>Stemphylium spp</i>	Folicur EW 250		1 l/ha	21 dan	U vegetaciji preventivno.	
duhanov trips	decis 2,5 EC		0,3-0,5 l/ha	7 dana	Po pojavi štetnika najviše 3 puta u razmacima od 14 dana.	
lukova zlatica						
lisna uš	calypso SC 480		0,2 l/ha za male namjene	21 dan na otvorenom	Suzbijanje je potrebno obaviti na početku napada štetnika. Sredstvo se smije primijeniti 3 puta godišnje.	
trips						
LUKOVIČASTO POVRĆE	plamenjača		INFINITO	1,6 l/ha za male namjene	7 dana	Nakon trećeg pravog lista.
			Aliette Flash	2 kg/ha	7 dana	Primijeniti od početka formiranja lukovice pa do veličine 75% konačnog promjera lukovice.
	siva plijesan	TELDOR SC 500	1,5 l/ha za male namjene na otvorenom	7 dana	Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana.	
		Folicur EW 250	2 l/ha	Osigurana je dozvoljenim vremenom primjene	Primijeniti odmah nakon sjetve/sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.	
	hrđa	Luna EXPERIENCE	0,6-1 l/ha	7 dana	"Preventivno početka rasta lisne mase do odumiranja lisne mase i završetka rasta lukovice".	
	čadavica	Folicur EW 250	2 l/ha	Osigurana je dozvoljenim vremenom primjene	Primijeniti odmah nakon sjetve/sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.	
	bijela trulež	TELDOR SC 500	1,5 l/ha za male namjene na otvorenom	7 dana	Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana.	
		Folicur EW 250	2 l/ha	Osigurana je dozvoljenim vremenom primjene	Primijeniti odmah nakon sjetve/sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.	
	smeđa pjegavost	Luna EXPERIENCE	0,6-1 l/ha	7 dana	"Preventivno početka rasta lisne mase do odumiranja lisne mase i završetka rasta lukovice".	
	duhanov trips	decis 2,5 EC	0,3-0,5 l/ha	7 dana	Po pojavi štetnika najviše 3 puta u razmacima od 14 dana.	
	lukova zlatica					
	trips					calypso SC 480

 FUNGICID
  INSEKTICID
  HERBICID
  FIZIOTROP












POVRĆE







	KULTURA	CILJ TRETIRANJA	PROIZVOD	DOZA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE	
LUKOVIČASTO POVRĆE	LUK KOZJAK	lisna uš	calypso SC 480	0,2 l/ha za male namjene	21 dan na otvorenom	Suzbijanje je potrebno obaviti na početku napada štetnika. Sredstvo se smije primijeniti 3 puta godišnje.	
		trips					
	PORILUK	pjegavost lišća	NATIVO 75 WG	0,4 kg za male namjene	21 dan	Primjeniti kod prvih simptoma zaraze, najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima od 21 dan.	
		hrđa					
		vršna palež					
		duhanov trips					
		lukova zlatica	decis 2,5 EC	0,3-0,5 l/ha	7 dana	Po pojavi štetnika najviše 3 puta u razmacima od 14 dana.	
		lisna uš	calypso SC 480	0,2 l/ha za male namjene	14 dana na otvorenom	Suzbijanje je potrebno obaviti na početku napada štetnika. Sredstvo se smije primijeniti 3 puta godišnje.	
		trips					
lukov moljac							
ZAČINSKO BILJE	CRNA GORUŠICA	siva plijesan	TELDOR SC 500	1-1,5 l/ha za male namjene	3 dana	Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana.	
		bijela trulež					
	LUK VLASAC	siva plijesan	TELDOR SC 500	1-1,5 l/ha	3 dana	Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana.	
		bijela trulež					
		duhanov trips					
		lukova zlatica					
	KADULJA, TIMIJAN, BOSILJAK, RUŽMARIN, LOVOR, ESTRAGON	siva plijesan	TELDOR SC 500	1-1,5 l/ha za male namjene	3 dana	Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana.	
		bijela trulež					
	LJEKOVITO BILJE	ZAČINSKO BILJE (KOJE SE KORISTI KAO SVJEŽI ZAČIN)	lisna uš	calypso SC 480	0,12 l/ha za male namjene	7 dana na otvorenom	Suzbijanje je potrebno obaviti do do stadija BBCH 49 te na početku napada štetnika. Sredstvo se smije primijeniti 2 puta godišnje.
KORIJANDER, KOPAR, KIM, ZAČINSKI KOMORAČ, ANIS (UPOTREBA PLODA I SJEMENKI)			lisna uš	calypso SC 480	0,12 l/ha za male namjene	Osigurana vremenom primjene	Sredstvo se smije primijeniti 2 puta godišnje.
			MATIČNJAK I METVICA (LISTOVI I CVJETOVI KOJI SE KORISTE KAO LJEKOVITO BILJE)	lisna uš	calypso SC 480	0,25 l/ha za male namjene	7 dana na otvorenom

BOLESTI I ŠTETNICI








CILJ TRETIRANJA

BOLESTI

plamenjača salate (<i>Bremia lactucae</i>)	
plamenjača krumpira (<i>Phytophthora infestans</i>)	
plamenjača tikvenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	
koncentrična pjegavosti lišća krumpira (<i>Alternaria solani</i>)	
koncentrična pjegavost rajčice (<i>Alternaria solani</i>)	
koncentrična pjegavost kupusnjača (<i>Alternaria brassicae</i> , <i>Alternaria brassicicola</i>)	
palež lišća (<i>Alternaria dauci</i>)	
bijela trulež mrkve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	
bijela trulež (<i>Sclerotinia spp.</i>)	
bijela trulež češnjaka (<i>Sclerotium cepivorum</i>)	
pegavost lišća poriluka (<i>Alternaria porri</i>)	

hrđa poriluka (<i>Puccinia allii</i>)	
prstenasta pjegavost kupusnjača (<i>Mycosphaerella brassicicola</i>)	
suha trulež (<i>Phoma lingam</i>)	
pepelnica (<i>Erysiphe spp.</i>)	
čadavica (<i>Cladosporium spp.</i>)	
siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)	

ŠTETNICI



















rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>)	
krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	
kupusne lisne uši (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	
crne bobove uši (<i>Aphis fabae</i>)	
graškove zelene uši (<i>Acyrtosiphon pisum</i>)	
odrasli stadij štitastog moljca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	
lisne sovica (<i>Mamestra spp.</i>)	

VOĆE

KULTURA	CILJ TRETIRANJA	PROIZVOD	DOZA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
JABUKA	alternarija	NATIVO 75 WG	0,3 kg/ha	14 dana	Preventivno tretirati od faze pred cvatnju pa do prije berbe u razmacima od 10-12 dana.
	pepelnica	ZATO Plus	1,25 - 1,5 kg/ha za 2 m krošnje. Za svaki dodatni metar visine krošnje dodati 0,63-0,75 kg/h	21 dan	Nakon cvatnje do sazrijevanja plodova, u razmacima 10 dana.
	krastavost plodova	Luna EXPERIENCE	0,25-0,75 L/ha	14 dana	Preventivno od faze ružičastih balona do pune zriobe.
		ZATO Plus			
		Antracol WG 70	2 kg/ha	28 dana	Preventivno od početka vegetacije pa do cvatnje.
		NATIVO 75 WG	0,3 kg/ha	14 dana	Preventivno tretirati od faze pred cvatnju pa do prije berbe u razmacima od 10-12 dana.
	smeđa pjegavost	Luna EXPERIENCE	0,25-0,75 L/ha	14 dana	Preventivno od faze ružičastih balona do pune zriobe.
	alternarijska pjegavost				
	bakterijska palež	Aliette Flash	2,5 kg/ha	21 dan	Sredstvo se primjenjuje u vrijeme cvatnje i poslije cvatnje u razmacima 5-7 dana.
	ružin savijač				
	mušica šiškarića				
	jabučni cvjetar	decis 2,5 EC	0,3-0,7 l/ha	7 dana	Po pojavi štetnika u razmacima od 14 dana.
	mediteranska voćna muha				
	hrdasta grinja	envydor 240 SC	0,6 l/ha za male namjene	14 dana	Nakon cvatnje pa do početka sazrijevanja ploda a po pojavi štetnika.
	jabučna krvava uš	Confidor SL 200	0,5 l/ha	21 dan	Po pojavi štetnika i kritičnom pragu.
	lisne uši	calypso SC 480	0,3 l/ha	14 dana	
		Confidor SL 200	0,25 l/ha	21 dan	
	jabučna osica pilatka	decis 2,5 EC	0,3 i 0,5 l/ha	7 dana	
	savijač kože ploda	calypso SC 480	0,3 l/ha	14 dana	
		decis 2,5 EC	0,3-0,7 l/ha	7 dana	
	lisni miner	calypso SC 480	0,3 l/ha	14 dana	Po pojavi štetnika i kritičnom pragu.
		decis 2,5 EC	0,3 i 0,5 l/ha	7 dana	
		Confidor SL 200	0,375 - 0,5 l/ha	21 dan	
	jabučni savijač	calypso SC 480	0,3 l/ha	14 dana	U vrijeme masovnog izlaska ličinki iz jaja i njihovog naseljavanja na listove.
	crveni voćni pauk	decis 2,5 EC	0,2 i 0,3 l/ha	7 dana	
	koprivina grinja	envydor 240 SC	0,6 l/ha	14 dana	
KRUŠKA	krastavost plodova	Antracol WG 70	2 kg/ha	28 dana	Preventivno od početka vegetacije pa do cvatnje.
		Luna EXPERIENCE	0,25-0,75 L/ha	14 dana	Preventivno od faze ružičastih balona do pune zriobe.
	smeđa pjegavost kruške	NATIVO 75 WG	0,3 kg/ha	14 dana	Preventivno tretirati počevši od faze pred cvatnju pa do prije berbe.
		Luna EXPERIENCE	0,25-0,75 L/ha	14 dana	Preventivno od faze ružičastih balona do pune zriobe.

FUNGICID INSEKTICID HERBICID FIZIOTROP

VOĆE

	KULTURA	CILJ TRETIRANJA	PROIZVOD	DOZA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE	
JEZGRICA VE VOĆNE VRSTE	KRUŠKA	alternarijska pjegavost	 Luna EXPERIENCE	0,25-0,75 L/ha	14 dana	Preventivno od faze ružičastih balona do pune zriobe.	
		pepelnica					
		bakterijska palež	 Aliette Flash	2,5 kg/ha	21 dan	Sredstvo se primjenjuje u vrijeme cvatnje i poslije cvatnje svakih 5-7 dana.	
		lisne uši	 calypso SC 480	0,3 l/ha	14 dana	Po pojavi štetnika.	
		kruškina osica	 decis 2,5 EC	0,3-0,7 l/ha	7 dana	Po pojavi štetnika u razmacima od 14 dana.	
		lisni miner	 calypso SC 480	0,3 l/ha	14 dana	Po pojavi štetnika.	
		jabučni savijač	 decis 2,5 EC	0,3-0,7 l/ha	7 dana	Po pojavi štetnika u razmacima od 14 dana.	
		savijač kože ploda	 calypso SC 480	0,3 l/ha	14 dana	Po pojavi štetnika.	
		obična kruškina buha					
		mediteranska voćna muha	 decis 2,5 EC	0,3-0,7 l/ha	7 dana	Po pojavi štetnika u razmacima od 14 dana.	
		zelena jabučna uš					
		mušica šiškarica					
		ružin savijač					
		crveni voćni pauk	 enviador 240 SC	0,6 l/ha	14 dana	U vrijeme masovnog izlaska ličinka iz jaja i njihovog naseljavanja na listove.	
		koprivina grinja					
KOŠTIČAVE VOĆNE VRSTE	BRESKVA	pepelnica	 Luna EXPERIENCE	0,5 L/ha	3 dana	Preventivno od faze vidljivih čaški do pune zriobe.	
		kovrčavost lista	 NATIVO 75 WG	0,3 kg/ha		Primjenjuje se na početku cvatnje, u razmacima od 12-14 dana i prije berbe u razmacima 7 dana.	
		trulež plodova	 TELDOR SC 500	1 - 1,5 l/ha	3 dana	Kada plodovi počnu dobivati boju ili najkasnije tri dana prije branja.	
		sušenja cvjetova i grančica					
		palež cvjeta					
		izboj	 Luna EXPERIENCE	0,25-0,75 L/ha	3 dana	Preventivno od faze vidljivih čaški do pune zriobe.	
		trulež plodova					
		lisne uši	 calypso SC 480	0,3 l/ha	14 dana	Po pojavi štetnika.	
			 Confidor SL 200	0,25 l/ha	21 dan	Po pojavi štetnika.	
		trips					
		breskvin moljac	 decis 2,5 EC	0,3-0,7 l/ha	3 dana	Po pojavi štetnika u razmacima od 14 dana.	
		breskvin savijač					
		breskvina zelena uš					
		crveni voćni pauk	 enviador 240 SC	0,6 l/ha	14 dana	U vrijeme masovnog izlaska ličinka iz jaja i njihovog naseljavanja na listove.	
		koprivina grinja					
hrdasta grinja	 enviador 240 SC	0,6 l/ha za male namjene	14 dana	Po pojavi štetnika na otvorenom.			

 FUNGICID  INSEKTICID  HERBICID  FIZIOTROP

VOĆE

	KULTURA	CILJ TRETIRANJA	PROIZVOD	DOZA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE	
KOŠTIČAVE VOĆNE VRSTE	MARELICA	trips					
		breskvin moljac					
		breskvin savijač		decis 2,5 EC	0,3-0,7 l/ha	3 dana	Po pojavi štetnika u razmacima od 14 dana.
		lisna uš					
		breskvina zelena uš					
		hrdasta grinja		envydor 240 SC	0,6 l/ha za male namjene	14 dana	Po pojavi štetnika na otvorenom.
		siva plijesan					
		palež cvijeta i trulež ploda		TELDOR SC 500	1-1,5 l/ha za male namjene	3 dana	Primijeniti 1-2 puta u vrijeme cvatnje te 1-2 puta dva tjedna prije branja. Može se tretirati najviše četiri puta u vegetaciji.
		kovrčavost lista					
		pepelnica		NATIVO 75 WG	0,3 kg/ha	7 dana	Preventivna primjena.
		trulež ploda					
		lisne uši		calypso SC 480	0,3 l/ha	14 dana	Po pojavi štetnika.
		crveni voćni pauk					
		koprivina grinja		envydor 240 SC	0,6 l/ha	14 dana	U vrijeme masovnog izlaska ličnaka iz jaja i njihovog naseljavanja na listove.
NEKTARINA	kovrčavost lista						
	pepelnica		NATIVO 75 WG	0,3 kg/ha	7 dana	Preventivna primjena.	
	trulež ploda						
	lisne uši		calypso SC 480	0,3 l/ha	14 dana	Po pojavi štetnika.	
	crveni voćni pauk						
	koprivina grinja		envydor 240 SC	0,6 l/ha	14 dana	U vrijeme masovnog izlaska ličnaka iz jaja i njihovog naseljavanja na listove.	
ŠLJIVA	trulež plodova		NATIVO 75 WG	0,3 kg/ha	7 dana	Primjenjuje se na početku cvatnje, u razmacima od 12-14 dana i prije berbe u razmacima 7 dana.	
	sušenje cvjetova i grančica		TELDOR SC 500	0,5 l/ha na 1 m visine krošnje	3 dana	Prvi puta kada plodovi počnu dobivati boju. Drugi i treći puta u 12-14 dnevnim razmacima.	
	koprivina grinja						
	hrdasta grinja		envydor 240 SC	0,6 l/ha za male namjene	21 dan	Po pojavi štetnika.	
	breskvina zelena uš						
	lisna uš						
	osa šljivarica		decis 2,5 EC	0,3-0,7 l/ha	7 dana	Po pojavi štetnika u razmacima od 14 dana.	
	mediteranska voćna muha						












VOĆE












	KULTURA	CILJ TRETIRANJA	PROIZVOD	DOZA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE	
KOŠTIČAVE VOĆNE VRSTE	TREŠNJA	siva plijesan	TEL DOR SC 500	0,5 l/ha na 1 m visine krošnje	3 dana	Prvi puta kada plodovi počnu dobivati boju. Drugi i treći puta u 12-14 dnevnim razmacima.	
		trulež ploda		0,25-0,75 L/ha	3 dana	Preventivno od faze vidljivih čaški do pune zriobe.	
		pepelnica	Luna EXPERIENCE	0,5 L/ha	3 dana	Preventivno od faze vidljivih čaški do pune zriobe.	
		palež cvjeta		0,25-0,75 L/ha	3 dana	Preventivno od faze vidljivih čaški do pune zriobe.	
		izboj					
		sušenja cvjetova i grančica	TEL DOR SC 500	0,5 l/ha na 1 m visine krošnje	3 dana	Prvi puta kada plodovi počnu dobivati boju. Drugi i treći puta u 12-14 dnevnim razmacima.	
		trulež plodova	NATIVO 75 WG	0,3 kg/ha	7 dana	Primjenjuje se na početku cvatnje, u razmacima od 12-14 dana i prije berbe u razmacima 7 dana.	
		lisne uši	calypso SC 480	0,375 l/ha	14 dana	Po pojavi štetnika.	
		breskvina zelena uš					
		lisna uš	decis 2,5 EC	0,3-0,7 l/ha	7 dana	Po pojavi štetnika u razmacima od 14 dana.	
		trešnjina muha					
VIŠNJA	koprivina grinja	envydor 240 SC	0,6 l/ha za male namjene	21 dan	Nakon cvatnje po izlasku 50% ličinki iz jajašca na otvorenom.		
	lisna uš	calypso SC 480	0,1 l/ha na 1 m krošnje za male namjene	14 dana	Na početku napada te u stadiju BBCH 10-59 i BBCH 60-81. Sredstvo se smije primijeniti 2 puta godišnje.		
	ujednačeno dozrijevanje i lakša berba	Ethrel	0,5 - 0,7 l/ha	7 dana	U početku dozrijevanja plodova.		
MASLINA	paunovo oko	NATIVO 75 WG	0,25 kg/ha	Osigurana dozvoljenim vremenom primjene	Preventivno tretirati od kretanja vegetacije do pred cvatnju.		
	maslinov moljac	decis 2,5 EC	0,4-0,7 l/ha	7 dana	Po pojavi štetnika u razmacima od 14 dana.		
	maslinina muha						
AGRUMI	vlažna trulež korjenova vrata	Aliette Flash	2,5 kg/ha	15 dana	Primjena u jesen, od početka promjene boje i tijekom sazrijevanja. U slučaju obilnijih kiša primijeniti dozu od 30g/10L.		
	gumoza				Tretirati triput: u travnju, srpnju i rujnu/listopadu (početkom, u sredini i krajem vegetacije).		
	lisne uši agruma		1,5 l/ha				
	lisni miner agruma	Confidor SL 200	1 - 2 l/ha	35 dana	Po pojavi štetnika, tretiranje dozvoljeno na otvorenom nakon cvatnje.		
	odrasli stadij štitastog moljca agruma		1 - 1,5 l/ha				
	crveni pauk agruma i obični crveni pauk	envydor 240 SC	0,2 l/ha	14 dana	Primjeniti u periodu od otpadanja latica do sazrijevanja ploda.		
	crna uš agruma						
	pamukova lisna uš	decis 2,5 EC	0,4-0,5 l/ha	30 dana	Po pojavi štetnika jednom u vegetaciji.		
mediteranska voćna muha							

VOĆE

	KULTURA	CILJ TRETIRANJA	PROIZVOD	DOZA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
JAGODASTE VOĆNE VRSTE	JAGODA	trulež korjena	Alette Flash	2,5 kg/ha	7 dana	Prva primjena u mjesecu sadnje, a zatim svakih 25 dana.
		siva plijesan	TELDOR SC 500	1,5 l/ha	3 dana	Prvi puta tretirati u cvatnji jagoda, drugi puta kod pojave zelenih plodova.
		sve vrste štetnih puževa u zatvorenom prostoru (staklenici, plastenici) i u polju	MESUROL Granulat	3 - 5 kg/ha	21 dan	Prvo rasipanje granula oko biljaka (ne na biljke) treba obaviti kada su puževi u mladoj fazi rasta (veličina do 1 cm).
		rovac		Granule rasipati samo u 6. i 7. mjesecu kada rovci izlaze na površinu tla.		
			lisna uš (pamukova, jagodina)	decis 2,5 EC	0,3-0,5 l/ha	3 dana
KUPINA, MALINA	sušenje mladica	Folicur EW 250	0,8 l/ha za male namjene	14 dana	Po pojavi prvih simptoma.	
	siva plijesan	TELDOR SC 500	2 l/ha	7 dana	Primjenjuje se prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje.	
	stjenice	calypso SC 480	0,25 l/ha	3 dana	Tretiranje izvršiti u periodu između svibnja i listopada, po pojavi štetnika. Razmak između tretiranja 14 dana.	
	malinin pupar					
RUBUS HIBRIDNI	sušenje mladica	Folicur EW 250	0,8 l/ha za male namjene	14 dana	Po pojavi prvih simptoma.	
BOBIČASTE VOĆNE VRSTE	KIVI	siva plijesan	TELDOR SC 500	120 ml/hl za male namjene	60 dana	Primjeniti nakon berbe plodova prskanjem plodova ili uranjanjem u vodenu suspenziju.
		mediteranska voćna muha	decis 2,5 EC	0,4-0,5 l/ha	14 dana	Po pojavi štetnika u razmacima od 14 dana.
		medeći cvrčak				
		dudova štitasta uš				
		maslinov medić				
BRUSNICA	siva plijesan	TELDOR SC 500	2 l/ha	7 dana	Primjenjuje se prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje.	
OGROZD	siva plijesan	envydor 240 SC	0,4 l/ha za male namjene	14 dana	Po pojavi štetnika.	
	koprivina grinja					
RIBIZ	siva plijesan	TELDOR SC 500	1-1,5 l/ha	7 dana	Primjenjuje se prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje.	
	koprivina grinja	envydor 240 SC	0,4 l/ha za male namjene	14 dana	Po pojavi štetnika.	
AMERIČKA BOROVNICA	lisne uši	calypso SC 480	0,2 l/ha	14 dana	Po pojavi štetnika.	
LUPINAŠTE VOĆNE VRSTE	LJESKA	ljeskotoč	calypso SC 480	0,2 l/ha za male namjene	70 dana	Po pojavi štetnika.
	ORAH	orahova muha		0,25 l/ha za male namjene	14 dana	
	BADEM	grinje		0,375 l/ha za male namjene	Osigurana dozvoljenim vremenom primjene	
	KESTEN			0,375 l/ha za male namjene	Osigurana dozvoljenim vremenom primjene	

BOLESTI I ŠTETNICI

CILJ TRETIRANJA	
BOLESTI	
pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	
krastavost jabuke (<i>Venturia inaequalis</i>)	
krastavost kruške (<i>Venturia pirina</i>)	
bakterijska palež (<i>Erwinia amylovora</i>)	
smeđa pjegavost kruške (<i>Stemphylium vesicarium</i>)	
kovrčavost lista breskve (<i>Taphrina deformans</i>)	
trulež plodova (<i>Monilinia fructigena</i>)	
sušenja cvjetova i grančica (<i>Monilinia laxa</i>)	
trulež korjena jagoda (<i>Phytophthora spp.</i>)	
siva plijesan jagoda (<i>Botrytis cinerea</i>)	
paunovo oko (<i>Spilocea oleaginea</i>)	

ŠTETNICI	
jabučna krvava uš (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	
jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)	
jabučna osica pilatka (<i>Holocampa testudinea</i>)	
savijač kože ploda (<i>Tortricidae</i>)	
jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>)	
lisni minerer (<i>Lyonetiidae</i>)	
lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	
simptomi šteta od stjenice na kupini (<i>Lygocoris pabulinus</i>)	
malinin pupar (<i>Byturus tomentosus</i>)	
crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>)	
koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)	

PROČITAJTE ETIKETU I UPUTU ZA PRIMJENU



1. Pažljivo pročitajte etiketu i uputu za primjenu sredstva za zaštitu bilja na pakiranju i slijedite navedene preporuke.

PRIMJENJUJTE REGISTRIRANA SREDSTVA



2. Primjenjujte samo sredstva za zaštitu bilja koja su registrirana u Republici Hrvatskoj i koja se na tržištu nalaze u originalnom pakiranju proizvođača.

PROPISNNO SKLADIŠTITE SREDSTVA



3. Sredstva za zaštitu bilja treba skladištiti u posebnoj prostoriji pod ključem, odvojeno od hrane za životinje i drugih proizvoda, izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja.

KORISTITE ISPRAVNE UREĐAJE ZA PRIMJENU



4. Održavajte ispravnost uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja i uvodite nove tehnike primjene.




Štiteći svoje usjeve, ZAŠTITITE I SEBE!

BUDITE OPREZNI PRI PRIPREMI ŠKROPIVA



5. Tijekom doziranja i pripreme škropiva treba biti OPREZAN i obavezno koristiti odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

NOSITE OSOBNU ZAŠTITNU OPREMU



6. Obavezno koristite svu osobnu zaštitnu opremu navedenu na etiketi ili u uputi za primjenu cijelo vrijeme tijekom primjene sredstva za zaštitu bilja.

12 koraka

za sigurnu primjenu sredstava za zaštitu bilja

PODUZMITE I DODATNE MJERE OPREZA TIJEKOM PRIMJENE SREDSTVA



7. Tijekom primjene sredstva treba poduzeti i dodatne mjere opreza (treba uzeti u obzir vremenske uvjete prilikom primjene, kretanje primjenitelja i drugo).

PRAVILNO POSTUPAJTE AMBALAŽOM NAKON PRIMJENE I PROPISNO JE ODLAŽITE



8. Praznu ambalažu treba temeljito isprazniti, a ako se radi o plastičnoj ambalaži potrebno ju je tri puta isprati i odložiti u skladu s projektom CROCPA EKO MODEL.

ČISTITE ILI ZAMIJENITE OSOBNU ZAŠTITNU OPREMU NAKON SVAKE PRIMJENE



9. Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja, osobnu zaštitnu opremu očistite ili zamijenite.

NEMOJTE PUŠITI, PITI NI JESTI TIJEKOM PRIMJENE



10. Nemojte pušiti, piti ni jesti tijekom primjene. Alkohorna pića ne smiju se konzumirati prije ni za vrijeme primjene sredstva za zaštitu bilja.

TUŠIRAJTE SE NAKON ZAVRŠENE PRIMJENE UZ UPORABU SAPUNA



11. Nakon primjene sredstva za zaštitu bilja potrebno se temeljito istuširati koristeći sapun.

PRAVILNO POSTUPAJTE U SLUČAJU TROVANJA ILI KONTAMINACIJE



12. U slučaju trovanja ili kontaminacije treba postupati u skladu s preporukama na etiketi ili uputi za primjenu i potražiti liječničku pomoć.

Nositelj projekta:



Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja RH (CROCPA)
Palinovečka 41, 10000 Zagreb
tel. /fax. +385 (0)1 /4814 262
www.crocpa.hr



BILJEŠKE

Lined area for notes.



Bayer CropScience

IZDAO:
Bayer d.o.o.,
Radnička cesta 80,
Zagreb

Siječanj 2015

www.bayercropscience.hr
agro.info@bayer.com



Katalog je informativnog karaktera, može sadržavati tiskarske pogreške.
Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno.
Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.

AGRONOMI NA TERENU (RH):

Nenad Arsenić	+385 91 623 2324
Dean Crnošija	+385 98 419 229
Stipe Đuzel	+385 98 359 814
Damir Koščak	+385 99 244 6787
Renata Dejanović	+385 98 477 789
Ivan Havaić	+385 98 173 5366
Dunja Jindra Čupić	+385 99 310 6963
Petar Živković	+385 98 256 924
Martina Golubičić	+385 98 181 8179

AGRONOMI NA TERENU (BiH):

Aleksandar Nestorović	+387 65 238 739
Tihomir Baković	+387 63 299 345
Milan Tomić	+387 65 990 996