



*Vinova*  
**loza**

*Zaštitna sredstva  
i programi zaštite*



**NATIVO**<sup>®</sup>

## Sistemični fungicid za suzbijanje pepelnice vinove loze.

### Djelovanje

Kontaktno	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistemično	<input checked="" type="checkbox"/>
Preventivno	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurativno	<input checked="" type="checkbox"/>
Eradikativno	<input type="checkbox"/>

### Aktivna tvar

tebukonazol (500 g/kg), trifoksistrobin (250 g/kg)

### Formulacija

WG – močive samodispergirajuće granule

### Doza primjene

vinova loza: 0,2 kg/ha

### Pakiranje

20 g, 200 g, 1 kg

### Prednosti

- // Zaštita vinove loze od pepelnice 12–14 dana.
- // Odlično kurativno djelovanje.
- // Dobro sporedno djelovanje na sivu plijesan.
- // Kratka karenca (12–14 dana).



- Nativo<sup>®</sup> zbog dugotrajne učinkovitosti preporučamo kombinirati sa pripravcima protiv plamenjače Mikal<sup>®</sup> premium F, Profiler<sup>®</sup> ili Antracol<sup>®</sup> Combi.
- Nativo<sup>®</sup> se može miješati sa proizvodima na bazi sumpora.





**FALCON**

**Kombinirani sistemični fungicid za folijarno suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu i ratarstvu.**

## **Djelovanje**

- Kontaktno
- Sistemično
- Preventivno
- Kurativno
- Eradikativno

## **Aktivna tvar**

tebukonazol (167 g/l), spioksamin (250 g/l), triadimenol (43 g/l)

## **Formulacija**

EC – tekući koncentrat za emulziju

## **Doza primjene**

vinova loza: 0,3–0,4 l/ha

## **Pakiranje**

40 mL, 100 mL, 1 L

## **Prednosti**

- // Zaštita vinove loze od pepelnice 12–14 dana.
- // Odlično preventivno i kurativno djelovanje.
- // Prati razmake tretiranja protiv plamenjače.
- // Izvrsno se uklapa u sve programe tretiranja.




- Falcon® se može kombinirati sa pripravkom Mikal® premium F.
- Falcon® se može miješati sa proizvodima na bazi sumpora.





**Luna<sup>®</sup>**  
**EXPERIENCE**

Fluopiram i tebukonazol su nepobjedivi dvojac,  
zduženi u jedinstvenom fungicidu Luna<sup>®</sup> Experience.





**Kombinirani fungicid jedinstvenog načina djelovanja namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i povrćarstvu.**

## **Djelovanje**

Kontaktno	<input type="checkbox"/>
Sistemično	<input checked="" type="checkbox"/>
Preventivno	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurativno	<input checked="" type="checkbox"/>
Lokosistemično	<input checked="" type="checkbox"/>

## **Aktivna tvar**

fluopiram (200 g/l), tebukonazol (200 g/l)

## **Formulacija**

SC - koncentrirana suspenzija

## **Doza primjene**

vinova loza: 0,375 l/ha

## **Pakiranje**

10 mL, 40 mL, 100 mL, 1 L

## **Prednosti**

- // Izvanredna učinkovitost i najširi spektar djelovanja.
- // Nova aktivna tvar omogućuje uspješnu antirezistentnu strategiju.
- // Sistemsko djelovanje jamči učinkovitu zaštitu biljnih dijelova koji nisu bili neposredno tretirani.
- // Vrhunska zaštita koja dugoročno poboljšava zdravlje tretirane biljke i plodova pri skladištenju.





# MOVENTO®

**Novi jedinstveni insekticid širokog spektra i dugotrajnog djelovanja.**

## Djelovanje

- Kontaktno   
Sistemično   
Preventivno   
Kurativno   
Eradikativno

## Aktivna tvar

spirotetramat (100 g/l)

## Formulacija

SC - koncentrirana suspenzija

## Doza primjene

vinova loza: 0,75–0,95 l/ha

## Pakiranje

50 mL, 100 mL, 1 L

## Prednosti

- // Jedini insekticid s 2-smjernom sistemičnošću.
- // Dugotrajno djelovanje - ušteda i profitabilnost.
- // Bez kros-rezistencije s postojećim insekticidima.



- Tretiranje obaviti od početka formiranja bobica do faze zatvaranja grozda.
- Sredstvo primjeniti u blok tretmanu uz poštivanja razmaka između tretiranja od 14 dana.
- Za optimalnu učinkovitost pripravka osigurati kvalitetnu aplikaciju te ga primjeniti u vremenu intezivne vegetacije s izraženim kolanjem biljnih sokova.
- Najbolje rezultate postizemo samostalnom primjenom pripravka.



**decis®**

**Cjenovno prihvatljiv insekticid za odlično suzbijanje insekata na voćkama, vinovoj lozi, žitaricama, uljanoj repici i krumpiru.**

### **Djelovanje**

- Kontaktno
- Sistemično
- Preventivno
- Kurativno
- Eradikativno

### **Aktivna tvar**

deltametrin (100 g/l)

### **Formulacija**

EC - tekući koncentrat za emulziju

### **Doza primjene**

vinova loza: 0,125–0,175 l/ha

### **Pakiranje**

250 mL, 1 L

### **Prednosti**

- // Cjenovno prihvatljiv insekticid.
- // Suzbija širok spektar insekata.
- // Iznimno brzo djelovanje.



- Decis® 100 EC ne smije se koristiti pri visokim temperaturama (iznad 28 °C), jer je vrlo hlapljiv.
- Pripravak je opasan za pčele! Tretiranje treba izbjegavati u vrijeme cvatnje kultiviranih biljaka i niskog raslinja. Kako bi se zaštitile pčele i ostali oprašivači tretiranje je potrebno obaviti 2 sata nakon zalaska ili 2 sata prije izlaska sunca.



BAYER

**SIVANTO**<sup>®</sup>  
prime

**Sistemični insekticid za suzbijanje američkog cvrčka u vinogradu.**

### Djelovanje

- Kontaktno
- Sistemično
- Preventivno
- Kurativno
- Eradikativno

### Aktivna tvar

flupiradifuron (200 g/l)

### Formulacija

SL - koncentrat za otopinu

### Doza primjene

vinova loza: 0,5 l/ha

### Pakiranje

1 L, 100 mL i 10 mL

### Prednosti

- // Novi standard u kontroli američkog cvrčka (vektor fitoplazme vinove loze)
- // Nova aktivna tvar flupiradifuron osigurava najviši sigurnosni standard – ekološki prihvatljiv i učinkovit protiv štetnih insekata.
- // Prilagodljivo vrijeme uporabe.



- Pripravak je bezopasan za pčele.







# TELDOR®

**Specifični botriticid izvrsnog djelovanja na sivu plijesan vinove loze.**

## Djelovanje

- |              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Kontaktno    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sistemično   | <input type="checkbox"/>            |
| Preventivno  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kurativno    | <input type="checkbox"/>            |
| Eradikativno | <input type="checkbox"/>            |

## Aktivna tvar

fenheksamid (500 g/l)

## Formulacija

SC – koncentrirana suspenzija

## Doza primjene

vinova loza: 1–1,5 l/ha

## Pakiranje

10 mL, 100 mL, 1 L

## Prednosti

- // Efikasan i siguran.
- // Postojan i dugotrajan.
- // Registriran za veliki broj kultura.
- // Kratke karence bez štetnog utjecaja u proizvodnji vina.
- // Bez mogućnosti pojave unakrsne rezistentnosti.



- Tretiranje pripravkom Teldor® odmah nakon cvatnje te prije zatvaranja grozdova ključno je za uspješno suzbijanje sive plijesni.
- Za sprječavanje pojave sive plijesni dovoljno je tretiranje samo u zoni grozdova.





**PROFILER**<sup>®</sup>

**Kombinirani preventivni fungicid koji se koristi za suzbijanje plamenjače vinove loze.**

### **Djelovanje**

- Kontaktno   
Sistemično   
Preventivno   
Kurativno   
Eradikativno

### **Aktivna tvar**

fosetil-Al (666,7 g/kg), fluopikolid (44,4 g/kg)

### **Formulacija**

WG – močive samodispergirajuće granule

### **Doza primjene**

vinova loza: 2,5–3 kg/ha

### **Pakiranje**

1 kg

### **Prednosti**

- // Iznimno dobro štiti grozdiće i listove.
- // Dugotrajno djelovanje - omogućuje razmak između tretiranja od 12–14 dana.
- // Kratka karenca.
- // Bez mogućnosti pojave unakrsne rezistentnosti (jedinstvena aktivna tvar fluopikolid).
- // Povećava prirodnu otpornost biljke.



- Primjenjuje se u trenutku pojave bobica pa do razvojne faze u kojoj bobice dosegnu veličinu pšeničnog zrna i primjetan je rast grozdova (BBCH 53-73).
- Miješanje s pripravkom Luna<sup>®</sup> Experience nije preporučljivo.



**Mikal<sup>®</sup>**  
premium F

**Sistemični i kontaktni fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze.**

### Djelovanje

- Kontaktno
- Sistemično
- Preventivno
- Kurativno
- Eradikativno

### Aktivna tvar

fosetil-Al (500 g/kg), folpet (250 g/kg), iprovalikarb (40 g/kg)

### Formulacija

WG – močive samodispergirajuće granule

### Doza primjene

vinova loza: 3 kg/ha

### Pakiranje

300 g, 1 kg

### Prednosti

- // Fungicid s najboljim preventivnim i kurativnim djelovanjem.
- // Fungicid koji osigurava najduži razmak između dva tretiranja.
- // Najsigurniji fungicid i u najkritičnijim uvjetima uz sporedno djelovanje na sivu plijesan.
- // Povećava prirodnu otpornost biljke.



- Zbog posebnog načina djelovanja Mikal<sup>®</sup> premium F se preporuča koristiti u bloku i to od početka cvatnje, završetka cvatnje i nakon cvatnje. Razmak između tretiranja treba biti 12–14 dana.
- U slučaju pojave simptoma plamenjače preporučujemo primjenu preparata Mikal<sup>®</sup> premium F zbog njegovog kurativnog djelovanja.
- Najpouzdanije djelovanje.



# Mikal<sup>®</sup>

FLASH

**Sistemični i kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinovoj lozi.**

## Djelovanje

- |              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Kontaktno    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sistemično   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Preventivno  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kurativno    | <input type="checkbox"/>            |
| Eradikativno | <input type="checkbox"/>            |

## Aktivna tvar

fosetil-Al (500 g/kg), folpet (250 g/kg)

## Formulacija

WG – močive samodispergirajuće granule

## Doza primjene

vinova loza: 3-4 kg/ha

## Pakiranje

1 kg

## Prednosti

- // Jedini pravi sistemik iz skupine fungicida na tržištu.
- // Usvaja se u biljku već 30 minuta nakon primjene i kiša ga ne može isprati.
- // Aktivna tvar je 1 sat nakon primjene aktivno raspoređena po cijeloj biljci.
- // Povećava prirodnu otpornost biljke.



- Pripravak možemo primjeniti 3 puta za redom, s razmakom između tretmana 14 dana.
- Mikal<sup>®</sup> Flash primjenjujemo na zdravoj lozi. Ako smo opazili prve simptome bolesti, umjesto pripravka Mikal<sup>®</sup> Flash preporučujemo primjenu Mikal<sup>®</sup> Premium F koji posjeduje kurativno djelovanje.