

GRAH I GRAŠAK

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE

VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA	KARENCA
NAKON SJETVE, A PRIJE NICANJA	<ul style="list-style-type: none"> ■ STOMP AQUA 2,5 – 3,0 l/ha (dozvoljeno samo u grašku) 	jednogodišnje travne korove i smanjuje zakorovljenost jednogodišnjim širokolisnim korovima	OVP
U FAZI RAZVOJA 1 - 3 TROLISKE KULTURE	<ul style="list-style-type: none"> ■ CORUM 1,25 l/ha jednokratno iii ■ CORUM 1,25 l/ha u split aplikaciji (0,625 + 0,625 l/ha u razmaku 7–10 dana) 	jednogodišnje širokolisne i jednogodišnje uskolisne korove	35 dana
U FAZI RAZVOJA 4. LISTA KULTURE (BBCH 14)	<ul style="list-style-type: none"> ■ BASAGRAN 480 2,0 l/ha jednokratno iii ■ BASAGRAN 480 2,0 l/ha u split aplikaciji (1+1 l/ha uz dodatak okvašivača kod svake primjene) 	jednogodišnje širokolisne korove	OVP
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO KOD OPASNOSTI OD POJAVE BOLESTI	■ CUPRABLAU Z 1,5 kg/ha uz utrošak vode 300 – 1000 l/ha (15 g na 10 l vode / 150 g na 100 l vode)	plamenjaču	3 dana
	■ CHROMOSUL 80 0,3 – 0,4% (30 – 40 g na 10 l vode)	pepelnicu	14 dana
	■ SIGNUM 1,0 kg/ha (dozvoljeno samo u grahu)	sivu plijesan, hrđu graha	21 dan
U VEGETACIJI, KOD POJAVE ŠTETNIKA	■ FASTAC 10 EC 0,3 l/ha	stakleničkog štitastog moljca, duhanovog štitastog moljca	7 dana za grah, 14 dana za grašak
	■ FASTAC 10 EC 0,15 l/ha	lisne uši, gusjenice sovice pozemljuša, sovice	
	■ FASTAC 10 EC 0,125 l/ha	prugaste pipe mahunarke	
	■ FASTAC 10 EC 0,1 l/ha	crnog graškovog savijača	
	■ ROTOR SUPER 300 – 500 ml/ha uz utrošak vode 500 – 1000 l/ha	žutu kukuruznu sovicu, zelenu breskvinu uš, lisne uši, sovice pozemljuše	7 dana



NAPOMENA:

- Sredstvo CORUM ne primjenjivati u grahu zrnašu nakon stadija formiranja bočnih izdanaka (BBCH 21). U slučaju jake zakorovljenosti uskolisnim korovima preporuča se koristiti CORUM u kombinaciji s graminacidom. Zbog bolje učinkovitosti preporuča se koristiti sredstvo CORUM u kombinaciji s okvašivačem DASH HC, sukladno uputi za primjenu sredstva navedenoj na etiketi i/ili popratnom listu.