



# JAGODA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE



VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA
PRIJE SADNJE (15 dana)	■ <b>STOMP AQUA</b> 2,5 - 3,0 l/ha uz inkorporaciju u tlo	jednogodišnje uskolisne korove i smanjuje zakorovljenost jednogodišnjim širokolisnim korovima
PRIJE CVATNJE	■ <b>CUPRABLAU Z</b> 1,5 kg/ha uz utrošak vode 300 - 1000 l/ha	običnu pjegavost lista, crvenu pjegavost lista
	■ <b>CHROMOSUL 80</b> 3 kg/ha ili ■ <b>STROBY WG</b> 0,03% (30 g na 100 l vode) +	pepelnicu
	■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,3 l/ha	stakleničkog štitašnog moljca, duhanovog štitašnog moljca
	■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,15 l/ha	lisne uši, gusjenice sovice pozemljuša, sovice
	■ <b>ROTOR SUPER</b> 250 - 500 ml/ha uz utrošak vode 500 - 1000 l/ha	lisne uši
U VEGETACIJI, KOD POJAVE PUŽEVA	■ <b>PUŽOMOR</b> 30 - 40 kg/ha (300 - 400 g na 100 m <sup>2</sup> )	štetne puževe
POČETAK I KRAJ CVATNJE	■ <b>SIGNUM</b> 1,5 kg/ha ponoviti SIGNUM za 7 dana - blok metoda	sivu plijesan
FORMIRANJE PLODOVA	■ <b>SIGNUM</b> 1,5 kg/ha ponoviti SIGNUM za 7 dana - blok metoda	sivu plijesan
	■ <b>ROTOR SUPER</b> 250 - 500 ml/ha uz utrošak vode 500 - 1000 l/ha	lisne uši
NAKON BERBE	■ <b>CUPRABLAU Z</b> 1,5 kg/ha uz utrošak vode 300 - 1000 l/ha	običnu pjegavost lista, crvenu pjegavost lista