



Agrimatco

# 2019 Katalog

Sjeme povrća i prihrana  
povrtnih kultura



# Agrimatco d.o.o. - dio Agrimatco grupe

Poštovani proizvođači i partneri,

Agrimatco grupa ima tradiciju dugu više od 80 godina te vam sa zadovoljstvom predstavljamo naš novi katalog u kojem nudimo već provjereni i iznimno kvalitetan izbor novih hibrida povrća. Sedam sjemenskih tvrtki Vilmorin-Mikado, Sakata, Duna, Semo, United Genetics, ISI Sementi i Zada seeds imaju veliko iskustvo u istraživanju, proizvodnji i doradi visoko kvalitetnog sjemena povrća. Osim sjemena povrća, predstavljamo Vam i naš prodajni program gnojiva. Tvrta DRT proizvođač je visoko kvalitetnih vodotopivih gnojiva Novalon, koja sadrže izbalansirani omjer makro i mikro elemanata. Tvrte Cosmocel i Albamilagro proizvode odlične biostimulatore, poboljšavače rasta makro i mikro hranjiva. U ovom katalogu objedinili smo savjete za prihranu povrtnih kultura i pregled vrhunskih hibrida i sorata, kako bi smo Vam pomogli u planiranju prozvodnje i ostvarivanju vrhunskih prinosa.

Želimo Vam puno uspjeha u nadolazećoj sezoni i bogatu žetu.



Agrimatco tim

## Direktor

**Stjepan Kanižaj**, dipl. ing. agronomije

+385 (0)98 387 012, stjepan.kanizaj@agrimatco-eu.com

## Komercijalni sektor

**Ana Čukalevski**, dipl. oec.

voditelj računovodstva

+385 (0)99 3083 589, ana.cukalevski@agrimatco-eu.com

**Ivana Ivanković**, dipl. oec.

uvoz i logistika

+385 (0)99 4974 400, ivana.ivankovic@agrimatco-eu.com

**Ksenija Apostolovski**

administrativni asistent, narudžbe sjemena povrća, Zagreb

+385 (0)98 460 665, ksenija.apostolovski@agrimatco-eu.com

**Oliver Ivančić**

skladište i logistika

+385 (0)98 9821 451, oliver.ivancic@agrimatco-eu.com

Agrimatco d.o.o.

Jelengradska 12, 31208 Petrijevci

OIB: 24373689835

agrimatco.croatia@agrimatco-eu.com

[www.agrimatco.hr](http://www.agrimatco.hr)

Ured i skladište sjemena Zagreb

Antuna Gottlieba 3, 10090 Zagreb

Narudžbe sjemena

Tel: 01/3461-954

Fax: 01/3453-106

Gnojiva i sredstva za zaštitu bilja

Jelengradska 12, 31208 Petrijevci

Narudžbe gnojiva i SZB

Tel: 031/398-027

Fax: 031/398-028

## Stručni savjetnici

**Tomislav Zrinski**, ing. agronomije

stručni savjetnik za sjeme povrća, gnojiva i sredstva za zaštitu bilja, sjeverozapadna Hrvatska

+385 (0)99 4746 906, tomislav.zrinski@agrimatco-eu.com

**Matija Erhatić**, poljoprivredni tehničar

stručni savjetnik za sjeme povrća, središnja i istočna Hrvatska

+385 (0)99 3083 588, matija.erhatic@agrimatco-eu.com

**Kristina Antolić**, dipl. ing. agronomije

stručni savjetnik za sjeme povrća i gnojiva, Zagreb i zapadna Hrvatska

+385 (0)99 6023 068, kristina.antolic@agrimatco-eu.com

**Ivica Vrankulj**, dipl. ing. agronomije

stručni savjetnik za sjeme povrća, Dalmacija

+385 (0)99 7383 138, ivica.vrankulj@agrimatco-eu.com

**Vinka Pospisil**, dipl. ing. agronomije

stručni savjetnik za SZB i gnojiva, Slavonija i Baranja

+385 (0)99 7383 498, vinka.pospisil@agrimatco-eu.com

**Duro Rađenović**, dipl. ing. agronomije

stručni savjetnik za SZB i gnojiva, Slavonija

+385 (0)99 2185 147, djuro.radjenovic@agrimatco-eu.com

**Darko Rabudić**, ing. agronomije

stručni savjetnik za gnojiva i sredstva za zaštitu bilja, Zapadna Hrvatska

+385 (0)99 4642 989, darko.rabudic@agrimatco-eu.com



# SADRŽAJ

	Agrimatco tim .....	2
	Kupus .....	4
	Kelj/Kineski kupus .....	8
	Brokula .....	10
	Cvjetača .....	12
	Rotkvica/Korabica/Crna rotkva .....	16
	Mrkva .....	19
	Peršin/Celer/Paštrnjak .....	22
	Luk .....	24
	Poriluk/Prihrana luka .....	26
	Cikla .....	27
	Lubenica .....	28
	Dinja .....	31
	Tikvica/Mahuna .....	34
	Tikva .....	36
	Salata batavija .....	38
	Salata puterica .....	42
	Salata iceberg/endivija .....	43
	Salata hrastov list .....	44
	Špinat .....	45
	Rajčica .....	49
	Paprika .....	54
	Krastavac .....	60
	Patlidžan .....	61
	Šećerac .....	62



 **SAKATA®**

### Elisa F1

Vrlo rani hibrid za svježu upotrebu. Čvrsta, okrugla glavica, tamno zelenih listova. Za ranu proizvodnju, sadnja između veljače i travnja što ovisi da li se proizvodi u zaštićenom prostoru ili na otvorenom. Jedan od najukusnijih kupusa na tržištu, zadržava slatkoću i u sirovom stanju i skuhani.



 **SAKATA®**

### Candisa F1

Vegetacije 55-60 dana. Težine oko 1,5 kg. Tamne zelene boje. Okrugla glavica, vrlo ukusna, kratkog kocena. Odlične unutarnje strukture.



  
**MIKADO**

### Delight Ball F1

Vrlo otporan na prorast. Može se uzgajati u tunelu i na otvorenom polju. Pravilan oblik, svježa tamno zelena boja. Izvrsno zatvaranje glavice.



# Bijeli kuples



4

### Nozomi F1

Kuples vegetacije oko 60 dana. Odličan izgled i unutarnja struktura. Ujednačenih glavica težine 1,3 – 2,0 kg. Dobro se održava na polju. Umjerene otpornosti na Xanthomonas.

 **SAKATA®**

Hibrid	Vegetacija	Sklop x 1000	Težina kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elisa	55	50 - 55	0,8 - 1,2	○	○	○			○	○	○				
Candisa	55 - 60	50 - 70	1,0 - 1,5	○	○	○		○	○	○					
Delight Ball	55 - 60	50 - 70	0,8 - 1,5	○	○	○		○	○	○					
Nozomi	60 - 65	40 - 70	1,5 - 2,0	○	○	○		○	○	○					

 **SAKATA®**

### Charmant F1

Hibrid sa najboljom sposobnošću stajanja na polju u ranom segmentu. Vegetacije oko 65 dana. Vrlo kompaktan. Srednja veličina glavice. Tolerantan na vršnu palež listu. Visoke otpornosti na Fusarium (HR) i bakterijske bolesti.

 **SAKATA®**

### Supreme Vantage F1

Vegetacije 70-75 dana. Srednje, kompaktne glave, težine 1,5- 2,0 kg, svijetle zelene boje. Rani hibrid za ljetnu proizvodnju i svježu potrošnju. Odlično se održava na polju.

 **SAKATA®**

### Hypo F1

Hibrid za ljetnu proizvodnju, odlično podnosi visoke temperature i visoke tolerantnosti na trips, vegetacije oko 80 dana. Glavica je tamno zelene boje i lijepog oblika, mogućnosti dugog stajanja na polju bez opasnosti od pucanja. Težina oko 2-3 kg. Odličnog okusa i lijepo unutarnje strukture. Veoma lak za proizvodnju i ima visok potencijal za prinos.

## Bijeli kupus



Hibrid	Vegetacija	Sklop x 1000	Težina kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Charmant	70 - 75	40 - 60	1,0 - 1,5	sadnja berba		○	○	○							
Supreme Vantage	70 - 75	40 - 65	1,5 - 2,0	sadnja berba		○	○	○		○	○	○			
Hypo	80 - 90	40 - 45	2,0 - 2,5	sadnja berba		○	○	○		○	○	○			

 **SAKATA®**

### Monroo F1

Vegetacijske 85-90 dana. Težine 1,5-2,0 kg. Vrlo kompaktan. Tamne zelene boje. Okrugle glave, dugo može stajati na polju da ne puca i ostaje kompaktna. Visoke otpornosti na Foc:1.

 **SAKATA®**

### Coronet F1

Kupus za skladištenje i svježu potrošnju. Snažna biljka. Odlično se održava na polju. Vegetacijske oko 110 dana. Visoke otpornosti na Fusarium conglutinans. Pogodan za čuvanje tijekom sezone od studenog pa sve do ožujka.

 **SAKATA®**

### Fighter F1

Hibrid pogodan za vrlo dugo skladištenje, vegetacijske 120 - 140 dana. Vrlo težak i nabit 2,5 - 3,5 kg. Visoka otpornost na Fusarium conglutinans (Foc).



# Bijeli kupus

Hibrid	Vegetacija	Sklop x 1000	Težina kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Monroo	90 - 95	40 - 50	1,5 - 2,0	sadnja berba			○	○	○			○	○	○	○
Coronet	100 - 110	30 - 50	1,5 - 2,5	sadnja berba			○	○	○			○	○	○	○
Fighter	120 - 140	25- 45	2,5 - 3,5	sadnja berba čuvanje	○	○	○	○				○	○	○	○



 **SAKATA®**

### Marloo F1

Hibrid za kiseljenje. Plosnato-okrugla glava. Snažna biljka. Dobre otpornosti na vrućinu i hladnije uvjete. Vegetacija oko 90 dana. Težina glave 3,0 - 3,5 kg. Visoke otpornosti na Fuzarijum (Foc) i Xantomonas.



 **SAKATA®**

### Rookie F1

Rani crveni kupus vegetacije oko 70 - 75 dana od rasađivanja s velikom ujednačenošću glavice veličine 1,5 - 2 kg. Glavica je zbijena, s kratkim kocenom i odličnom crvenom bojom koja se zadržava i tijekom kuhanja. Pogodan za sadnju tijekom cijele godine.

## Bijeli / Crveni kupus



Hibrid	Vegetacija	Sklop x 1000	Težina kg	sadnja berba	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Marloo	90 - 100	30 - 40	3,0 - 3,5	sadnja berba				○	○	○						
Rookie	70 - 75	40 - 45	1,5 - 2,0	sadnja berba				○	○	○	○	○	○	○	○	○



 **SAKATA®**

### Estoril F1

Rani kelj koji sazrijeva za 65-75 dana. Idealan za proizvodnju tijekom cijele sezone. Težina glavice oko 1-1,5 kg. Dobro podnosi više temperature tijekom ljetnjih mjeseci. Visoke toleran-tnosti na Fusarium.





### Savostar F1

Rani hibrid kompaktne glavice težine oko 1,5 kg. Dužina vege-tacije od 70 - 75 dana. Lijepo srednje zelene boje.



 **SAKATA®**

### Kiseki F1

Novi hibrid vegetacije od 63-68 dana. Žut na presjeku izvana tamno zelen cilindričnog oblika glavice. Dugo zadržava boju za vrijeme skladištenja. Viskoke je otpornosti na kupusnu kilu, vršnu palež te plamenjaču.



## Kelj/Kineski kupus

Hibrid	Vegetacija	Sklop x 1000	Težina kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Estoril	65	50	0,8 - 1,5	sadnja berba											
Savostar	70 - 75	40 - 45	1,5	sadnja berba											
Kiseki	63 - 68	40 - 45	1,5	sadnja berba											

# Proizvodi odobreni za primjenu u organskoj proizvodnji EC 834/2007 i 889/2008

## DELUMBRI LIMAX

je repelentna smjesa na vodenoj bazi načinjena od koncentriranih ekstrakata biljaka i biljnih ulja bez kemijskih dodataka vrlo intenzivnog mirisa. Koristi za odbijanje puževa, zečeva, ptica i zemljišnih štetnika koji napadaju zeljaste usjeve (povrtni i ratarske kulture), drveće, hortikulturu, industrijsko bilje, travnjake i golf igrališta. Proizvod ima efekt repelenta za štetnike u tlu i na biljkama, prisiljavajući ih da se ne hrane biljkama.

Preporuča se primjeniti DELUMBRI LIMAX preventivno u fazi intenzivne vegetacije u svim povrtnim i ratarskim kulturama. Primjena – folijarno prskalicama, atomizerima i sistemom za fertirigaciju. Proizvod nema karencu.

### Smjernice primjene

	Folijarno	Navodnjavanje (kap na kap)
Preventivno	2,5-4 l/ha	5-10 l/ha
Kuratивno	5-6 l/ha	10-15 l/ha

Koristiti od 250-600L vode/ha (folijarno u koncentraciji 1%).




## FOLISEC

je vodena, visoko koncentrirana smjesa napravljena od specifičnih biljnih koncentrata koja se koristi kod biljaka u poljoprivredi i hortikulturi. Koristi se kada je potrebno stimulirati korijen i razviti povećanu otpornost i vitalnost biljke, jer plodna tla i ne povoljni uvjeti rasta i razvoja mogu učiniti biljku osjetljivom na insekte (bijela mušica, grinje, lisne uši, lisni miner, sovice, štitaste uši, trips).



## HERFOMYC

je vodena, visoko koncentrirana smjesa napravljena od specifičnih biljnih koncentrata koja se koristi u poljoprivredi i hortikulturi. Koristi se kada je potrebno stimulirati korijen i razviti povećanu otpornost i vitalnost biljke na pojavu bolesti (pjegavost lista, hrđa, pljesan) zbog ne povoljnih uvjeta rasta i razvoja.



## HERFOSEC

je vodena, visoko koncentrirana smjesa napravljena od specifičnih biljnih koncentrata koja se može koristiti kod zeljastih biljaka u poljoprivredi i hortikulturi. Koristi se kada je potrebno stimulirati korijen i razviti povećanu otpornost i vitalnost biljke, jer plodna tla i ne povoljni uvjeti rasta i razvoja mogu učiniti biljku osjetljivom na insekte (bijela mušica, trips, štitaste uši, lisne uši, grinje).



## FOLISEC, HERFOMYC i HERFOSEC

su proizvodi koji podržavaju prirodni regenerativni kapacitet, njeguju i pojačavaju učinak na biljku jer tlo i korijen mogu biti zahvaćeni vanjskim uzročnicima. To su prirodni proizvod biljnog podrijetla, a otopljeni u vodi se mogu posipati ili prskati te ostaju na snazi dva do tri tjedna i usvajaju se kroz tlo, korijenje i lišće biljke.

POVRŠINA (m <sup>2</sup> )	NORMALNA DOZA		POVEĆANA DOZA	
	FOLISEC, HERFOMYC i HERFOSEC	VODA	FOLISEC, HERFOMYC i HERFOSEC	VODA
1000	1 litra	50 - 100 litara	2 litre	50 - 100 litara
5000	5 litara	250 - 500 litara	10 litara	250 - 500 litara
10000	10 litara	500 - 1000 litara	20 litara	500 - 1000 litara

 **SAKATA®**

## Green Magic F1

Vrlo rani hibrid vegetacije oko 60 dana. Srednje snažna biljka sa malo postranih izboja. Cvjet polu kupolast, težine 300 - 500 g. Sitno zrno, tamno zelene boje. Dobro podnosi više temperature. Umjereno otporan na White Blister.



# Brokula

 **SAKATA®**

## Eos F1

Rani hibrid, vegetacije od 67 - 73 dana, za proljetnu i jesensku proizvodnju, cvjet je nabit i tamno zelene boje težine od 400 - 600 g.

 **SAKATA®**

## Naxos F1

Hibrid namijenjen za berbu preko ljeta. Čuvanje na polju i postojanost glavica nakon berbe su odlični. Biljka snažna, visok položaj glave. Vegetacije oko 75 dana. Cvjet tamno zelen, kupolast, zrna sitna. Visok kvalitet cvata za berbu preko ljeta. Pogodan i za jesensku berbu. Dobra otpornost na fiziološki poremećaj Brown Beads.



Hibrid	Vegetacija	Težina kg	Cvjet zrna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Green Magic	60	0,3 - 0,5	sitan	sadnja berba		○	○								
Eos	67 - 73	0,4 - 0,6	sitan	sadnja berba	○	○	○		○	○					
Naxos	75	0,5 - 0,7	sitan	sadnja berba	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	



## Parthenon F1

Snažna otvorena biljka. Malo postranih izboja. Vegetacije 80 - 85 dana. Cvat duboke zelene boje. Težine 0,6 - 0,8 kg, kupolastog oblika, sitnog zrna. Za svježu potrošnju i preradu. Dobre otpornosti na stres (toplo/hladno). Visoko tolerantan na šupljikavost stabljike i crvenilo cvata u hladnjim uvjetima. Mediteran berba 12. - 1. mjesec.



Hibrid	Vegetacija	Težina kg	Cvat zrna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Parthenon	85	0,6 - 0,8	vrlo sitan	sadnja berba	★				○ ○	★ ★			○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
Triton	68 - 78	0,5 - 0,7	sitan	sadnja berba		○ ○ ○ ○				○ ○ ○ ○					
Spiridon	110	0,6 - 0,8	sitan, vrlo fin	sadnja berba	★ ★ ○				★ ★				○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
Marathon	80	0,4 - 0,6	sitan	sadnja berba		○ ○ ○			○ ○ ○				○ ○ ○	○ ○ ○	

★ Rokovi sadnje i berbe za Mediteran.



## Triton F1

Srednje rani hibrid vegetacije oko 68 - 78 dana, malo raniji od Parthenona, krupne glave iznad 500 g, vrlo dobra postojanost nakon berbe, za svježu upotrebu i industriju.



## Spiridon F1

Najnovija generacija kasne brokule. Kupolasti cvat je izuzetne kvalitete. Jako zbita i teška. Vrlo ujednačena. U slučaju vrlo vlažne zime preporučuju se 1 - 2 tretiranja protiv plamenjače.

# Brokula



## Marathon F1

Vrlo fleksibilan hibrid. Biljka srednje veličine, radi postrane izboje. Vegetacije oko 80 dana. Cvati plavo zelen, težine 400 - 600g, sitna zrna. Polukupolast oblik.



 **SAKATA®****Cashmere F1**

Hibrid za ranu proizvodnju, vegetacije oko 65 dana. Ujednačene berbe. Cvat zbijen i dobro pokriven.

 **SAKATA®****White step F1**

Cvjetača vegetacije 70-75 dana, za proljetnu/ljetnu proizvodnju, odличno pokrivena kompaktna cvata, za svježu potrošnju.

 **SAKATA®****Concept F1**

Hibrid za kasnu ljetnu i jesensku proizvodnju. Vrlo bijele kompakte cvati. Odlično samopokrivanje. Vegetacije do 80 dana. Visoke kvalitete.



# Cvjetača

Hibrid	Vegetacija	Vigor	Samopokrivanje	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cashmere	65	3	4	sadnja berba		○	○			○	○				
White step	70 - 75	4	4	sadnja berba		○	○	○		○	○				
Concept	80	3	5	sadnja berba		○	○	○		○	○	○			



### Merton F1

Novi hibrid vegetacije oko 80 dana za jesensku, a može i kasnu ljetnu berbu. Snažan korijen omogućava dobre rezultate u raznim uvjetima proizvodnje. Cvat zbit, dobro zaštićen lišćem, lijepo bijele boje, srednje jak vigor. Može se koristiti za industriju.



### Kastor F1

Vegetacije oko 80 dana. Za jesensku proizvodnju. Vrlo pouzdan i prilagodljiv hibrid. Odlično pokrivanje cvata. Vrlo ujednačen cvat. Umjerenoto tolerantan na vršnu palež listu.



### Incline F1

Odlična kvaliteta cvata sa vrlo dobrim samopokrivanjem. Dobre otpornosti na šupljikavost stabljike. Vegetacije 90 dana.

## Cvjetača



Hibrid	Vegetacija	Vigor	Samopokrivanje	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Merton	80	4	5	sadnja berba		○	○	○							
Kastor	80	3	5	sadnja berba					○	○	○				
Incline	90	5	5	sadnja berba				○	○	○	○	○	○	○	○

★ Rokovi sadnje i berbe za Mediteran.



 **SAKATA**<sup>®</sup>

### Trofeo F1

Cvjetača vegetacije oko 130 dana.  
Snažna biljka plavo - zelenih listova.  
Srednje visoka. Cvjet dobro pokriven,  
zbijen, vrlo bijel.



 **SAKATA**<sup>®</sup>

### Amandine F1

Cvjetača 110 - 120 dana vegetacije,  
snažna biljka sa odličnim samopo-  
krivanjem, iznimno bijel i čvrst cvat  
otporan na hladnoću.





### Cendis F1

Odlična kvaliteta cvata sa vrlo dobrim  
samopokrivanjem. Dobre otpornosti na  
šuplikavost stabljike. Vegetacije 140 -  
150 dana.



# Cvjetača

Hibrid	Vegetacija	Vigor	Samopokrivanje	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trofeo	140 - 150	4	4	sadnja berba	★	★									
Amandine	110 - 120	4	5	sadnja berba	★	★									
Cendis	140 - 150	4	5	sadnja berba	★	★									

★ Rokovi sadnje i berbe za Mediteran.

**Vilmarin**

### Vedis F1

Hibrid vegetacije 230 - 240 dana. Za zimsku proizvodnju. Snažna biljka, vrlo dobra pokrivenost ploda. Visoko tolerantan na maljavost. Kompaktna biljka. Dobre otpornosti na Mycosphaerella.



Hibrid	Vegetacija	Vigor	Samopokrivanje	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vedis	230 - 240	4	4	sadnja berba		○	○				○	○			
Mildis	210	3	3	sadnja berba	○	○					○	○			
Clovis	160 - 170	4	5	sadnja berba	○					○	○				
Dionis	200	4	4	sadnja berba	○	○				○	○				

**Vilmarin**

### Mildis F1

Biljka uspravna, snažna. Teška cvata sa odličnim samopokrivanjem. Umjetno otporna na Ring Spot-Mycosphaerella brassicicola. Vegetacije oko 210 dana.

**Vilmarin**

### Clovis F1

Vrlo snažna biljka, odlična zaštita cvata, dobra otpornost na hladnoću. Daje tešku cvat, duboko bijele boje. Vegetacije 160 - 170 dana.

## Cvjetača



### Dionis F1

Cvjetača vegetacije oko 200 dana. Snažna biljka, vrlo dobro pokriven cvjet. Za zimsku proizvodnju. Vrlo ujednačena. Visoke tolerantnosti na maljavost. Umjerena otpornost na Mycosphaerella.

**Vilmarin**



 **SAKATA®**

### **Cheriette F1**

Rani hibrid, vrlo ujednačenih krupnih plodova. Atraktivne svijetlo crvene boje. Dugo drži kvalitetu na polju. Može se koristiti cijele godine u proizvodnji. Posebno pogodna za zimsko/proljetnu proizvodnju u plastenicima.





### **Tinto F1**

Rana sjajno crvena rotklica, vrlo ujednačena i kvalitetna, preporuča se za unutarnju i vanjsku proizvodnju.



 **SAKATA®**

### **Quick Star F1**

Ekstra rana korabica za proljetnu, ljetnu i jesensku proizvodnju. Izuzetno brzog porasta, svijetlo zelene boje sa tamnjim uspravnim listovima. Odlične kvalitete bez sadržaja celuloznih vlakana.



## **Rotklica/Korabica/Crna rotkva**




### **Panter**

Crna rotkva okruglih i vrlo ujednačenih korijena, korijeni su u promjeru 6- 9cm, dozrijeva 70 dana od sjetve, pogodna je za svježu upotrebu i dugotrajno skladištenje.



# Prihrana kupusnjača folijarno i kroz sustav kap na kap



## Rootex

Rootex je snažna formula sa visokom koncentracijom fosfora, organskih ekstrakata, slobodnih aminokiselina, savršena za jačanje korijena u svim fazama rasta.

N=7%

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>=47%

K<sub>2</sub>O=6%

L-aminokiseline

i organski ekstrakti=18,5%

## Tropicel

Vodotopivo gnojivo za folijarnu primjenu za bolju cvatnju i oplodnjvu, poboljšava zmetanje, razvoj i obojenost plodova.

B=10%

Zn=10%

Mo=0,5%

L-aminokiseline=3%

Organski ekstrakti=2%

## Kelatex B

Suhu topivo gnojivo, do- biveno iz borne kiseline i natrij-tetraborata, posebno pripravljeno da spieči pomanjkanje bora i liječi od njegovog nedostatka.

B=17%

L-aminokiseline=3%

Organski ekstrakti=2%

## Inex

Okvašivač, penetrator i aktivator

Visokokvalitetni ne-ionski, surfaktant koji ne pjeni, formuliran posebno za poboljšanje performansi većine pesticida: insekticida, fungicida, herbicida, također pojačava apsorpciju i translokaciju folijarnih gnojiva. Pakiranje: 0,33l, 1l i 5l

## Kalex Cu

Tekuće gnojivo s visokim sadržajem organskog bakra (Cu). Brzo se ugrađuje u staničnu stjenku te povećava otpornost biljke na abiotske i biotske nepovoljne čimbenike. Potiče prirodni obrambeni sistem u biljci.

N=4,3%

P=30%

B=0,19%

Cu=5,8%

Zn=0,17%

## Staygreen

Zaštita biljaka od stresnih klimatskih utjecaja (hladnoća, mraz, injе, ožegotine) i mehaničkih oštećenja (tuča, hladnoća, vjetar).

Cu=0,23%

Mn=1,17%

Zn=1,17%

## SIMPTOMI NEDOSTATAKA BIOGENIH ELEMENATA - Kupusnjače



## Prihrana presadnica u kontejnerima

Formulacija	Vrijeme prihrane	Količina	Napomena	Pospješuje
Rootex	Prva prihrana 10-15 dana nakon nicanja			
Novalon 12-48-6+TE	Druga prihrana 10 dana nakon prve prihrane	30-50gr / 10l vode zaljevanjem	Primjena preko lista (folijarno) ili zalijevanjem i potapanjem rasade	Razvoj korijenovog sustava
Kalex Cu	Za vrijeme intenzivnog rasta	20 - 30 ml na 10l vode		Spriječava gljivična oboljenja
H-85	Neposredno prije sadnje	1kg/1000m <sup>2</sup>	Unijeti u tlo	Poboljšivač – kvaliteta i bolji rast biljaka



## Prihrana kupusnjača

Formulacija	Vrijeme prihrane/fenofaza	Količina	Napomena	Pospješuje
Trazex	1. Faza - startna gnojidba tla - prije presadišanja	2 kg Trazexa uz YARA NPK 7-12-25 od 300-400kg/ha	Gnojivo rasipati po čitavoj površini i unijeti sjetvospremaćem na 5-10 cm	Otklanja nedostatak mikroelemenata (brokula, cvjetača)
Novalon 12-48-6+TE ili	2. Faza - ukorijenjivanje presadnica	0,5 g/1l vode	Primjena sustavom kap na kap	Razvoj korijenovog sustava
Rootex		0,25 g/1l vode		
Novalon 20-20-20+TE	3. Faza - do savijanja glavica	3-5 kg/ha folijarno, 1x tjedno ili 0,5 - 1,5 g/1l vode kap na kap	Kod folijarne primjene koristiti okvašivač Inex u dozi 0,1% po ha na 200 l vode	Vegetativan porast
Kelatex B		1 kg/ha, folijarno		Pospješuje transport asimilata i rast
Novalon 15-5-35+TE		5 kg/ha, jednom tjedno		
Kalex Cu	4. Faza - savijanje glavica	1 l/ha	Primjena preko lista (folijarno) ili kroz sustav kap na kap 1-1,5 g/ 1l vode	Pospješuje kvalitetu plodova (Kalex Cu smanjuje bakterioze i virose ploda)
Keymag 10-0 40+2MgO ili Novalon 6-12-36+3MgO		5 kg/ha, jednom tjedno		
Calcium Mainstay	5. Faza - od 70% formirane glave do berbe	3-5 l folijarno, u intervalima do 10-14 dana	Pogodan za kisela tla, smanjuje toksični efekt teških metala, potiče mikrobakteriološku aktivnost	Poboljšava konzistenciju staničnih zidova, kvalitetu ploda i jača otpornost na bolesti
Bioplex	Ljetne visoke temperature, posebno nepovoljni uvjeti	0,5 l/ha folijarno	Primjena u intervalima 10-14 dana. Koristiti ga pri zaštiti protiv bolesti i štetnika. Aplikirati zajedno sa folijarnim gnojivima kroz cijelu sezonu	Jača metaboličke aktivnosti biljaka u stresnim uvjetima



Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, PH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Preporučamo koristiti okvašivač Inex kod svake folijarne primjene u dozi od 50 ml na 100 l vode.



Vilmorin

## Presto F1

Vrlo rani hibrid kompaktne lisne mase, pogodan za strojno vađenje. Korijen je vrlo ujednačen i dobro završen. Osigurava vrlo visok prinos. Vegetacije oko 80 dana. Visoke otpornosti na procvjetavanje pa se može koristiti u proizvodnji preko zime.



Vilmorin

## Subito F1

Novi hibrid za ranu proizvodnju. Snažan spoj lista i korijena, pogodna za mehaničku berbu. Vrlo dobar odnos dužine i promjera korijena. Visoko tolerantna na prerano procvjetavanje. Dobre je otpornosti na pucanje korijena te umjerene na Alternaria dauci i Cercospora carotae. Vegetacija 90 oko dana.



Vilmorin

## Exelco F1

Rani hibrid. Vrlo uspravno lišće, srednje zelene boje, snažne rozete. Odlične otpornosti na procvjetavanje. Vrlo gladak korijen, dobre vanjske i unutarnje boje. Vrlo ujednačen. Izvrsne otpornosti na lom. Visoko prinosna. Umjerene otpornosti na: Cavity spot.

Mrkva



Hibrid	Tip	Vegetacija	Dužina korijena (cm)	Otpornost Alternatia dauci	Otpornost Oidium	Otpornost Pythium	Namjena
Presto	Nantes	75 - 80	18 - 20	-	-	-	svježe
Subito	Nantes	85 - 90	18 - 20	IR	-	-	svježe
Exelco	Nantes	80 - 85	18	-	IR	IR	svježe



## Musico F1


Hibrid za ranu proizvodnju. Dužina korijena 16 - 18cm. Umjerene otpornosti na Alternaria dauci. Uspravno lišće, snažan spoj lista i ploda.  
Odlična kvaliteta ploda.



# Mrkva

## Octavo F1

Hibrid uspravnih snažnih listova, dobre otpornosti na mraz, pogodan za glavnu sezonu i zimsku berbu, visokog prinosa. Cilindričan korijen, dužine 18-20 cm, vrlo gladak, bez prstena. Visoke tolerantnosti na retrovegetaciju, vegetacije 100-110 dana. Umjerene otpornosti na Alternaria dauci i Powdery mildew.



## Soprano F1

Maestro tip sa kraćim ciklusom. Vrlo lijep, dobro obojen korijen. Pogodan za glavnu sezonu. Snažan uspravan list. Odlična otpornost na procvjetavanje.



Hibrid	Tip	Vegetacija	Dužina korijena (cm)	Otpornost Alternaria dauci	Otpornost Oidium	Otpornost Pythium	Namjena
<b>Musico</b>	Nantes	80 - 85	16 - 18	IR	-	-	svježe
<b>Octavo</b>	Nantes	100 - 110	18 - 20	IR	IR	IR	svježe, prerada, skladištenje
<b>Soprano</b>	Nantes	100 - 110	18 - 22	HR	HR	IR	svježe, prerada, skladištenje

**Vilmarin**

### Bolero F1

Hibrid za glavnu sezonu i skladištenje. Univerzalan hibrid, jakog vigora naročito snažan u fazi nicanja. Vrlo snažan list sa visokom razinom otpornosti na Alternaria dauci, Pepelnica, Cercosporu i Xantho-monas. Umjerene otpornosti na Cavity Spot (Pythium). Dobar prinos i izvrstan okus (pobjednik na ispitivanjima u Švicarskoj, Danskoj, Njemačkoj, Francuskoj) kao i dobra sposobnost skladištenja. Vegetacija 110 - 120 dana.

**Vilmarin**

### Maestro F1

Glatkoća, vanjska boja i ujednačenost, zajedno sa visokom otpornošću na bolesti (Alternaria dauci, Pepelnica, Pythium) daju sigurnost proizvođačima. Maestro također posjeduje umjerenu otpornost na Xanthomonas. Tamno zelena, snažna, uspravna i čvrsta lisna masa omogućava lakše vađenje. Hibrid pogodan za glavnu sezonu i skladištenje. Nakon pranja dugo zadržava boju i sjaj što čini Maestro standardnim proizvodom na policama svjetskih supermarketa. Vegetacije 120 - 130 dana.

**Mrkva**

Hibrid	Tip	Vegetacija	Dužina korijena (cm)	Otpornost Alternatia dauci	Otpornost Oidium	Otpornost Pythium	Namjena
<b>Bolero</b>	Nantes	110 - 120	18 - 22	HR	HR	HR	svježe, prerada, skladištenje
<b>Maestro</b>	Nantes	120 - 130	18 - 20	HR	HR	HR	svježe, prerada, skladištenje

**semo®**

### Atika

Rana sorta, brzog porasta s visokom otpornšću na pepelnici. Korijen gladak, duguljast i širok. Odlična sorta za vezice. Gladak, sjajan korijen i duga mogućnost skladištenja čine sortu vrlo pogodnom za industriju - posebno sušenje.

**semo®**

### Orbis

Srednje rana sorta, visokog prinsosa. Korijen srednje dužine, širok i duguljast. Orbis ima uspravno tamno zeleno lišće. Dobri rezultati i na težim tlima. Pogodan za duže skladištenje i sve vrste prerade.

**semo®**

### Jadran

Kasna sorta za dugo skladištenje. Visoke otpornosti na pepelnici. Vrlo gladak, dug i širok korijen. Lišće visoko, polu uspravno. Sorta pogodna za industriju ali i za ranu potrošnju u svježem stanju zbog vrlo brzog proljetnog porasta.



# Peršin/Celer/Paštrnjak



### Efez

Srednje kasna sorta peršina. Gladak, dug i širok korijen, dužine 20-23 cm. Odličan za duže skladištenje. Tolerantan na Powdery Mildew, hrđu i trulež.

**semo®**

Hibrid	Dozrijevanje	Vegetacija	Oblik	Dužina korijena (cm)	Skladištenje	Rozeta	Sjetva (obično sjeme/ha)	Napomena
Atika	rani	130	A	19 - 22	odlično	srednja	1,0 - 1,2	Tolerantan na pepelnici, za vezicu, gladak korijen
Orbis	srednje - rani	140	B	20 - 22	odlično	visoka	1,0 - 1,2	Tolerantan na pepelnici, dobar i na težim tlima
Jadran	kasni	150	A	20 - 22	odlično	visoka	1,1 - 1,3	Tolerantan na pepelnici, za pjeskovita tla
Efez	srednje - kasni	160	A	20 - 23	odlično	visoka	1,0 - 1,2	Tolerantan na pepelnici, hrđu i trulež

**semo®**

## Neon

Rana sorta celera glatkih glava bez šupljina. Snažan i zdrav korijenov sistem (nije osjetljiv na Septorioze) glavni su razlozi za visoke i stabilne prinose. Bijelo meso ne sadrži Antocyan i ostaje bijelo kod kuhanja. Pogodan za vrlo dugo skladištenje. Prikladan za sušenje i potrošnju u svježem stanju. Vegetacija oko 137 dana od presadivanja.

**Vilmarin**

## Gold Nugget F1

Srednje rani hibrid, vrlo uspravno lišće, pogodna za upotrebu kao kockice, naribana, za pire i rezance. Vrlo dobar okus, hrskava i sočna. Cilindričan korijen, vrlo gladak, jedinstvena limun žuta boja. Umjerene otpornosti na Alternaria dauci.

**semo®**

## Taborska žuta

Kasna mrkva Flakkee tip, vegetacija 150 dana, vrlo rodna, ujednačena, intenzivno žute boje korijena, pogodna za svježu upotrebu i industriju



# Peršin/Celer/Paštrnjak

Formulacija	Vrijeme prihrane/ fenofaza	Količina	Napomena	Pospješuje
Novalon 20-20-20+TE	Početak razvoja rozete, tj. razvijen 4. list (15-20 dana)	3-5 kg/ha		vegetativan porast
Kelatex B		100-400 g/ha	Važan u biljci pri transportu asimilata	Formiranje korijena, sinteza i kretanje šećera, čvrstoću i kvalitet ploda.
Trazex ili Agrofol 390	intenzivni porast	0,5 kg/ha ili 3-5 l/ha (Agrofol)	Idealan omjer mikroelemenata	Pospješuje otpornost biljaka na bolesti i napade štetnika.
Novalon 6-12-36+3MgO+TE	Intenzivan porast, do vađenja korijena	3-5 kg/ha		Intenzivan porast i kvalitetu plodova.
Calcinit Calcium Mainstay		3-5 kg/ha 3 l/ha	svakih 10 - 14 dana naimjenično, folijarno ili kroz sustav kap na kap	Pospješuje čvrstoću plodova.
Bioplex	Visoke temperature, nepovoljni uvjeti	0,3 - 0,5 l/ha svakih 7-10 dana	Biostimulator, L-aminokiseline i fitohormoni	Jačanje biljnih funkcija / antistres.

## Bielas

Rani pastrnjak,  
vegetacije oko 180 dana od sjetve.  
Korijen je gladak koničnog oblika. Pogodan za potrošnju u svježem stanju, dugo skladištenje i sve vrste prerade.





### Lorenzos F1

Srednje rani luk krupnih ujednačenih lukovica. Visoko prinosan. Snažno lišće, srednja debljina vrata. Dužina skladištenja oko 7 mjeseci.



# Luk



### Supernova F1

Srednje kasni hibrid. Snažna biljka. Lukovica okrugla, vrlo čvrsta i dobro pokrivena ljuškom. Visoko prinosan hibrid. Vrlo visok sadržaj suhe tvari što mu daje mogućnost dugog skladištenja.



### Khroma F1

Novi hibrid za ranu proizvodnju, dobre krupnoće i čvrstoće. Ljuska jako dobra za rani hibrid, srednje smeđe boje, pogodan za duže skladištenje.




### Aurora F1

Novi hibrid. Okrugle, krupne lukovice vrlo dobro pokrivenе ljuskom. Zlatno brončane boje. Visoko prinosan za dugo skladištenje.



Hibrid	Dozrijevanje	Vigor	Vrat	Krupnoća (mm)
Lorenzos	srednjerani	snažan	tanak	srednje krupni
Khroma	rani	snažan	srednji	srednje krupni
Aurora	srednje kasni	snažan	tanak	krupan
Supernova	srednje kasni	snažan	tanak	vrlo krupan



### Derek F1

Luk za proljetnu sjetvu, tamno smeđe boje ljuske, vrlo čvrsta lukovica pogodna za dugo skladištenje.



### Focus F1

Snažna biljka. Lukovica okrugla, krupna tamne ljubičaste boje. Vrlo ujednačena lukovica sa visokim postotkom jednog centra. Dobra pokrivenost ljuskom. Luk za dugo skladištenje.



### Totem

Lišće tamno zelene boje, dugog vrata. Vrlo ujednačen i tolerantan na vršnu palež. Može dugo stajati na polju uz zadržavanje kvalitete. Lako se čisti.

# Luk



### Yoda F1

Lišće je tamno zelene boje, uspravno i čvrsto, otporno na lomljjenje i vrućine. Vrlo ujednačena biljka, lak za čišćenje, proizvodnja od proljeća do jeseni. Može dugo stajati na polju, lijep bijeli dio.



Hibrid	Dozrijevanje	Vigor	Vrat	Krupnoća (mm)
Derek	kasni	snažan	srednji	srednje krupni



### Lancaster F1

Srednje rani hibrid poriluka. Tamno zeleno uspravno lišće, dugačka i glatka drška. Idealan za preradu, izvrsna zimska izdržljivost s dobrom tolerancijom na procvjetavanje.



### Warwick F1

Rani hibrid poriluka za presavđivanje i direktnu sjetu. Dobro prilagodljiv visokim temperaturama. Glatka kompaktna drška koja omogućuje dobru težinu i kvalitetu za svježu upotrebu i preradu.



Hibrid	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lancaster	sadnja berba			○	○	○				○	○	○
Warwick	sadnja berba		○	○	○				○	○	○	○



## Poriluk/Prihrana luka

Formulacija	Vrijeme prihrane/fenofaza	Količina	Napomena	Pospješuje
Rootex + Bioplex Kalex Cu	1. Faza – početni porast (do 3. lista)	0,5kg + 0,3l /ha 150-250 ml/100l vode		Razvoj korijenovog sustava, otpornost na bolesti
Novalon 20-20-20+TE + Kalex Cu	2. Faza – intenzivni porast (3-6 listova)	250-350g + 150-250ml na 100 l vode 0,5 kg/ha 2,5-3 l /ha		Intenzivni porast.
Trazex ili Agrofol 390				
Bioplex		0,3-0,5 l/ha	Nakon primjene herbicida ili nepovoljnih uvjeta	Ne dolazi do zastoja u porastu uslijed primjene herbicida
Calcinit ili Calcium Mainstay	3. Faza – od 6. lista do kraja vegetacije	4-5 kg/ha ili 3 l/ha		Kvalitetu plodova i veći postotak suhe tvari
Novalon 15-5-35+TE ili 6-12-36+3MgO+TE		4-5 kg/ha		
Bioplex	Visoke temperature, nepovoljni uvjeti	0,3-0,5 l/ha svakih 7-10 dana	Biostimulator, L-aminokiseline i fitohormoni	Jačanje biljnih funkcija/antistres



SAKATA®

### Kestrel F1

Srednje rani hibrid sa izraženim vrlo snažnim i uspravnim lišćem. Korijen je okrugli ujednačene tamno crvene boje. Odlikuje ga visok sadržaj šećera. Umjerenog je tolerantan na pjegavost, pepelnicu, plamenjaču te Rhizoctoniu. Za svježu potrošnju, preradu (sušenje, konzerviranje, dječju hranu).



SAKATA®

### Cardeal F1

Srednje rana cikla okruglog korijena, ima vrlo visok sadržaj šećera, pogodna je za svježu upotrebu, industriju kao i Baby ciklu.



SAKATA®

### Rodina F1

Rodina je srednje rani hibrid cikle cilindričnog oblika namijenjen za svježu upotrebu i za preradu. Visok sadržaj šećera i mogućnost dugog skladištenja. Cilindričan oblik ploda omogućava veću iskorištenost prilikom prerade.



Cikla


## FOLIJARNA PRIHRANA CIKLE




**UnitedGENETICS**

## TopMara F1

Rana lubenica okruglo ovalnog oblika, za unutarnju i vanjsku proizvodnju. Prosječna težina plodova je od 8-10 kg. Vrlo jaka lisna masa, dobro samopokrivanje. Atraktivnog izgleda, vrlo ukusna i hrskava, visok brix. Svetlo crveno meso, kora sa tamno zelenim prugama, dobra debljina kore zbog čega je pogodna za transport. Otpornost: Fon, Co.



# Lubenica

**UnitedGENETICS**


## Early Samantha F1

Rana lubenica izduženog oblika. Nešto manja i ranija „Samantha“ težine plodova od 8-10 kg. Vrlo jaka lisna masa, dobro samopokrivanje. Meso je duboko crvene boje. Visoki brix. Dobra debljina kore zbog čega je pogodna za transport. Odlična za unutarnju, ali pogodnija za vanjsku proizvodnju. Otpornost: Fon, Co.

**UnitedGENETICS**

## Early Crimara F1

Srednje rana lubenica okruglo ovalnog oblika, prosječne težine 10-12 kg. Lagana za proizvodnju i u zatvorenom i na otvorenom. Kora ima velike tamno zelene pruge, a meso je duboko crvene boje. Hrskava je, odlične slatkoće sa malim crnim sjemenkama u sebi. Vrlo kvalitetna i odlično podnosi transport, dugo stoji zrela u polju. Otpornost: Fon, Co.



## Karnakata F1

Srednje rana lubenica izduženog oblika, prosječne težine 10-12 kg, odlično podnosi ranu sadnju u tunele, vrlo rodna sa jakom lisnom masom. Kora ima svjetlijе zelene pruge. Otpornost: Fon, Co.

**UnitedGENETICS**

Hibrid	Bujnost	Vegetacija	Otpornost	Kora	Oblik	Težina (kg)
TopMara	srednja	rana	Fon, Co	tamno zelene pruge	okruglo ovalni	8 - 10
Early Samantha	srednja	rana	Fon, Co	tamno zelene pruge	ovalni	8 - 10
Early Crimara	srednja	srednje rana	Fon, Co	tamno zelene pruge	okruglo ovalni	10 - 12
Karnakata	jaka	srednje rana	Fon, Co	svjetlijе zelene pruge	ovalno izduženi	10 - 12



**United Genetics**

### Samantha F1

Srednje rana lubenica izduženog oblika. Prosječna težina plodova je 10-12 kg sa visokim sadržajem šećera, brix 11/12°. Atraktivnog izgleda, kora sa tamnim prugama, hrska i ukusna. Boja mesa je duboka crvena, a sjemenke su male i crne. Jaka lisna masa, odlična lisna pokrivenost. Odlično podnosi transport i stajanje poslije berbe. Zrelost: 85 dana.

Otpornost: Fon, Co.



**United Genetics**

### Marbella F1

Srednje rana lubenica izduženog oblika, težina plodova je 10-12 kg. Meso je duboko crvene boje, slatka je i hrskava, visoki brix 11,5°. Odličan kvalitet i dobro podnosi različite uvjete proizvodnje. Vrlo jaka lisna masa i samopokrivanje. Pogodna za unutarnju i vanjsku proizvodnju. Odlična za transport i skladištenje. Otpornost: Fon, Co.



**United Genetics**

### Prismatic F1

Kasna lubenica ovalno-izduženog oblika, prosječne težine plodova od 12-14 kg, a cijepljenoj je potencijal i do 20kg. Boja mesa je duboka crvena, a kora je tamne zelene boje izraženih pruga. Čvrsta je i slatka, dobar brix. Odlična ujednačenost ploda i prinos. Odlična za transport i čuvanje. Otpornost: Fon, Co.


## Lubenica



### Crimstar F1

Vrlo rani hibrid, pogodan za transport. Jaka vriježa, vrlo laka za uzgoj. Atraktivni sjajni plodovi okruglog oblika. Izvrstan kvalitet ploda, žarko crvene boje i sa visokim sadržajem šećera. Visoka otpornost na Co.

**SAKATA®**



Hibrid	Bujnost	Vegetacija	Otpornost	Kora	Oblik	Težina (kg)
<b>Samantha</b>	jaka	srednje rana	Fon, Co	tamno zelene pruge	duguljasti	10 - 12
<b>Marabella</b>	jaka	srednje rana	Fon, Co	tamno zelene pruge	duguljasti	10 - 12
<b>Prismatic</b>	jaka	kasna	Fon, Co	tamno zelene pruge	okruglo ovalni	10 - 12
<b>Crimstar</b>	srednja	vrlo rana	Co:1	atraktivna svijetla	okrugli	6 - 8

 **SAKATA®**

### **Odyssey F1**

Rani hibrid sa bujnom vriježom. Balansirana biljka, dobrog plodonošenja. Tamno crveno meso, odličan unutarnji kvalitet. Blago ovalni plodovi težine 10 - 14kg.



## Lubenica



### **Lusia F1**

Rana crna lubenica (Sugar Baby tip), vrlo rodna, ujednačeni plodovi težine 8 - 10 kg, odlično podnosi transport i ne gubi kvalitetu dugo poslije berbe

 **SAKATA®**

### **Podloga za cijepljenje lubenice**

### **Routpower F1**

Apsolutno zdravo sjeme, visok postotak klijavosti, brzo i ujednačeno nicanje. Pogodna za sve metode cijepljenja. Jak korijenov sistem osigurava visoku otpornost na Fusarium, daleko veću otpornost na stresne uvjete nakon prešađivanja i u toku proizvodnje te visok prinos uz odličnu kvalitetu ploda.



Hibrid	Bujnost	Vegetacija	Otpornost	Kora	Oblik	Težina (kg)
<b>Odyssey</b>	srednja	rana	Co:1/Fon 1	tamno zelene pruge	okruglo ovalni	10 - 14
<b>Lusia</b>	vrlo jaka	rana	Co:1	tamno zeleno crna	okrugli	8 - 10



### Terriero F1

Cantaloupe tip, okruglo ovalna, rana dinja pogodna za unutarnju proizvodnju i za tunele, vrlo postojani plodovi sa visokim sadržajem šećera.



### Chianti F1

Rani hibrid. Snažna biljka. Plod okruglo ovalan. Težine 1,5 - 2,0 kg. Visok sadržaj šećera. Za proizvodnju u niskim tunelima i na otvorenom. Visoke otpornosti na Fom. 0,1,2. Umjerene otpornosti na PM (pepelnica).



### Portento F1

Cantaloupe tip, okruglo ovalna, prosječna težina je 1,3 - 1,6 kg, žute boje kore sa jasnim zelenim režnjevima u zriobi, vrlo visok sadržaj šećera 14-16 Brix, tolerantna je na pepelnici (HR / IR: Fom 0,2, PM).



### Dinja



### El Rey F1

Srednje rani hibrid, „supermarket“ tip. Visoko prinosna, snažna biljka, plod ovalnog oblika težine od 1,5-1,7 kg. Visok sadržaj šećera 14 brix. Pogodna za unutarnju proizvodnju i za tunele.



Hibrid	Habitus	Vegetacija	Otpornost	Plod	Težina (kg)	Boja ploda	Postojjanost
Terriero	dobar	rana	FOM:0,1,2 Px2,Px5 Gc	okruglo ovalan	1,2 - 1,5	narančasta	dobra
Chianti	dobar	rana	FOM:0,1,2 Gc:1, Px2, Px5	okruglo ovalan	1,5 - 2,0	narančasta	dobra
Portento	dobar	rana	FOM:0,1,2 Gc:1, Px1,2, LSSt	okruglo ovalan	1,3 - 1,6	narančasta	dobra
El Rey	dobar	srednje rana	HR/IR: FOM:0-2, PM	ovalan	1,5 - 1,7	narančasta	dobra

# Prihrana lubenica i dinja folijarno i kroz sustav kap na kap

## Kalex

Tekuće mineralno gnojivo s visokom koncentracijom fosfora i kalija dobivenog iz kalij-fosfita.

Sadržaj:	%m/v
Fosfor pentoksid ( $P_2O_5$ ) topiv u vodi	42
Kalij oksid ( $K_2O$ ) topiv u vodi	28



## Calcium mainstay

KALCIJ BEZ DUŠIKA

Tekuće gnojivo bez dušika za folijarnu i zemljiju pri-mjenu. Odlično je za efikasnu opskrbu kalcijem kroz cijeli ciklus razvoja biljke.

## SIMPTOMI NEDOSTATAKA BIOGENIH ELEMENATA - Lubenice



## Aminoton

Aminoton je organska tekućina, gnojivo s visokim sadržajem dušika izrađen od mješavine aminokiselina i peptida prirodnog podrijetla, koje potiče rad mikroorganizama i povećava biološku plodnost tla.

Sadržaj:	%m/v
Organska dušik (N)	9,2
Dušik (N) topiv u vodi	9,2
Organska tvar (O.M.)	60,0



## Calcibor

Tekuće organsko gnojivo koje sadrži visok postotak kalcija (Ca) i bora (B).

Sadržaj:	% m/v
Bor (B) topiv u vodi	2,6
Cink (Zn) EDTA kelatni, topiv u vodi	0,26
Kalcij oksid (CaO) topiv u vodi	12,9



## Prihrana lubenica i dinja


Formulacija	Vrijeme prihrane /fenofaza	Fertirigacija /kap na kap	Folijarna primjena	Napomena	Pospješuje
Novalon 12-48- 6+TE ili Rootex	1. Faza - prvih 14 dana nakon presađivanja	0,75 – 1g / L vode 0,25-0,5 g/ L vode	250 g / 100l vode	Visoki postotak fosfora	Razvoj korijenovog sustava
Novalon 20-20-20+TE	2. Faza - intenzivni porast, do formiranja 8. lista	25 kg/ha tjedno		Brzi porast biljaka	Kondiciju presađenih biljaka
Novalon 15-5-35+TE	3. Faza - od formiranja 8. lista do cvatnje	35 kg/ha tjedno		Dobar izvor kalija	Sprječava pojavu vršne truleži
Kelatex B ili Kelatex Ca+B		0,1g / L vode	0,5 kg/ha		Cvatnju i zametanje plodova
Novalon 15-5-35+TE		35 kg/ha tjedno			Snažan vigor
Calcinit ili Calcium Mainstay	4. Faza - početak cvatnje	3 - 5 g / L vode	5 kg/ha 3 l/ha	Može se kombinirati sa Bioplexom	Važan za konzistenciju staničnih stijenki
Bioplex		0,05 ml/ L vode	0,3-0,5 l/ha	Povećava vitalnost biljke	Bolje cvjetanje i oplodnja smanjuje stres
Novalon 15-5-35+TE		35-40 kg/ha tjedno			Intenzivno povećanje volumena ploda
Calcium Mainstay	5. Faza - razvoj ploda do 1/3 veličine	3 – 5 ml/ L vode			Pospješuje čvrstoću plodova
Bioplex		0,5 - 1 ml/ L vode	0,5 l/ha	Povećava vitalnost biljke	Brzi razvoj ploda
Vigorizer		1 - 1,5 ml/ L vode		Pospješuje oporavak biljke	Brzi razvoj ploda i oporavak biljke nakon intenzivne berbe
Calcium Mainstay	6. Faza - od 1/2 veličine ploda do zriobe	3-5 l/ha tjedno			Pravilan razvoj ploda
Bioplex		0,05 ml/ L vode	0,5 l/ha	Biostimulator, L-aminokiseline i fitohormoni	Intenzivira crvenu boju kod lubenice i zadržava svježinu.

Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, PH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima.

**NOVO**

### Tendor F1

Srednje rani hibrid s dobrom tolerantnošću na bolesti. Otvorena biljka s dobrim plodonošenjem. Cilindričan tamnozeleni plod. Umjerene otpornosti na:  
 CMV (Cucumber Mosaic Virus),  
 ZYMV (Zucchini Yellow Mosaic Virus),  
 WMV (Watermelon Mosaic Virus).



## Tikvica/Mahuna



34

### Primel

Niska sorta okruglih tamno zelenih mahuna. Vegetacije oko 65 dana. Sjeme smeđe boje. Za ručnu berbu. Biljka snažna, cvjetovi ljubičaste boje. Mahuna dužine 14 - 16 cm, promjera 8 - 10,5 mm. Vrlo produktivna.



### Sundance

Niska sorta okruglih žutih mahuna. Vegetacije oko 60 dana. Sjeme bijelo. Pogodna za ručnu i strojnu berbu. Biljka srednje bujna, cvjetovi bijele boje. Mahuna duboke žute boje, dužine 12 - 15 cm. Promjer mahune 8 - 10,5 mm. Odlična kvaliteta mahune.





## Traka za navodnjavanje s konstantnim labirintom

**hirrotape**



Poseban sustav oblikovanja trake s konstantnim labirintom daje vrhunske performanse i ujednačenost emitera. Dizajn konstantnog labirinta pruža visok stupanj otpornosti na začepljenja i dužu upotrebu sustava, a samim tim racionalnije iskorišćavanje vode.

- Konstrukcija bez preklopa za veću otpornost trake na pritiske
- Mikro precizni prorezni eliminiraju začepljenja koja nastaju pri pokretanju/zaustavljanju sustava i umanjuju inicijalne poteškoće (root intrusion)
- Visoka ujednačenost sa smanjenom mogućnosti začepljenja
- Precizno oblikovane kapaljke za visoku ujednačenost protoka
- Dvostrano filtriranje vode kroz 110 pravilno raspoređenih točaka trake i indikatori kapaljki
- Dostupan je u različitim debljinama stjenke, razmacima kapaljki i protocima
- Čvrst materijal, otporan na trošenje, istezanje i pucanje, smanjuje oštećenja zemljišta



**PEŠTAN**

Kvalitetno. Pouzданo. Suvremeno.

**AMCO-DRIP**

## Cijevi za navodnjavanje

je nastao koristeći vodeću svjetsku tehnologiju i iskustvo u industriji trake. Koristi se u različitim usjevima u cijelom svijetu. AMCO-DRIP kapaljka se može instalirati na tlo, ispod plastične mulch folije, ili čak pod površinu. Zbog dobrog dizajna, kvalitete, kao i proizvodnog standarda, uzbajivači se mogu osloniti na AMCO-DRIP i postizanje što bolje učinkovitosti i ciljanog visokog prinosa.

AMCO-DRIP je dostupan u širokom asortimanu konfiguracije. Različite dužine, debljine stjenki, promjera i protoka, omogućuju uzbajivačima da pronađu optimalna rješenja za maksimalan prinos.

AMCO-DRIP je rješenje za izazove sa kojima se susreću uzbajivači.

AMCO-DRIP je razvijen za zadovoljiti potrebe individualnog uzbajivača.

U našoj ponudi je Model 506 (16 mm, 0,150 mm) za navodnjavanje rajčice, paprike, dinja i jagoda.

**Rivulis**  
Irrigation





### Ariel F1

Tikva u tipu Butternut-a, slična Pluto F1. Prosječna težina plodova je 0,8 - 1,3 kg, koji su otporni na pucanje, intenzivno narančaste boje mesa, vrlo snažna biljka tolerantna na pepelnici.



## Tikva



### Pluto F1

Vrlo prilagodljiva i snažna biljka. Visoko tolerantna na pucanje. Ujednačenih plodova, vrlo kvalitetnog mesa. Idealna za duži transport, industriju i potrošnju u svježem stanju. Težina 1,5 - 2,0 kg. Boja krem. Oblik kruške. Tamno narandžasto meso.



### Veenas F1

Tikva tipa Butternut. Prosječna težina plodova 1,0-1,2 kg. Veenas je pogodan za berbu tijekom cijele sezone. Vrlo fleksibilna biljka s visokim potencijalom prinosa. Izuzetna kvaliteta i ujednačenost ploda, srednje veličine. Glatka tamnocrvena boja, s vrlo dobrim rokom trajanja. Vrlo čvrsto narandžasto meso i izvrstan okus. Umjereni otpornost na Px.



### Yellowboys F1

Vrlo kvalitetan hibrid idealan za rezbarije povodom Noći Vještice (Halloween), težine je 8 -10 kg, kora je izrazito narančasta sa izraženim rebrima, čvrsta za transport, a istovremeno jednostavna i lagana za rezanje.



### Yellowgirls F1

Ova tikva je manja verzija brata Yellowboys, težine je 6 - 8 kg i namenjena je dječjem rezbarenju.



### Hokkaido Orange

Standardni hokaido tip, tamno narančaste boje, okruglog oblika težine oko 2,5kg, vrlo prinosna.



### Delica F1

Tip Hokkaido tikve, izvana je zelena, a iznutra ima izrazito narančasto meso, kora je tvrda nego kod klasičnog Hokaida, ali je zato meso mnogo ukusnije, postiže težinu od oko 2 kg, odlično se čuva.



Tikva



### Crown Prince F1

Srednje rana tikva vegetacije 100 - 115 dana, siva kora je vrlo tanka, a meso narančaste boje, može se vrlo dugo skladištiti, težina plodova je 3 - 5 kg, biljka je vrlo snažna s dobrim samopokrivanjem.






### Abbice

HR: BI 16-28,30-32 EU, Nr0

IR: LMV1

Svijetlo zelene boje. List prilično kovrčav. Snažan vigor, ne radi glavu. Odlična prezentacija. Za proljetnu i jesensku proizvodnju. Za vanjsku proizvodnju.



### Garone

HR: BI 16-28,30-32 EU, Nr0

IR: LMV1

Salata za proljetnu i jesensku proizvodnju. Reckav list, boja blond. Otvorena glava. Za vanjsku proizvodnju.



## Salata batavija

Hibrid	Vegetacija	Proljeće	Ljeto	Jesen	Boja	Otpornost
Abbice	rana	*		*	srednje zelena	HR: BI 16-28,30-32 EU, Nr0 IR: LMV1
Garone	srednje rana	*		*	blond	HR: BI 16-28,30-32 EU, Nr0 IR: LMV1



### Maradone

HR: BI 16-32 EU, Nr0

IR: L MV1; Fol1

Nova batavia za proljetnu i jesensku vanjsku proizvodnju, ima malo deblje kovrčave listove srednje zelene boje, lijepo dno, dobra toleran-tnost na Fuzarijum.



### Minestrone

HR: BI 16-32 EU

Nova batavia za proljetnu i jesensku vanjsku proizvodnju, svijetlij srednje zeleni listovi lijepo kovrčavi, laka za rezanje.



### Lirice

HR: BI 16-28,30-32 EU, Nr0

IR: L MV1

Svijetlo zelene boje. Ne radi glavu. Srednje rana, vrlo fleksibilna. Tankog kocena. Vrlo dobro se ponaša u uvjetima visokih tem- peratura. Za proljetnu i jesensku vanjsku proizvodnju.



## Salata batavija



Hibrid	Vegetacija	Proljeće	Ljeto	Jesen	Boja	Otpornost
<b>Maradone</b>	srednje rana	*		*	srednje zelena	HR: BI 16-32 EU, Nr0 IR: L MV1; Fol1
<b>Minestrone</b>	srednje rana	*		*	srednje zelena	HR: BI 16-32 EU
<b>Lirice</b>	srednje rana	*	*	*	srednje zelena	HR: BI 16-28,30-32 EU, Nr0 IR: L MV1



### Exquise

HR: BI 16-28,30-32 EU,

IR: LMV1; Fol1


Za kasno proljetnu, ljetnu i jesensku proizvodnju. Srednje zelene boje lista. Ne radi glavu. Tankog kocena. Za vanjsku proizvodnju.



### Dragone

HR: BI 16-28,30-32 EU, Nr0

Srednje zelene boje. Lijep oblik, kompaktna. Otvoren tip. Plosnato dno. Tanki kocen. Srednje rana. Za ljetnju proizvodnju.



### Fripone

HR: Downy mildew:16-35EU; Lettuce leaf aphid(Nr):0 ; Lmv:0

Srednje rana, srednje zelene boje lista, lijepog oblika i volumena. Otvoren tip, kompaktna. Plosnato dno. Za ljetnju proizvodnju.



## Salata batavija



### Mignone

HR: Downy mildew 16-35EU; Lettuce leaf aphid(Nr):0

Rana kristalka, srednje zelene boje lista. Lijepog oblika, kompaktna, dobar volumen, poloutvoren tip. Za ljetnju proizvodnju.



Hibrid	Vegetacija	Proljeće	Ljeto	Jesen	Boja	Otpornost
Exquise	srednje rana		*		srednje zelena	HR: BI 16-28,30-32 EU, IR: LMV1; Fol1
Dragone	srednje rana		*		srednje zelena	HR: BI 16-28,30-32 EU, Nr0
Fripone	srednje rana		*		srednje zelena, sjajna	HR: Downy mildew:16-35EU; Lettuce leaf aphid(Nr):0 ; Lmv:0
Mignone	rana		*		srednje zelena, sjajna	HR: Downy mildew 16-35EU; Lettuce leaf aphid(Nr):0



### Fabela

HR: BI 16-32 EU

Nova kristalka za kasno jesensku i proljetnu proizvodnju, svijetlige zelene boje, lijepog oblika i volumena. Za proizvodnju u plastenicima i staklenicima.



### Tonale

HR: BI 16-25,27,28,30-32 EU

Salata kratkog dana za zimsku i proljetnu proizvodnju u plastenicima i staklenicima. Rana sorta, ne radi glavu. Vrlo atraktivnog izgleda. Svjetlige boje lista, otporna na hladnoću.



### Jukebox

HR: BI 16-35 EU

Salata puterica srednje rana za unutarnju proizvodnju. Sjajne svijetlo zelene boje, glatkog lišća. Srednje otvorene glave, dobre težine, ravnog, velikog i zatvorenog dna. Za proizvodnju u plastenicima i staklenicima.



## Salata batavija



Hibrid	Vegetacija	Jesen	Zima	Proljeće	Boja	Otpornost
<b>Fabela</b>	srednje rana	*		*	srednje zelena	HR: BI 16-32 EU
<b>Tonale</b>	rana	*		*	blond	HR: BI 16-25,27,28,30-32 EU
<b>Jukebox</b>	srednje rana			*	srednje zelena, sjajna	HR: BI 16-35 EU



### Graffiti

HR: BI 16-30, 32, 33 EU; Nr0

IR: LMV1

Srednje otvorene glave. Snažna biljka, lijepo strukture, sjajne zelene boje. Za vanjsku proizvodnju.



### Zerala

HR: BI 16-25,27,28,31,32 EU; Nr0

IR: LMV1

Vrlo fleksibilna sorta za proljetnu i jesensku proizvodnju. Svetlo zelene boje. Ne radi vrlo kompaktnu čvrstu glavu. Debljih čvrstih listova. Dobre otpornosti na prljavštinu. Za ljetnju proizvodnju.



### Amalizia

HR: BI 16-28,30,32 EU; Nr0

IR: LMV1

Puterica za vanjsku proizvodnju. Otvorene glave. Dobre težine, ravnog dna. Laka za branje. Tolerantna na vršnu palež listu.



# Salata puterica

Hibrid	Vegetacija	Proljeće	Ljeto	Jesen	Boja	Otpornost
Graffiti	srednje rana	*		*	svijetlo zelena	HR: BI 16-30, 32, 33 EU; Nr0 IR: LMV1
Zerala	srednje rana	*	*	*	svijetlo zelena	HR: BI 16-25,27,28,31,32 EU; Nr0 IR: LMV1
Amalizia	srednje rana	*		*	srednje zelena	HR: BI 16-28,30,32 EU; Nr0 IR: LMV1



### Pursuit

HR: BI 16-33 EU, Nr0

Novi Iceberg za proljetnu i jesensku proizvodnju, vrlo zbita glava s debelim listovima, srednje zelene boje, vrlo ujednačena. Za vanjsku proizvodnju.



### Glassica

HR: BI 16-35 EU, Nr0


IR: LMV1

Novi Iceberg za ljetnu proizvodnju, okrugle ujednačene glave, vrlo visoka tolerancija na vršnu palež i procvjetavanje.



### Kokyta - Endivija

Rana endivija za proljetnu i jesensku proizvodnju. Biljka svjetlo zelene boje, listovi lagano udubljeni, srce teško, puno, dobro zmotano listovima. Dno glave plosnato i puno. Dobre otpornosti na procvjetavanje.



# Salata iceberg/endivija



### Raris - Endivija

Biljka polu uspravnih listova.

Za kasnu proljetnu, ljetnu i ranu jesensku proizvodnju. Visoko tolerantna na procvjetavanje tijekom ljeta. Puno srce, listovi su elastični, glava raširena.

Brzo raste u ljetnom vrućem periodu. Za svježu potrošnju i industriju.



Hibrid	Vegetacija	Proljeće	Ljeto	Jesen	Boja	Otporost
Pursuit	rana	*		*	svjetlo zelena	HR: BI 16-33 EU, Nr0
Glassica	srednje rana		*		svjetlo zelena	HR: BI 16-35 EU, Nr0 IR: LMV1



### Quelio

HR: BI 16-28,30-32 EU, Nr0

IR: LMV1

Za proizvodnju na otvorenom. Teška i dobro građena biljka debljih listova. Dobre tolerantnosti na unutarnju palež listu i provjetavanje. Širok paket otpornosti.



### Flambine

HR: Downy mildew:16-30,32-33 EU; Lettuce leaf aphid(Nr):0 IR: Lmv:1

Hrastov list crvene boje. Rana sorta umjernog vigenja i dobre težine. Deblji listovi svijetlo crvene boje. Izbjegavati ljetnu sadnju.



### Bacchus

HR: BI 16-28,30-32 EU, Nr0

IR: LMV1

Lollo rossa za vanjsku proizvodnju. Dobre težine, intenzivno crvene boje. Fleksibilna sorta. Izbjegavati ljetnu sadnju.



## Salata hrastov list

Hibrid	Vegetacija	Proljeće	Ljeto	Jesen	Boja	Otpornost
Quelio	rana	*		*	zelena	HR: BI 16-28,30-32 EU, Nr0 IR: LMV1
Flambine	rana	*		*	crvena	HR: Downy mildew:16-30,32-33 EU; Lettuce leaf aphid(Nr):0 IR: Lmv:1
Bacchus	srednje rana	*		*	crvena	HR: BI 16-28,30-32 EU, Nr0 IR: LMV1



## H-85

### huminske kiseline

H-85 je prah koji sadrži 850 g/kg huminskih i fulvinskih kiselina koji su dobiveni iz minerala leonardita (65% huminskih kiselina i 20% fulvinskih kiselina).

#### Preporuke za primjenu:

Preporučamo primijeniti H-85 na tla koja imaju nizak postotak organske tvari, strukturalne probleme, nizak postotak dostupnih hranjiva i nisku mikrobiološku aktivnost. H-85 se također može koristiti na presadnicama. Umoćiti korijen presadnice u otopinu prije presađivanja.



## Apollo F1

Novi špinat za zimsku, proljetnu i jesensku proizvodnju, ima kopljasto, sjajno tamno zeleno lišće koje stoji uspravno i olakšava berbu, lišće je mesnato i nakon berbe zadržava svjež izgled.



## Clipper F1

Okrugli western tip glatkih listova. Srednje kasni hibrid sa visokom otpornošću na Pfs: 1 (Peronospora farinosa f.sp. Spinaciae). Može se koristiti u industriji i za svježu upotrebu. Za proljetnu, ljetnu i jesensku proizvodnju.

Špinat 

## PREPORUKA ZA PRIMJENU

Kulture	Količine (kg/ha)
Povrće	10 - 15
Žitarice	5 - 10
Voće	10 - 20
Ukrasno bilje	15 - 20



# Prihrana salate folijarno i kroz sustav kap na kap

## BIOPLEX

Tekuće folijarno gnojivo i biostimulator.

Odličan za jačanje biljnih funkcija. Sadrži makro i mikro elemente (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu) i fitohormone: auksin, giberelin i citokinin i organske ekstrakte manitol, alginske kiseline, polisaharide, aminokiseline itd.



## Boramide

Specijalno tekuće gnojivo s visokim postotkom Bora (B) organske komponente.

Sadržaj	%m/v
Bor (B) topiv u vodi	15



## Vigorizer

VIGORIZER je stimulator rasta i poboljšivač tla, sredstvo kojom se osigurava visoka otpornost biljke na vanjske utjecaje, a primjenjuje se preko tla.

Sadržaj	%
Fosfor ( $P_2O_5$ )	1,5
Kalij ( $K_2O$ )	4,6
L-aminokiseline i organski ekstrakti	15



## Agro K

Vodotopivo folijarno gnojivo s visokim sadržajem fosfora i kalija namjenjeno za ujednačeno sazrijevanje, kvalitetnu pigmentaciju i sadržaj suhe tvari u plodovima.

Sadržaj	%
Fosfor ( $P_2O_5$ )	32
Kalij ( $K_2O$ )	53
L-aminokiseline	2
Organski ekstrakti	3



## Barrier

Stanični učvršćivač na bazi kalcija i silicija koji povećava otpornost biljke na UV zračenje, otpornost biljke na uvjete stresa i sušu, povećava mehaničku otpornost na napad štetnika i gljivičnih bolesti.

Sadržaj:	% m/v
Kalcij (Ca)	10
Silicijev dioksid ( $SiO_2$ )	24



## SIMPTOMI NEDOSTATAKA BIOGENIH ELEMENATA - Salata



-K



+K




## Prihrana salata i špinata

Formulacija	Vrijeme prihrane /fenofaza	Fertirigacija /kap na kap	Folijarna primjena	Napomena	Pospješuje
Novalon 12-48-6+TE ili Kalex Cu	1. Faza – ukorijenjavanje, 10-12 dana nakon presađivanja	0,75 - 1g / L vode	2,5kg/ha 150-200mL/100 L vode		Rast korijena
Rootex		0,25 g / L vode	30-50 g / 10 L vode zaljevati	Snažna formula sa visokom koncentracijom organskih ekstrakta, L-aminokiselina i fosfora	Smanjuje stres kod niskih temperatura i poslije presađivanja Pospješuje ukorijenjavanje
Novalon 20-20-20+TE	2. Faza - formiranje rozete, početak glavičenja	2 kg/1000 m <sup>2</sup> tjedno		Brzi porast biljaka	Visoki prinos i kvalitet plodova
Bioplex ili Vigorizer		0,1-0,15 ml / 1L vode 2-3 puta u fazi formiranja rozete	0,3 l/ha	Otpornost na bolesti, brzo usvajanje hranjiva	Jačanje biljnih funkcija (antistres)
Novalon 15-5-35+TE		1-1,5 g / 1L vode 2-3 puta do berbe			Visoki prinos i kvalitet plodova
Calcium Mainstay	3. Faza - intenzivna vegetacija do berbe	300 mL/1000 m <sup>2</sup> tjedno	2 - 3 l/ha	Ne miješati sa drugim preparatima	Sprječava pojavu rubne paleži
Trazex		0,5 kg/ha	300 g/100l vode	Ukoliko se pojave simptomi nedostatka elemenata, primijeniti Trazex	Uklanja nedostatak mikroelemenata
Bioplex	U nepovoljnim uvjetima (hladnoća, zastoj u rastu...) u svim fenofazama	0,5 - 1 l/ha		Biostimulator, fitohormoni i L-aminokiseline	Jačanje biljnih funkcija (antistres).

Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, PH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima.



Kolut



Makroperforacija:  
promjer perforacije,  
50 mm. Mogu biti  
paralelno ili u  
dijamant formaciji.



Mikroperforacija:  
Sastoje se od izra-  
de perforacija od  
1-2 mm kroz cijelu  
širinu i dužinu folije.



Perforacija u  
paralelnoj formaciji

## MULCH FOLIJE

SOTRAFA malč folije mogu se koristiti na otvorenom ili u plastenicima, s dodacima, koji daju optimalno djelovanje prema vanjskim uvjetima kao što su vjetar, kiša, tuča, itd... SOTRA mulch folije su višeslojne folije proizvedene na bazi LDPE, LLDPE (linearno) ili oba, i različite su debljine ovisno o potrebi.

### Sotra crna mulch folija NG

U našoj ponudi je:

1. Crna mulch folija debljine 20 µm namjenjena proizvodnji povrća na otvorenom i u plastenici-ma:
  - širina: 1,2 m, dužina: 1500 m
  - širina: 1 m, dužina: 1500 m
2. Crna mulch folija debljine 22 µm mikro + makro perforirana namjenjena proizvodnji salate u zatvorenom:
  - širina: 1,6 m, dužina: 1000 m, 6 redova 25x25
  - širina: 1,6 m, dužina: 1000 m, 6 redova 25x30

Prednosti: Blokira prijenos solarnog svjetla sprječavajući rast korova. Crni dodatak omogućuje dulje trajanje folije.

### Sotra mulch folija NT – multiperforirana (plutajući pokrivač)

Višeslojna folija različitih debljina i perforacija od 10 mm koriste se pri proizvodnji dinja, lubenica, paprike, salate, mrkve, krumpira... Plutajući pokrivači se postavljaju preko usjeva, mijenjajući mikroklimatske uvjete koji stvaraju vjetrenjaču i učinak tunela.




Perforacija u  
dijamant formaciji



Perforacija u  
paralelnoj formaciji

Prednosti:

- Ventilacija ispod folije sprječava termičko naprezanje koje bi bilo proizvedeno u biljkama zbog prekomjernog povećanja temperature ispod folije. S druge strane, omogućava protok vode u slučaju kiše.
- Izbjegava neželjene učinke kada temperatura raste.
- Djeluje kao fi zička barijera izbjegavajući štete od kiše i tuče.
- Poboljšava sinergiju između zemlje, vode i usjeva.
- Omogućuje opršivanje pčelama, ovisno o broju i promjeru perforacija.
- Perforacije dostupne u dijamant ili paralelnoj formaciji, do 500 perforacija/m<sup>2</sup>.
- Promjer perforacije: 10mm, širina folije 12 m, dužina 100 m.



NOVO SAKATA®

### Yety F1

Vrlo rana rajčica namijenjena uzgoju na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Vrlo prinosna, odličan crveni plod težine oko 250 gr. Veliki % plodova prve klase od početka do kraja uzgoja pogotovo u proljetnom uzgoju. Pogodna za uzgoj tijekom cijele godine.  
ToMV:0,1,2 / Vd:0 / Fol:0,1 / Ff:A-E / Mi (IR)  
TSWV (IR)/TYLCV (IR)

 SAKATA®

### Amerigo F1

Rani hibrid. Po etaži 5 - 7 plodova prosječne težine oko 200 g. Dobre čvrstoće i jarko crvene boje. Vrlo ujednačeni plodovi. Širok stupanj otpornosti: (HR) ToMW:0,1,2, Vd:0, Fol:0,1, Mi i umjerene otpornosti (IR) na TSWV.

 Vilmorin

### Cencara F1

Visoki šljivar za unutarnju proizvodnju, vrlo čvrsti plodovi intenzivno crvene boje, težine 100 - 110 g, pogodna za cjelogodišnji uzgoj. Otpornost: (HR) ToMV, V:0, Fol:0, Cf3, IR, M

# Rajčica



### Sweet Million F1

Vrlo rana cherry rajčica, laka za uzgoj, ima čvrste i ujednačene plodove otporne na pucanje, težine 10-15 g, Vrlo postojani plodovi poslije berbe. Otpornost: ToMV: 0,1/Fol:0

 SAKATA®

Hibrid	Vigor	Vegetacija	Krupnoća (g)	Oblik	LSL	Otpornost
Yety	snažan	vrlo rani	oko 250	okruglo plosnat	vrlo dobar	ToMW: 0,1,2, Vd: 0, Fol: 0,1, Ff: A-E, Mi (IR), TSWV (IR), TYLCV (IR).
Amerigo	snažan	rani	180 - 220	okruglo plosnat	vrlo dobar	(HR) ToMW: 0,1,2, Vd: 0, Fol: 0,1, Mi, (IR), TSWV.
Cencara	snažan	rani	100 - 110	šljivilik	vrlo dobar	(HR) ToMV, V:0, Fol:0, Cf3, IR, M
Sweet Million	slabi	vrlo rani	10 - 15	okrugli	odličan	ToMV: 0,1 / Fol: 0



 **SAKATA®**

## Troy F1 (Linda F1)

Niska rajčica, determinantnog tipa, krupnih plodova težine oko 250 gr. Biljka snažna, srednje rana, dospjeva oko 75 dana, list dobro pokriva plodove. Otpornost: (HR) Vd:0, Fol:0,1, Aal i umjerene otpornosti na Ss.



# Rajčica



## Fuji Pink F1

Visoka pink rajčica, vrlo čvrsti okrugli plodovi težine 180 - 200 g, ukusni i postojani poslije berbe što nije karakteristika ovog tipa rajčice. Otpornost: ToMV: 0-2, Ff:A-E, Fol:0,1, Ss,Vd:0,Mi

 **SAKATA®**





## VP1 F1

Pink rajčica. Vrlo rani indeterminantni hibrid za proljetnu i ljetnu proizvodnju. Težina ploda 200 - 250 g, dobre čvrstoće. Visoke otpornosti na pucanje i „mikro“ pukotine. Otpornost: (HR) ToMV,V:0, Fol:0,1 Cf5, S



 **SAKATA®**

## Pink Impression F1

Pink rajčica, okruglog oblika. Lijepo sjajne ružičaste boje, izvanrednog okusa, pogodna za zaštićene prostore i proizvodnju na otvorenom. Vrlo čvrsti srednji plodovi, biljka sa srednjim internodijima. Odličan rok trajanja, veličina 220-260 gr, biljka sa jakim vigorom. Dobra prolagodba u područjima sa kontinentalnom klimom. Visoki prinosi. Visoka otpornost: ToMV:0/Ff: A-E/Fol:0/Vd:0, umjerena otpornost: Mi



Hibrid	Vigor	Vegetacija	Krupnoća (g)	Oblik	LSL	Otpornost
Troy (Linda)	snažan	srednje rani	200 - 250	okruglo plosnat	vrlo dobar	(HR) Vd:0, Fol:0,1, Aal, Ss
VP1	snažan	vrlo rani	200 - 250	okruglo plosnat	odličan	(HR) ToMV, V:0, Fol:0,1 Cf5, S
Pink Impression	snažan	oko 60 dana	220 - 260	okrugao	dobar	ToMV: 0/Ff: A-E/Fol:0/Vd:0/Mi
Fuji Pink	snažan	srednje rani	180 - 200	okruglo plosnat	odličan	ToMV: 0-2, Ff: A-E, Fol:0,1, Ss, Vd:0, Mi

## Ricciolo F1

Rebrasti crveni tip rajčice sa velikim plodovima težine 200-300 grama. Sočna i slatka rajčica, na početku boja je svijetlo zelena, onda prelazi u ružičastu i konačno duboko ružičastu/crvenu kada je rajčica zrela. Srednja snažna biljka s dobrim potencijalnim prinosom. Prikladan hibrid za zimski i proljetni uzgoj u staklenicima. HR/IR: V, Fol 0-1, N, TSWV



United Genetics

Hibrid	Vigor	Vegetacija	Krupnoća (g)	Oblik	LSL	Otpornost
Ricciolo	srednji	oko 60 dana	200-300	okrugao	dobar	HR/IR: V, Fol 0-1, N, TSWV
San Remo	snažan	rani	200 - 300	okrugao	dobar	HR/IR: V, Fol 0-1, N, TSWV

## San Remo F1

Rebrasti pink tip rajčice sa velikim plodovima težine 250-300g. Rana rajčica, sočna, odličnog okusa sa snažnim vigorom i velikim prinosom uniformnih plodova.

Tijekom rasta plod prelazi iz svijetlo zelene u ružičastu boju, do konačne crvene kada je plod zreo. Pogodna za proljetni uzgoj i zimski uzgoj u plastenicama. HR/IR: V, Fol 0-1, N, TSWV.

United Genetics




## EKOTRON

Ektron je prirodnji organski poboljšivač tla fosilnog podrijetla, bogat huminski-mi fulvo kiselinama na bazi Leonardita koji se koristi na svim poljoprivrednim tlima i osobito je pogodan za tla siromašna humusom.

Ektron djeluje kao vezivo između čestica tla koje olakšavaju stvaranje dobre strukture, povećava dostupnost hranjivih sastojaka, pridonoši i povećanju sposobnosti izmjene kationa (kalij, magnezij, kalcij i mikroelemenata) i održavanje nutrijenata dostupnih korijenu.

Glavne prednosti:

- Poboljšava plodnost i strukturu tla
- Idealno za aplikacije prije sjetve
- Sadržaj visokih humusnih i fulvskih kiselina
- Jednostavan za upotrebu u obliku peleta ili praha



Plastenici 100-200 g/m<sup>2</sup>

Na otvorenom: 400-800 kg/ha;

Masline 200-400 kg/ha; Usjevi: 200 kg/ha

Vrijeme primjene: kod prijesadivanja, prije sjetve, obrade tla ili uklanjanja korova

SADRŽAJ	% m/m
Organski dušik (N) (% suhe tvari)	3
Organski ugljik (C) (% suhe tvari)	34
Organska tvar (% suhe tvari)	65
Suha organska tvar (% ukupne organske tvari)	68
Razgrađena organska tvar	95
Magnezij oksid (MgO)	1,5
Željezo (Fe)	2

# Prihrana rajčice folijarno i kroz sustav kap na kap

## Trazex

Visoka koncentracija mikroelemenata za folijarnu primjenu.

Fe=6%  
Mn=6%  
Zn=6%  
B=2%  
Cu=2%  
L-aminokiseline=3%  
Organski ekstrakti=2%



## KELATEX B

Suho topivo gnojivo, dobiveno iz borne kiseline i natrij-tetraborata, posebno pripravljeno da spječe pomanjkanje bora i liječi od njegovog nedostatka.  
B=17%  
L-aminokiseline=3%  
Organski ekstrakti=2%



## Bioriviter

- Organsko tekuće gnojivo na osnovu huminskih i fulvo kiselina.

Sadržaj:	% m/v
Organski dušik (N)	3,7
Kalijev oksid ( $K_2O$ ) topiv u vodi	6,2
Organski ugljik (C) biološkog podrijetla	22,5
Huminske i Fulvo kiseline	13,7




Organsko tekuće gnojivo na osnovu huminskih i fulvo kiselina koje potiče rast mikro flore i biološku aktivnost čime se ubrzavaju procesi razgradnje i mineralizacije organske tvari, te povećava pristupačnost hranivih tvari u tlu.

## Calcium mainstay

KALCIJ BEZ DUŠIKA

Tekuće gnojivo bez dušika za folijarnu i zemljjišnu primjenu. Odlično je za efikasnu opskrbu kalcijem kroz cijeli ciklus razvoja biljke.



## SoluPotasse

 - Kalijev sulfat (SOP)

Vodotopivo gnojivo koje osigurava optimalnu prihranu kalija i sumpora (kao sulfat), poboljšava kvalitetu voća i povrća kao i njihovu nutritivnu vrijednost.

Sadržaj:	
$K_2O$	51,5%
$SO_4$	56,0%
Cl	0,6%



## GranuPotasse

 - Kalijev sulfat (SOP)

Granulirano gnojivo koje osigurava optimalnu prihranu kalija i sumpora (kao sulfat), poboljšava kvalitetu voća i povrća kao i njihovu nutritivnu vrijednost.

Sadržaj:	
$K_2O$	50,3%
$SO_4$	52,6%
Cl	2,1%



## SIMPTOMI NEDOSTATAKA BIOGENIH ELEMENATA - Rajčica



## Prihrana rajčice

Prije presadivanja presadnica u tlo unijeti organski regulator tla H - 85. H - 85 se primjenjuje u dozi do 10 kg/ha direktno na tlo. Također se može napraviti otopina u omjeru 2 - 4 g H - 85 na litru vode. Presadnice se umoče u otpinu kraće vrijeme prije presadivanja. H - 85 poboljšava zdravlje i vigor mlađih biljčica.

Formulacija	Vrijeme prihrane /fenofaza	Fertirigacija /kap na kap	Folijarna primjena	Napomena	Pospješuje
Novalon 12-48-6+TE ili Kalex Cu		0,75 - 1g /L vode 150 - 200 mL /100 L vode	150 - 200 mL /100 L vode	Visoki fosfor	
Rootex	1. Faza - ukorijenjavanje, od 7-14 dana nakon presadivanja	0,25 - 0,5 g / L vode	30-50 g / 10 L vode zaljevati	Snažna formula sa visokom koncentracijom organskih ekstrakta i L-aminokiselina	Razvoj korijenovog sustava.
Bioplex		0,1-0,15 ml / 1L vode	0,3-0,5 l/ha	Otpornost na niske temperature	Pomaže biljkama da se oporave od stresa nakon presadivanja
Novalon 20-20-20+TE	2. Faza - od početka cvatnje do formiranja plodova	1-1,5 g / 1L vode		Izbalansirani omjer makro elemenata	Vegetativni porast rajčice
Kelatex Ca+B		0,25 g / L vode	0,5 kg/ha	Pospješuje tvorbu staničnih stijenki i pojačava rast korijena i stabljike	Bolja oplodnja i postojanost plodova
Novalon 15-5-35+TE	3. Faza - intenzivan rast plodova	1,5-3 g / 1L vode		Nedostatak kalija uzrokuje pojavu zelenih i žutih mrlja unutar crvenog ploda, koji nikad ne dozrijeva	Visok prinos i kvaliteta plodova
Bioplex		0,1-0,15 ml / 1L vode 2-3 puta do berbe	0,5 l/ha	Primjena do kraja berbe svakih 10-14 dana	Otpornost biljke na stres i daje vitalnost
Calcium Mainstay ili Calcinit		300 ml/1000 m <sup>2</sup> 3-5g / 1L vode	3 l/ha 5 kg / ha	Jednom tjedno do kraja berbe	Sprječava pojavu vršne truleži plodova
Novalon 6-12-36+TE ili Keymag 10-0-40+2MgO	4. Faza - intenzivna berba plodova	1,5-2 g / 1L vode	MagnezijMainstay 1,5-2 l/ha	Nedostatak magnezija uzrokuje pojavu zelenog vijenja uz peteljku	Pospješuje slatkoću ploda
Novalon 20-20-20+TE	5. Faza - 5-6 etaža rajčice	1,5-2 g / 1L vode	Barrier 1-3 l/ha	Veća količina ubrane rajčice po jedinici površine	Producira fazu berbe
Trazex + Vigorizer		Vigorizer 2 - 5 l /ha	Trazex 0,3 kg/ha	Snažna formula sa visokom koncentracijom mikroelemenata.	Osnažuje metaboličku aktivnost u svim fazama rasta.

Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, PH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima.



# Paprika



duna-r  
vetömag

## Bernita F1

Novi „bloki“ tip za ranu proizvodnju.  
Plod žute boje, mijenja boju u crvenu.  
Dobro podnosi stres. Za unutarnju i  
vanjsku proizvodnju.



duna-r  
vetömag

## Bibic F1

Rani hibrid izduženih plodova težine 120 - 160 g. debelog mesa (sitniji ali teški plodovi vrlo pogodni za punjenje).  
Plodovi su u fiziološkoj zrelosti crvene boje. Biljka osrednjeg rasta. Čvrsto stablo i snažan korijen. Sklop: zaštićeni prostor 4 - 4,5 biljaka/m<sup>2</sup>, na otvorenom 5 - 6 biljaka/m<sup>2</sup>. Bibic u proizvodnji na otvorenom osigurava ujednačene plodove odlične kvalitete koji su pogodni za transport.  
Posebno ga rade proizvođači koji žele biti prvi na tržištu.



HR - visoka otpornost / Tm2 - virus mozaika duhana (TMV) i virus paprike Obuda (ObPV)

Hibrid	Okus	Boja	Proizvodnja	Vegetacija	Težina (g)	Otpornost
Bernita	slatka	žuto > crveno	Plastenik / otvorena	rana	140 - 180	---
Bibic	slatka	žuto > crveno	Plastenik / otvorena	rana	120 - 160	---



**duna-r**  
vetömag

## Bagoly F1

Hibrid paprike izduženih plodova, izrazito debelog mesa sa 3 - 4 komore. Težina plodova 150 - 250 g. U fiziološkoj zrelosti crvene boje. Osrednjeg rasta, formira čvrsto stablo i snažan korijenov sistem. Pogodna za proizvodnju u zaštićenom prostoru i na otvorenom. Sklop: zaštićeni prostor 4 - 4,5 biljaka/m<sup>2</sup>, na otvorenom 5 - 6 biljaka/m<sup>2</sup>. Izuzetno dobra kvaliteta, daje većinom velike plodove koji dobro podnose transport. Vrlo dobro prihvaćen hibrid na hrvatskom tržištu.



**duna-r**  
vetömag

## Bobita F1

Izrazito krupni plodovi sa izuzetno debelim mesom. Plod je težine 140 - 180 g. U fiziološkoj zrelosti je narančaste boje. Dobro podnosi nedostatak kalcija. Sklop: zaštićeni prostor 4 - 5 biljaka/m<sup>2</sup>, na otvorenom 5 - 6 biljaka/m<sup>2</sup>. Bobita predstavlja jedan od najpravilnijih hibrida u tipu babura.



**duna-r**  
vetömag

## Lisenka F1

Hibrid koji se može uzgajati tijekom cijele godine. Rana sorta izuzetnog prinosa. Plodovi izduženi, svijetlo zeleni, težine oko 200 gr. Dobra je za vanjsku i unutarnju proizvodnju. Hr Tm2.

Paprika



Hibrid	Okus	Boja	Proizvodnja	Vegetacija	Težina (g)	Otpornost
Bagoly	slatka	žuto > crveno	Plastenik / otvorena	srednje rana	180 - 220	(HR) Tm2
Bobita	slatka	žuto > narančasto	Plastenik / otvorena	srednje rana	140 - 180	---
Lisenka	slatka	zelenkasto žuta	Plastenik / otvorena	rana	160 - 200	(HR) Tm2

 **SAKATA®**

### Ester F1

Hibrid paprike bijelih, slatkih, krupnih blago rebrastih plodova. Boja ploda prelazi iz bijele u crvenu boju. Biljka je brzog porasta, kratkih internodija. Rani hibrid, ne smeta mu nedostatak svjetla, dobro podnosi visoke temperature. Za proizvodnju u zaštićenom prostoru i na otvorenom. Sklop na otvorenom 5 - 6 biljaka/m<sup>2</sup>. Mesnat plod, izrazito dobrog ukusa vrlo je privlačan za prerađivače i pogodan za kiseljenje.



## Paprika

 **SAKATA®**

### Lake F1

Srednje rani hibrid. Plodovi težine oko 200 gr, s 3-4 komore. U punoj zrelosti prelazi u crvenu boju. Otpornosti: (IR) TSWV i Xcv (Xantomonas).

 **SAKATA®**

### Salana F1

Jaka, kompaktna biljka. Srednje kratkih internodija. Srednje rana. Plodovi sa 3 - 4 komore, vrlo ujednačeni. Za vanjsku i unutarnju proizvodnju.



Hibrid	Okus	Boja	Proizvodnja	Vegetacija	Težina (g)	Otpornost
Ester	slatka	bijelo > crveno	Plastenik / otvorena	rana	80 - 100	---
Lake	slatka	bijelo > crveno	Plastenik / otvorena	srednje rana	160 - 200	(IR) TSWV i Xcv
Salana	slatka	žuto > crveno	Plastenik / otvorena	srednje rana	180 - 200	Tm0



**semo®**

### Rafaela F1

Vrlo rana ajvarica pogodna za unutarnju i vanjsku sadnju, vrlo snažna biljka sa odličnim pokrivanjem, ima krupne i čvrste plodove pogodne za transport, za svježu je upotrebu i industriju, a može se koristiti i kao zelena paprika(TM0)



**duna-r**  
vetömag

### Kadet F1

HR Tm2, IR TSWV, vrlo rani hibrid, krupnih plodova. Plod plosnat , uglavnom 2 komore, srednje zelene boje u tehnološkoj zriobi a tamno crvene u punoj zriobi. Dobro mijenja boju iz zelene u crvenu bez mikro pucanja. Pogodan za vanjsku i unutarnju proizvodnju.



**duna-r**  
vetömag

### Csango F1

Hibrid kapija tipa. Plodovi krupniji težine 120 - 140 g, koji iz zelene boje prelaze u crvenu. Srednjeg rasta sa jako razvijenim korijenom. Pogodan za proizvodnju u zaštićenom i otvorenom prostoru uz visoke prinose. Sklop: zaštićeni prostor 5 - 5,5 biljaka/m<sup>2</sup>, na otvorenom 6 - 6,5 biljaka/m<sup>2</sup>. Plod dobro održava svježinu nakon berbe, izvrsnog ukusa, visokog postotka suhe tvari u plodu i time daje odličnu sirovину za preradu.

**Paprika**



Hibrid	Okus	Boja	Proizvodnja	Vegetacija	Težina (g)	Otpornost
Rafaela	vrlo slatka	zeleno > intenzivno crveno	Plastenik / otvorena	vrlo rana	160 - 200	Tm0
Kadet	slatka	srednje zelena > intenzivno crveno	Plastenik / otvorena	vrlo rana	160 - 200	(HR) Tm2 (IR) TSWV
Csango	slatka	zeleno > crveno	Plastenik / otvorena	srednje rana	120 - 140	---

# Prihrana paprike folijarno i kroz sustav kap na kap



## Promet Ca

Kalcij kompleks s aminokiselinama i organskom tvari koje daju veću učinkovitost u usvajaju i translokaciji Ca kroz biljku i plodove, bolju oplodnju i sazrijevanje peludi, bolji rast lišća i pupoljaka, veća konzinstencija ploda i duži rok trajanja proizvoda nakon berbe.

SADRŽAJ :	% m/m
Organski dušik (N)	3,1
Organski dušik (N), topiv u vodi	3,1
Kalcij oksid (CaO), topiv u vodi	10,0
Organska tvar (O.M.)	17,0

## BIOPLEX

Tekuće folijarno gnojivo i biostimulator.

Odličan za jačanje biljnih funkcija. Sadrži makro i mikro elemente (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu) i fitohormone: auksin, giberelin i citokinin i organske ekstrakte manitol, alginske kiseline, polisaharide, aminokiseline itd.



## Kelatex Ca+B

Koristi se u svim fazama razvoja biljke kada se očekuju visoki prinosi i kvaliteta. Primjenjuje se za folijarnu i zemljarsku primjenu s visokom koncentracijom Kalcija (Ca) 20%, Bora (B) 6%, L - aminokiselina 3% i organskih ekstrakata 2%



## Yara Liva Calcinit

Vodotopivo folijarno gnojivo koje sadrži dušik i kalcij. Calcinit je preparat visoke čistoće, bez klorida i teških metala. Potpuno je topiv u vodi. Nitratni dušik je najefikasniji oblik dušika za brzi porast biljaka. Kalcijev nitrat je jedini dostupan izvor potpuno vodotopivog kalcija imože se korisiti za folijarnu aplikaciju i fertirigaciju



## Oligomix

Oligomix je folijarno gnojivo s visokim sadržajem specifično uravnoteženih mikroelementa organskog podrijetla formuliranih kako bi se sprječile bolesti i uklonili glavni nedostaci mikroelemenata kod biljaka.

## SIMPTOMI NEDOSTATAKA BIOGENIH ELEMENATA - Paprika



Sadržaj	% m/m
Bor (B) topliv u vodi	1.2
Bakar (Cu) kelatizirani EDTA topliv u vodi	0.1
Željezo (Fe), Ukupni toplivi u vodi	4.0
Željezo (Fe), kelatizirani DTPA	2.5
Željezo (Fe), kelatizirani EDTA	1.5
Magnezij oksid (MgO) topliv u vodi	4.0
Mangan (Mn) kelatizirani EDTA topliv u vodi	1.5
Molibden (Mo) topliv u vodi	0.1
Cink (Zn) kelatizirani EDTA topliv u vodi	2.0

## Prihrana paprike

Prije presađivanja presadnica u tlo unijeti organski regulator tla H - 85. H - 85 se primjenjuje u dozi do 10 kg/ha direktno na tlo. Također se može napraviti otopina u omjeru 2 - 4 g H - 85 na litru vode. Presadnice se umoče u otpinu kraće vrijeme prije presađivanja. H - 85 poboljšava zdravlje i vigor mlađih biljčica.

Formulacija	Vrijeme prihrane /fenofaza	Fertirigacija /kap na kap	Folijarna primjena	Napomena	Pospješuje
Novalon 12-48- 6+TE ili Rootex		0,75 - 1g / L vode 0,25 - 0,5 g / L vode	30 - 50 g/10L vode zalijevanjem	Visoki fosfor	Razvoj korijenovog sustava.
Kalex Cu	1. Faza - poslijepresađivanja - prva 4 tjedna	150 - 200 mL / 100 L vode	150 - 200 mL / 100 L vode	Snažna formula sa visokom koncentracijom organskih ekstrakta i L-aminoakida	
Bioplex		0,1-0,15 ml / 1L vode	0,3-0,5 l/ha	Primjena do kraja berbe svakih 10 - 14 dana	Pomaže biljkama da se oporave od stresa nakon presađivanja
Novalon 20-20-20+TE		1-1,5 g / 1L vode		Izbalansirani omjer makro elemenata	Vegetativni porast
Kelatex Ca+B	2. Faza - intenzivan porast do cvatnje	0,25 g / L vode	0,5 kg/ha	Pospješuje tvorbu staničnih stijenki i pojačava rast korijena i stabljike, bolja oplodnja	
Novalon 15-5-35+TE		1,5-3 g / 1L vode			Visok prinos i kvaliteta plodova
Trazex ili Oligomix		Oligomix 1-2 g / 1L	Trazex 0,3 kg/ha Oligomix 1 kg / ha		
Bioplex	3. Faza - formiranje plodova	0,1-0,15 ml / 1L vode 2-3 puta do berbe	0,5 l/ha	Primjena do kraja berbe svakih 10-14 dana	Otpornost biljke na stres i daje vitalnost
Calcinit		3-5 g / 1L vode	5 kg / ha	Jednom tjedno do kraja berbe.	Sprječava pojavu vršne truleži plodova
Novalon 6-12-36+TE ili Keymag 10-0-40+2MgO		2-3 g / 1L vode	Vigorizer 2 - 5 l /ha		Pospješuje slatkoću ploda
Calcium Mainstay	4. Faza - nakon formiranja plodova, do kraja berbe	0,3-0,5 l/1000 m <sup>2</sup>	Barrier 1-3 l/ha	Ne preporučavamo ga miješati sa gnojivima visokog postotka fosfora	Sprječava gubitak vode i pospješuje čvrstoću i kvalitet
Bioplex	U nepovoljnim uvjetima (hladnoća, zastoj u rastu...) u svim fenofazama	0,5 - 1 l/ha		U intervalima 10 - 14 dana. Pri zaštiti protiv bolesti i štetnika zajedno sa gnojivima	Jača metaboličke aktivnosti u biljci u stresnim situacijama

Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, PH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima.



 SAKATA®


### Triunfo F1

Novi krastavac za unutarnju proizvodnju, plodovi tamno zelene boje dužine 20 - 22 cm i vrlo ujednačeni tijekom cijelog proizvodnog ciklusa, biljka daje vrlo malo zaperaka i zahvalna je u proizvodnji, tolerantan na pepelnici (Sf), CMV i CVYV



## Krastavac

### FOLIJARNA PRIHRANA KRASTAVCA



 SAKATA®

### Kung Fu F1

Partenokarpni hibrid. Odlično zametanje, daje visoke prinose. Jaka i robustna biljka, laka za proizvodnju. Fantastičan izgled, atraktivni sjajni plodovi tamno zelene boje, pravilnog cilindričnog oblika. Visoka otpornost: b.b.:/ Ccu. Umjerena otpornost: Sf, / CVYV, . b.b.= gorki plodovi, Ccu = Cladosporium cucumerinum, Sf = Sphaerotheca fuliginea (pepelnica)CVYV = Cucumber Vein Yellowing Virus.



 SAKATA®

### Ronda F1

Ronda je partenokarpni hibrid krastavca kornišona vrlo brzog porasta, dobre energije sa kratkim internodijama. Biljka veoma snažna i pri visokim temperaturama. Plodovi vrlo atraktivnog izgleda dužine oko 12 - 13 cm, tamno zelene boje sa dobrim rasporedom bodlji. Daje jedan do dva ploda po katu. Visoka otpornost na Ccu. Srednja otpornost na plamenjaču, CMV, CVYV i Px.





Vilmorin

### Mirval F1

Za proizvodnju na otvorenom. Srednje do snažan vigor biljke. Plodovi ljubičasto – crni. Dužine 20-22cm, promjera 10-12cm i težine 350-400gr. Vrlo rani visoko prinosni hibrid. Biljka kratkih internodija daje sjajne i tamne plodove i u lošijim uvjetima. Vrlo čvrst plod.



Vilmorin

### Nadia F1

Hibrid za proizvodnju na otvorenom. Vrlo snažnog vigenja. Plod ljubičasto-crne boje. Dužina ploda 18-20cm, promjera 10-12cm i težine 350-400gr. Snažna biljka, vrlo čvrstih plodova.

## FOLIJARNA PRIHRANA PATLIDŽANA



# Patlidžan





### Kiara F1

Super slatki hibrid, snažna biljka, visine 200 - 230 cm. Klip na visini oko 75 cm. Dužina klipa 21-23 cm. Prosječno 18-20 redova zrna, lagan za čišćenje, lijepa sjajna zrna. Umjerene otpornosti na: Rust, Northern Leaf Blight (Ht). Visoke otpornosti na: MDMV.



### Kuatuor F1

Kombinacija ranog i visokog prinosa. Snažnog vigenja. Dobar paket otpornosti na bolesti. Industrija: dobro se ljušti, visoka iskoristivost.



### Rustler F1

Vrlo snažnog ponika. Visoko prinosan. Visina biljke oko 210 cm. Dužina klipa 20 - 21 cm. Broj redova 16 - 18.



# Šećerac



Hibrid	Tip	Vegetacija	Visina biljke (m)	Dužina klipa	Promjer klipa	Broj redova	MDMV	Et	Ps	Um
Kiara	super slatki	70	2 - 2,3	21 - 23	5	18 - 20	HR	IR	HR	IR
Kuatuor	super slatki	73	1,8	20 - 21	5	18 - 20	HR	IR	HR	IR
Rustler	super slatki	79	2,1	20 - 21	5,2	16 - 18	HR	HR	HR	HR



### Max F1

Kombinacija ranog i visokog prinosa.  
Snažnog vigenja. Dobar paket otpornosti  
na bolesti. Industrija: Dobro se ljušti, viso-  
ka iskoristivost.



### Kinze F1

Super slatki kukuruz šećerac. Visoko  
prinosan. Vrlo snažan u fazi nicanja.  
Dug i debeo klip – 24cm. Vrlo dobar  
paket otpornosti.



### Turbo F1

Slatki kukuruz šećerac. Snažnog vigenja,  
za ranu sjetvu. Biljka snažna vrlo fleksibil-  
na. Visoke otpornosti na bolesti i štetnike.  
Visoko iskorištenje u industriji.



Hibrid	Tip	Vegetacija	Visina biljke (m)	Dužina klipa	Promjer klipa	Broj redova	MDMV	Et	Ps	Um
Max	super slatki	79		19 - 20						
Kinze	super slatki	84	2,1	24	5	18 - 20	HR	IR	HR	IR
Turbo	slatki	80	1,9	21	5,2	18 - 20	HR	IR	HR	HR

# Šećerac



## Formulacije gnojiva u paleti

Formulacija	N-total	N-NO <sub>3</sub>	N-NH <sub>4</sub>	N-NH <sub>2</sub>	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	MgO	CaO	S	Fe	Zn	Cu	B	Mn	Mo	*LAK	*OE
Novalon 20-20-20+TE	20	5,3	3,4	11,3	20	20			0,05	0,02	0,01	0,01	0,02	0,001			
Novalon 12-48-6+TE	12	1,8	10,2		48	6		1,7	0,05	0,02	0,01	0,01	0,02	0,001			
Novalon 15-5-35+TE	15	11,4	3,6		5	35		1,6	0,05	0,02	0,01	0,01	0,02	0,001			
Novalon 6-12-36+3MgO+TE	6	4,5	1,5		12	36	3		7,9	0,05	0,02	0,01	0,01	0,02	0,001		
Novalon 19-6-20+2MgO+TE	19	10,9	8,1		6	20	2		3,7	0,05	0,02	0,01	0,01	0,02	0,001		
Novalon 0-5-35+4,5MgO+TE					5	35	4,5		13	0,05	0,02	0,01	0,01	0,02	0,001		
Keymag 10-0-40+2MgO	10	10				40	2	3,7									
Amcopaste 13-13-13 m/m	13	3,9	3	6,1	13	13											
Amcopaste 12-30-6 m/m	12		1	11	30	6											
Amcopaste 8-11-28 m/m	8	4			11	28											
Multi N	40	11	11	18													
AMCO Potato	14	4	5,3	4,7	25	13	3,5		12,5		1,8						
Bioplex (stimulator rasta)																112,5	
Rootex	6		6		46	5											18,5
Trazex									6	6	2	2	6		3	2	
Kelatex B													17		3	2	
Kelatex Fe								18	2			1			3	2	
Kelatex Zn										25					3	2	
Tropicel										10		10		0,5	3	2	
Calcium Mainstay							20										
H - 85																	85
Boramide													11				
Kalex P / K					30	20											
Kalex Cu	3				21					0,12	4	0,13					
Agrofol 390	10				10	10			0,08	0,06		0,08	0,06	0,02			

# Kako ostvariti maksimalni prinos?

Orijentacione granične EC vrijednosti (dS/m) u uzgoju povrtnih vrsta u tlu i EC vrijednosti koje rezultiraju smanjenjem prinosu				
	Granična EC vrijednost	Smanjenje prinosu		
		10%	25%	50%
Šparga	5,0	8,0	11,0	13,0
Grah	1,0	1,5	2,3	3,6
Grašak	0,9	2,0	3,7	6,5
Luk	1,2	1,8	2,8	4,3
Mrkva	1,0	1,7	2,8	4,6
Krumpir	1,7	2,5	3,8	5,9
Celer	1,8	3,5	5,8	10,1
Krastavac	2,5	3,3	4,4	6,3
Tikvica	3,9	4,9	5,9	7,9
Rajčica	2,5	3,5	5,0	7,6
Paprika	1,3	2,2	3,3	5,1
Lubenica	2,0	2,5	3,5	4,5
Salata	1,3	2,1	3,2	5,2
Špinat	3,7	5,5	7,0	8,0
Kupus	1,8	2,8	4,4	7,0
Brokula	2,7	3,5	5,5	8,2
Cvjetića	2,7	3,5	4,7	5,8

ANTAGONIZMI IZMEĐU MAKRO I MIKRO ELEMENATA				
Previše CaO (kalcija) u tlu	Antagonizam sa P, K, Mg, B, Mn, Fe, Zn			
Previše Zn (cinka) u tlu	Antagonizam sa Fe			
Previše Cu (bakra) u tlu	Antagonizam sa Fe, Mn			
Previše P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (fosfora) u tlu	Antagonizam sa Mg, Ca, B, Fe, Zn, Cu, Mn			
Previše K <sub>2</sub> O (kalija) u tlu	Antagonizam sa Ca, Mg			
Previše S (sumpora) u tlu	Antagonizam sa Mg, K, Ca, Fe, Zn			
Previše MgO (magnezija) u tlu	Antagonizam sa Ca, K			
Previše organske tvari (humusa) u tlu	Manja dostupnost Mn, Zn, Cu			
Previsok pH (bazična tla)	Manja dostupnost Fe, Zn, Mn, B, Cu			

POTREBE BILJAKA ZA MIKROELEMENTIMA				
Biljka	Bor	Bakar	Mangan	Cink
Jabuka	★★★	★★	★	★★
Šećerna repa	★★★	★	★	★★
Kupus	★★	★	★	★
Citrusi	★★	★★★	★★	★★
Djetelina	★★	★★	★	★★
Kukuruz	★★	★	★	★★★
Salata	★★	★★★	★★★	★★
Luk	★	★★★	★★★	★★★
Breskva	★★	★★	★★	★★★
Krumpir	★★★	★	★★★	★★
Soja	★	★★	★★★	★★
Duhan	★★	★	★★	★★
Rajčica	★★★	★★★	★★	★★
Žitarice	★	★★	★★	★

LEGENDA ★★★ visoka potreba ★★ srednja potreba ★ niska potreba

## Novalon - vodotopivo gnojivo

Razvojna faza	Formulacija
Start	12-48-6 + TE
Rast biljaka	19-6-20 + 2 MgO + TE
Intenzivni porast	20-20-20 + TE
Tijekom berbe	15-5-35 + TE
	19-6-20 + 2 MgO + TE
	16-12-36 + 3 MgO
	10-0-40 + 2 MgO
	0-5-35 + 4,5 MgO

### GLAVNE OSOBINE NOVALONA:

- Uz NPK sadrži uravnotežen spektar EDTA helatiziranih mikroelemenata (Trace Elements - TE) (Fe, Mn, Zn, Cu), što omogućuje optimalno usvajanje bez obzira na pH vrijednosti tla ili vode.
- Ne sadrži netopive i otrovne spojeve.
- Brzo i lako se otapa u vodi, ne radi grudice.
- Lako se miješa sa sredstvima za zaštitu bilja.
- Ne izaziva hrđu na metalnim dijelovima prskalica i sistema za navodnjavanje.
- Poboljšava stanje usjeva i kvalitetu plodova, posebno utjecena urod i otpornost.
- Idealan način zaštite usjeva od stresa izazvanog upotrebom sredstava za zaštitu bilja.
- Optimalan izbor formulacija za pojedinu fazu uzgoja.
- Visoka vodotopivost osigurava nesmetanu uporabu u sistemima za aplikaciju (nema začepljenja rasprskivača).
- Primjenjuje se folijarno i kroz sustave navodnjavanja - kap na kap



## Amcopaste


- smanjuju rast algi i stvaranje kamenca unutar sustava za navodnjavanje.



- Amcopasta su NPK gnojiva kemijski pomiješana u jedinstveni oblik paste.
- Ove jedinstvene formulacije paste, koje su patent tvornice MCFP, dokazano omogućuju efikasniju gnojidbu nego konvencionalne formulacije gnojiva.
- Zahvaljujući svojoj kemijskoj strukturi, Amcopaste omogućuju brže usvajanje hranjiva kod biljke kao i manje curenja hranjiva u tlo.
- Amcopaste su proizvedene od visoko kvalitetnih sirovina, kako bi se osigurali bolji rezultati i optimalno usvajanje hranjiva.
- One su kemijski mix, 100% homegeni NPK, potpuno topive u vodi i bez klorida.
- Sve formulacije oslobađaju fiksirane elemente u tlu iz prijašnjih aplikacija.
- Amcopasta se mogu miješati sa većinom gnojiva i sredstava za zaštitu bilja.

PARAMETRI KVALITETE VODE ZA NATAPANJE					
	Vrlo dobra	Dobra	Prihvatljiva	Srednje loša	Vrlo loša
EC (mS/cm)	<0.3	0.3-0.8	0.8-2.0	2.0-3.0	>3.0
UKUPNO TOPIVIH SOLI (ppm)	<150	150-500	500-1500	1500-2000	>2000
ALKALIČNOST ( $\text{HCO}_3^-$ ; meq/L)	<1.5	1.5-3.0	3.0-5.0	5.0-10.0	>10.0
ALKALIČNOST ( $\text{HCO}_3^-$ ; ppm)	<100	100-190	190-315	315-630	>630
NATRIJ (% Na)	<20	20-40	40-60	60-80	>80
BOR (B) (ppm)	<0.1	0.1-0.7	0.7-1.5	1.5-3.5	>3.5

Amcopasta 12-30-6 m/m (20-50-10 m/v) • Amcopasta 13-13-13 m/m (20-20-20 m/v) • Amcopasta 8-11-28+TE m/m (15-20-50 m/v)



Preporuke Agrimatico za uzgoj hibrida povrća su orijentacionog karaktera te nisu obavezne. Prikupljene su kroz niz godina od vodećih povrtlara te Agrimatico ne snosi odgovornost kod različitih rezultata uzgoja pošto su sve prikazane vrste povrća uザgajane u idealnim uvjetima. Preko 80 godina uspješnog poslovanja Agrimatico je sigurnost proizvođača na dobar odabir!



# Agrimatco

**Agrimatco d.o.o.**

Sjedište: Jelengradská 12, 31208

Petrijevci

Tel: 031/398-027

Fax: 031/398-028

\* Narudžbe SZB i gnojiva

Ured i skladište sjemena Zagreb

Antuna Gottlieba 3

10090 Zagreb

Tel: 01/3461-954

Fax: 01/3453-106

\* Narudžbe sjemena

[www.agrimatco.hr](http://www.agrimatco.hr)

