

L.A.T SUPREMO W 10/50/10 +B+Cu+Fe+Mn+Zn



Preporuke

Primena SUPREMO W 10/50/10 +B+Cu+Fe+Mn+Zn se preporučuje za vreme sadnje/sejanja ili neposredno pre cvetanja za zahtevne useve.

- Za primenu preko sistema za navodnjavanje:** 1 do 3 g/l vode za navodnjavanje
- Za folijarnu primenu:** 2-4% rastvor, tj. 4-8 kg SUPREMO W 10/50/10 +B+Cu+Fe+Mn+Zn na 200 l vode po hektaru na otvorenom polju. Ponoviti 2 do 3 puta ukoliko je potrebno.



Ove preporuke treba prilagoditi kulturi, sorti, klimatskim uslovima, zemljištu, temperaturi i sistemu za navodnjavanje.

Karakteristike i sastav

Boja: zelena

Vrsta: kristalni prah

Maksimalna rastvorljivost u destilovanoj vodi na 20°C: 511 g/l

Bezbednosni list*: FSP-NPKTE

Može doći do razlika u obojenosti koje ne utiču na kvalitet đubriva.

pH*	Ec* (mS/cm)
1 g/l	4,64
2 g/l	4,55
3 g/l	4,49
	0,95
	1,66
	2,27

*Koncentracija u destilovanoj vodi na 20°C

Prednosti

Podstiče formiranje korena.

Stimuliše cvetanje.

Povećava produktivnost voća.

Može se koristiti u svim sistemima za fertirigaciju zahvaljujući dobroj rastvorljivosti.

Tablica hranljivih elemenata			
N ukupan %	10	B%	0,01
N amonijačni %	9	Cu%	0,0075
N nitratni %	1	Fe%	0,026
N iz uree %	0	Mn%	0,032
P ₂ O ₅ %	50	Mo%	0
K ₂ O%	10	Si%	0
CaO%	0	Zn%	0,023
MgO%	0		
SO ₃ %	0		

Borealis L.A.T d.o.o., Bulevar Zorana Đindića 64a, 11070 Novi Beograd, Srbija- E-mail: lat.rs@borealisgroup.com, Telefon: +381 (11) 260 88 31

Borealis L.A.T GmbH, St.-Peter-Straße 25, 4021 Linz, Austria - E-Mail: lat@borealisgroup.com, Phone: +43 732 / 6915-0

*www.borealis-lat.com

Uloga elemenata

Za razvoj i plodonošenje biljaka neophodno je 12 hranljivih elemenata od kojih svaki utiče na pojedine procese koji se odvijaju u biljci. Količine hranljivih elemenata koje su potrebne biljkama razlikuju se od biljke do biljke.

Na osnovu potreba biljaka (niske, umerene i visoke), svi hranljivi elementi mogu se podeliti u 3 grupe:

- **Primarni ili makroelementi** (biljkama su potrebni u velikim količinama): azot, fosfor i kalijum.
- **Sekundarni elementi** (biljkama su potrebni u umerenim količinama): kalcijum, magnezijum i sumpor.
- **Mikroelementi** (biljkama su potrebni u malim količinama): bor, bakar, gvožđe, mangan, molibden i cink.

U nastavku sledi kratak opis nekih od uloga koje ovi elementi imaju u biljci:

PRIMARNI ILI MAKROELEMENTI

AZOT

Važnost azota za vegetativni razvoj dobro je poznata - on ulazi u strukturu molekula hlorofila i na taj način direktno utiče na fotosintezu. Pored toga, azot učestvuje u izgradnji proteina.

FOSFOR

Fosfor direktno utiče na sve procese transfera energije u biljci. On podstiče ukorenjavanje i porast - crvena boja listova ili lisnih drški čest je simptom nedostatka fosfora. Kvalitet plodova voća, povrća i žitarica zavisi od ovog elementa. Fosfor pozitivno utiče na oplodnju i plodonošenje.

KALIJUM

Kalijum utiče na asimilaciju jona i vodni balans. Ovaj element podstiče akumulaciju glukoze i šećera u plodovima i podzemnim organima kod biljaka pri kraju vegetacije.

SEKUNDARNI ELEMENTI

KALCIJUM

Kalcijum učestvuje u deobi ćelija. Ovaj element poboljšava strukturu ćelijskog zida, što je od velike važnosti pri zametanju plodova. Kalcijum je u biljkama slabo pokretan.

MAGNEZIJUM

Magnezijum je važan sastojak hlorofila, tako da utiče na odvijanje fotosinteze. Njegov efekat na prinos je veoma bitan. Magnezijum je prilično pokretan u biljci, a njegov nedostatak prvo se primećuje na starijim listovima.

SUMPOR

Sumpor je sastavni deo nekih aminokiselina i ima bitnu ulogu u procesu sinteze proteina. Pored toga, on ulazi u sastav hlorofila i njegov uticaj na pravilan rast biljke i prinos je vrlo bitan.

MIKROELEMENTI

BOR

Bor direktno učestvuje u razvoju i rastu novih ćelija. Najpoznatija je njegova uloga u oplodnji i formirajući plodova. Ovo je bitan element koji utiče na prinos kod mnogih kultura.

MANGAN

Mangan je katalizator sinteze hlorofila, a utiče i na procese transformacije azota u biljci. Ovaj element slabije je pokretan u biljci i njegov nedostatak se prvo javlja na mladim listovima.

GVOŽĐE

Gvožđe utiče na sintezu hlorofila i ulazi u sastav nekih enzima. Ovaj element učestvuje u mnogim procesima koji se u biljci odvijaju, kao što je transfer energije. Rizik od pojave nedostatka posebno je prisutan u zemljištima sa visokom pH vrednošću.

MOLIBDEN

Molibden podstiče usvajanje azota i fosfora. On ima bitnu ulogu pri azotifikaciji kod leguminoza. Nedostatak molibdena može se javiti na kiselim zemljištima.

BAKAR

Bakar ulazi u sastav enzima i kao katalizator utiče na metabolizam ugljenih hidrata i azota. Posebno važan uticaj ima na broj plodnih cvetova u klasu kod žitarica.


CINK

Cink je aktivator različitih enzima i ima direktni uticaj na sintezu hlorofila, regulaciju rasta i sintezu proteina. U slučaju nedostatka cinka dolazi do hloroze između lisnih nerava mladih listova.

Kompatibilnost

Naši proizvodi kompatibilni su sa većinom preparata za ishranu i zaštitu bilja. Međutim, pre primene preporučuje se provera kompatibilnosti.

Uputstvo za upotrebu



(1) Napuniti rezervoar prskalice čistom vodom do 2/3 zapremine i uključiti mešać (2) Dodati Supremo W dubrivo (3) dodati sredstvo za zaštitu bilja (4) Dodati ostatak vode u rezervoar.

Skladištenje

