



# L.A.T SUPREMO

## W 15/5/30 +TE

### L.A.T SUPREMO W 15/5/30 + Mikroelementi

#### Preporuke

Primena SUPREMO W 15/5/30 +TE se preporučuje za zemljišta sa visokim sadržajem fosfora u vreme intenzivnog rasta biljaka. Na zemljištima sa izbalansiranim sadržajem hranljivih elemenata, može se primeniti za vreme stadijuma sazrevanja.



- Za primenu preko sistema za navodnjavanje:** 1 do 3 g/l vode za navodnjavanje
- Za folijarnu primenu:** 2-4 % rastvor, tj. 4-8 kg SUPREMO W 15/5/30 +TE na 200 l vode po hektaru na otvorenom polju. Ponoviti tretman 2 do 3 puta ukoliko je potrebno.

Ove preporuke treba prilagoditi kulturi, sorti, klimatskim uslovima, zemljištu, temperaturi i sistemu za navodnjavanje.

#### Karakteristike i sastav

**Boja:** narandžasta

pH*	Ec*
1 g/l	3.65
2 g/l	3.48
3 g/l	3.40

(mS/cm)

**Vrsta:** kristalni prah

1 g/l	3.65	1.07
2 g/l	3.48	2.03
3 g/l	3.40	2.94

**Maksimalna rastvorljivost u destilovanoj vodi na 20°C:** 417 g/l

1 g/l	3.65	1.07
2 g/l	3.48	2.03
3 g/l	3.40	2.94

**Bezbednosni list\*:** FSP-NPKTE

\*Koncentracija u destilованoj vodi na 20°C

#### Tablica hranljivih elemenata

N ukupan %	15	B%	0.01
N amonijačni %	8.5	Cu%	0.0075
N nitratni %	6.5	Fe%	0.026
N iz uree %	0	Mn%	0.032
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> %	5	Mo%	0
K <sub>2</sub> O %	30	Si%	0
CaO%	0	Zn%	0.023
MgO%	0		
SO <sub>3</sub> %	0		

#### Prednosti

Podstiče obojenost voća i povrća i organoleptičke osobine

Može se koristiti u svim sistemima za fertirigaciju zahvaljujući dobroj rastvorljivosti

Borealis L.A.T d.o.o., Bulevar Zorana Đindjića 64a, 11070 Novi Beograd, Srbija  
E-mail: lat.rs@borealisgroup.com, Telefon: +381 (11) 260 88 31

\*www.borealis-lat.com

 **BOREALIS**

• FERTILIZER  
• TECHNICAL N PRODUCTS

**L.A.T**  
growing with joy.

## Uloga elemenata

Za razvoj i plodonošenje biljaka neophodno je 12 hranljivih elemenata od kojih svaki utiče na pojedine procese koji se odvijaju u biljci. Količine hranljivih elemenata koje su potrebne biljkama razlikuju se od biljke do biljke.

Na osnovu potreba biljaka (niske, umerene i visoke), svi hranljivi elementi mogu se podeliti u 3 grupe:

- **Primarni ili makroelementi** (biljkama su potrebni u velikim količinama): azot, fosfor i kalijum.
- **Sekundarni elementi** (biljkama su potrebni u umerenim količinama): kalcijum, magnezijum i sumpor.
- **Mikroelementi** (biljkama su potrebni u malim količinama): bor, bakar, gvožđe, mangan, molibden i cink.


U nastavku sledi kratak opis nekih od uloga koje ovi elementi imaju u biljci:

PRIMARNI ILI MAKROELEMENTI		
<b>AZOT</b> Važnost azota za vegetativni razvoj dobro je poznata - on ulazi u strukturu molekula hlorofila i na taj način direktno utiče na fotosintezu. Pored toga, azot učestvuje u izgradnji proteina.	<b>FOSFOR</b> Fosfor direktno utiče na sve procese transfera energije u biljci. On podstiče ukorenjavanje i porast - crvena boja listova ili lisnih drški čest je simptom nedostatka fosfora. Kvalitet plodova voća, povrća i žitarica zavisi od ovog elementa. Fosfor pozitivno utiče na oplodnju i plodonošenje.	<b>KALIJUM</b> Kalijum utiče na asimilaciju jona i vodni balans. Ovaj element podstiče akumulaciju glukoze i šećera u plodovima i podzemnim organima kod biljaka pri kraju vegetacije.
SEKUNDARNI ELEMENTI		
<b>KALCIJUM</b> Kalcijum učestvuje u deobi ćelija. Ovaj element poboljšava strukturu ćelijskog zida, što je od velike važnosti pri zametanju plodova. Kalcijum je u biljkama slabo pokretan.	<b>MAGNEZIJUM</b> Magnezijum je važan sastojak hlorofila, tako da utiče na odvijanje fotosinteze. Njegov efekat na prinos je veoma bitan. Magnezijum je prilično pokretan u biljci, a njegov nedostatak prvo se primećuje na starijim listovima.	<b>SUMPOR</b> Sumpor je sastavni deo nekih aminokiselina i ima bitnu ulogu u procesu sinteze proteina. Pored toga, on ulazi u sastav hlorofila i njegov uticaj na pravilan rast biljke i prinos je vrlo bitan.
MIKROELEMENTI		
<b>BOR</b> Bor direktno učestvuje u razvoju i rastu novih ćelija. Najpoznatija je njegova uloga u oplodnji i formirajući plodove. Ovo je bitan element koji utiče na prinos kod mnogih kultura.	<b>GVOŽĐE</b> Gvožđe utiče na sintezu hlorofila i ulazi u sastav nekih enzima. Ovaj element učestvuje u mnogim procesima koji se u biljci odvijaju, kao što je transfer energije. Rizik od pojave nedostatka posebno je prisutan u zemljištima sa visokom pH vrednošću.	<b>BAKAR</b> Bakar ulazi u sastav enzima i kao katalizator utiče na metabolizam ugljenih hidrata i azota. Posebno važan uticaj ima na broj plodnih cvetova u klasu kod žitarica.
<b>MANGAN</b> Mangan je katalizator sinteze hlorofila, a utiče i na procese transformacije azota u biljci. Ovaj element slabije je pokretan u biljci i njegov nedostatak se prvo javlja na mladim listovima.	<b>MOLIBDEN</b> Molibden podstiče usvajanje azota i fosfora. On ima bitnu ulogu pri azotifikaciji kod leguminoza. Nedostatak molibdена može se javiti na kiselim zemljištima.	<b>CINK</b> Cink je aktivator različitih enzima i ima direktni uticaj na sintezu hlorofila, regulaciju rasta i sintezu proteina. U slučaju nedostatka cinka dolazi do hloroze između lisnih nerava mladih listova.

## Kompatibilnost

Naši proizvodi kompatibilni su sa većinom preparata za ishranu i zaštitu bilja. Međutim, pre primene preporučuje se provjeri kompatibilnosti.

## Uputstvo za upotrebu



(1) Napunite rezervoar prskalice čistom vodom do 2/3 zapremine i uključiti mešać (2) Dodati Supremo W dubrivo (3) dodati sredstvo za zaštitu bilja (4) Dodati ostatak vode u rezervoar.

## Skladištenje



• FERTILIZER  
• TECHNICAL N PRODUCTS

