


Zaštitna sredstva  
i programi zaštite



# Vinova loza





## Kombinirani fungicid jedinstvenog načina djelovanja namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i povrćarstvu.

### Djelovanje

Kontaktno	<input type="checkbox"/>
Sistemično	<input checked="" type="checkbox"/>
Preventivno	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurativno	<input checked="" type="checkbox"/>
Lokosistemično	<input checked="" type="checkbox"/>

### Aktivna tvar

fluopiram (200 g/L)  
tebukonazol (200 g/L)

### Formulacija

SC – koncentrirana suspenzija

### Doza primjene

vinova loza: 0,375 L/ha

### Pakiranje

10 mL, 40 mL, 100 mL, 1 L

### Prednosti


- Izvanredna učinkovitost i najširi spektar djelovanja.
- Nova aktivna tvar omogućuje uspješnu antirezistentnu strategiju.
- Sistemično djelovanje jamči učinkovitu zaštitu biljnih dijelova koji nisu bili neposredno tretirani.
- Vrhunska zaštita koja dugoročno poboljšava zdravlje tretirane biljke i plodova pri skladištenju.





**Luna<sup>®</sup>**  
**EXPERIENCE**

Fluopiram i tebukonazol su nepobjedivi dvojac,  
zdržani u jedinstvenom fungicidu Luna<sup>®</sup> Experience.



**U zdravom voću  
zdrav duh!**





FALCON



## Kombinirani sistemični fungicid za folijarno suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu i ratarstvu.

### Djelovanje

Kontaktno	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistemično	<input checked="" type="checkbox"/>
Preventivno	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurativno	<input checked="" type="checkbox"/>
Eradikativno	<input checked="" type="checkbox"/>

### Aktivna tvar

tebukonazol (167 g/L), spiroksamid (250 g/L), triadimenol (43 g/L)

### Formulacija

EC – tekući koncentrat za emulziju

### Doza primjene

vinova loza: 0,3–0,4 L/ha

### Pakiranje

40 mL, 100 mL, 1 L

### Prednosti

- Zaštita vinove loze od pepelnice 12–14 dana.
- Odlično preventivno i kurativno djelovanje.
- Prati razmake tretiranja protiv plamenjače.
- Izvrsno se uklapa u sve programe tretiranja.



- Falcon® se može kombinirati sa pripravkom Mikal® premium F.
- Falcon® se može miješati sa proizvodima na bazi sumpora.





NATIVO



## Sistemični fungicid za suzbijanje pepelnice vinove loze.

### Djelovanje

Kontaktno	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistemično	<input checked="" type="checkbox"/>
Preventivno	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurativno	<input checked="" type="checkbox"/>
Eradikativno	<input type="checkbox"/>

### Aktivna tvar

tebukonazol (500 g/kg), trifloksistrobin (250 g/kg)

### Formulacija

WG – močive samodispergirajuće granule

### Doza primjene

vinova loza: 0,2 kg/ha

### Pakiranje

20 g, 200 g, 1 kg

### Prednosti

- Zaštita vinove loze od pepelnice 12–14 dana.
- Odlično kurativno djelovanje.
- Dobro sporedno djelovanje na sivu pljesan.
- Kratka karenca (12–14 dana).



- Nativo® zbog dugotrajne učinkovitosti preporučamo kombinirati sa pripravcima protiv plamenjače Mikal® premium F, Profiler® ili Antracol® Combi.
- Nativo® se može miješati sa proizvodima na bazi sumpora.





Antracol  
WG

## Fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i povrćarstvu.



### Djelovanje

- |              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Kontaktno    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sistemično   | <input type="checkbox"/>            |
| Preventivno  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kurativno    | <input type="checkbox"/>            |
| Eradikativno | <input type="checkbox"/>            |

Aktivna tvar propineb (700 g/kg)

Formulacija WG – vododispersirajuće granule

Doza primjene vinova loza: 2 kg/ha

Pakiranje 25 g, 200 g, 1 kg

- Prednosti
- Širok spektar djelovanja, trenutačno i dugotrajno djelovanje.
  - Jednakomjerna raspoređenost po površini lista
  - Sadrži cink (Zn) koji pomaže stabilnosti suspenzije i ima pozitivan utjecaj na razvoj bobica.



- Antracol® WG 70 preporučljiv je za preventivna tretiranja protiv plamenjače i crne pjegavosti vinove loze u početnim razvojnim fazama.
- Na istoj površini može se upotrijebiti najviše 4 puta u jednoj vegetacijskoj sezoni sve dok nema infekcije na biljci.





**Antracol**  
Combi WP 76



## Kombinirani fungicid za suzbijanje bolesti u vinovoj lozi i krumpiru.

### Djelovanje

Kontaktno	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistemično	<input checked="" type="checkbox"/>
Preventivno	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurativno	<input checked="" type="checkbox"/>
Eradikativno	<input type="checkbox"/>

### Aktivna tvar

propineb (580 g/kg), cimoksanil (48 g/kg)

### Formulacija

WP – močivi prah

### Doza primjene

vinova loza: 2,5 kg/ha

### Pakiranje

20 g, 100 g, 1 kg

### Prednosti

- Trenutačno i dugotrajno djelovanje.
- Vrhunska kvaliteta za nisku cijenu.
- Djeluje lokosistemično i kurativno te omogućava pouzdanu zaštitu od bolesti.



- Antracol® Combi ima odlično djelovanje, kako pri niskim, tako i pri visokim temperaturama.
- Na istoj površini maksimalno se smije upotrijebiti 2 puta u istoj sezoni. Zbog svojeg kurativnog djelovanja djeluje i 1–2 dana nakon zaraze.





**Mikal**<sup>®</sup>  
premium F



## Sistemični i kontaktni fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze.

### Djelovanje

Kontaktno	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistemično	<input checked="" type="checkbox"/>
Preventivno	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurativno	<input checked="" type="checkbox"/>
Eradikativno	<input type="checkbox"/>

### Aktivna tvar

fosetil-Al (500 g/kg), folpet (250 g/kg), iprovalikarb (40 g/kg)

### Formulacija

WG – močive samodispergirajuće granule

### Doza primjene

vinova loza: 3 kg/ha

### Pakiranje

300 g, 1 kg

### Prednosti

- Fungicid s najboljim preventivnim i kurativnim djelovanjem.
- Fungicid koji osigurava najduži razmak između dva tretiranja.
- Najsigurniji fungicid i u najkritičnijim uvjetima uz sporedno djelovanje na sivu pljesan.
- Povećava prirodnu otpornost bilje.



- Zbog posebnog načina djelovanja Mikal® premium F se preporuča koristiti u bloku i to od početka cvatnje, završetka cvatnje i nakon cvatnje. Razmak između tretiranja treba biti 12–14 dana.
- U slučaju pojave simptoma plamenjace preporučujemo primjenu preparata Mikal® premium F zbog njegovog kurativnog djelovanja.
- Najpouzdanije djelovanje.





**PROFILER**



## Kombinirani preventivni fungicid koji se koristi za suzbijanje plamenjače vinove loze.

### Djelovanje

Kontaktno	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistemično	<input checked="" type="checkbox"/>
Preventivno	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurativno	<input type="checkbox"/>
Eradikativno	<input type="checkbox"/>

### Aktivna tvar

fosetil-Al (666,7 g/kg), fluopikolid (44,4 g/kg)

### Formulacija

WG – močive samodispergirajuće granule

### Doza primjene

vinova loza: 2,5–3 kg/ha

### Pakiranje

1 kg

### Prednosti

- Iznimno dobro štiti grozdiće i listove.
- Dugotrajno djelovanje - omogućuje razmak između tretiranja od 12–14 dana.
- Kratka karenca.
- Bez mogućnosti pojave unakrsne rezistentnosti (jedinstvena aktivna tvar fluopikolid).
- Povećava prirodnu otpornost biljke.



- Primjenjuje se u trenutku pojave bobica pa do razvojne faze u kojoj bobice dosegnu veličinu pšeničnog zrna i primjetan je rast grozdova (BBCH 53-73).
- Miješanje s pripravkom Luna® Experience nije preporučljivo.





**TELDOR®**



## **Specifični botriticid izvrsnog djelovanja na sivu pljesan vinove loze.**

### **Djelovanje**

Kontaktno	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistemično	<input type="checkbox"/>
Preventivno	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurativno	<input type="checkbox"/>
Eradikativno	<input type="checkbox"/>

### **Aktivna tvar**

fenheksamid (500 g/L)

### **Formulacija**

SC – Koncentrirana suspenzija

### **Doza primjene**

vinova loza: 1–1,5 L/ha

### **Pakiranje**

10 mL, 100 mL, 1 L

### **Prednosti**

- Efikasan i siguran.
- Postojan i dugotrajan.
- Registriran za veliki broj kultura
- Kratke karence bez štetnog utjecaja u proizvodnji vina.
- Bez mogućnosti pojave unakrsne rezistentnosti



- Tretiranje pripravkom Teldor® odmah nakon cvatnje te prije zatvaranja grozdova ključno je za uspješno suzbijanje sive pljesni.
- Za sprječavanje pojave sive pljesni dovoljno je tretiranje samo u zoni grozdova.





**MOVENTO®**



## Novi jedinstveni insekticid širokog spektra i dugotrajnog djelovanja.

### Djelovanje

- |              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Kontaktno    | <input type="checkbox"/>            |
| Sistemično   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Preventivno  | <input type="checkbox"/>            |
| Kurativno    | <input type="checkbox"/>            |
| Eradikativno | <input type="checkbox"/>            |

### Aktivna tvar

Spirotetramat (100 g/L)

### Formulacija

SC – koncentrirana suspenzija

### Doza primjene

vinova loza: 0,75–0,95 L/ha

### Pakiranje

50 mL, 100 mL, 1 L

### Prednosti

- Jedini insekticid s 2-smjernom sistemičnošću.
- Dugotrajan djelovanje - ušteda i profitabilnost.
- Bez kros-rezistencije s postojećim insekticidima.



- Tretiranje obaviti od početka formiranja bobica do faze zatvaranja grozda.
- Sredstvo primjeniti u blok tretmanu uz poštivanja razmaka između tretiranja od 14 dana.
- Za optimalnu učinkovitost pripravka osigurati kvalitetnu aplikaciju te ga primjeniti u vremenu intezivne vegetacije s izraženim kolanjem biljnih sokova.
- Najbolje rezultate postižemo samostalnom primjenom pripravka.





decis®



## Cjenovno prihvatljiv insekticid za odlično suzbijanje insekata na voćkama, vinovoj lozi, žitaricama, uljanoj repici i krumpiru.

### Djelovanje

Kontaktno	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistemično	<input type="checkbox"/>
Preventivno	<input type="checkbox"/>
Kurativno	<input type="checkbox"/>
Eradikativno	<input type="checkbox"/>

### Aktivna tvar

deltametrin (25 g/L)

### Formulacija

EC – tekući koncentrat za emulziju

### Doza primjene

vinova loza: 0,3–0,4 L/ha

### Pakiranje

50 mL, 200 mL, 1 L

### Prednosti

- Cjenovno prihvatljiv insekticid.
- Suzbija širok spektar insekata.
- Iznimno brzo djelovanje.



- Decis® 2,5 EC ne smije se koristiti pri visokim temperaturama (iznad 28 °C), jer je vrlo hlapljiv.
- Pripravak je opasan za pčele! Tretiranje treba izbjegavati u vrijeme cvatnje kultiviranih biljaka i niskog raslinja. Kako bi se zaštitile pčele i ostali oprasivači tretiranje je potrebno obaviti 2 sata nakon zalaska ili 2 sata prije izlaska sunca.

