



# PAPRIKA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE



| VRIJEME PRIMJENE  | PRIPRAVAK   | SUZBIJA  | KARENCA   |
|---|---|--|---|
| OD NIKANJA DO PRESADIVANJA RASADA                               | ■ <b>POLYRAM DF</b> 0,2 g/m <sup>2</sup> u 40 – 60 ml vode/m <sup>2</sup>   | polijeganje rasada i plamenjaču  | 35 dana   |
| U VEGETACIJI, KOD POJAVE PUŽEVA                                 | ■ <b>PUŽOMOR</b> 3 – 5 g/m <sup>2</sup>   | sve vrste puževa   | 14 dana   |
| U VEGETACIJI, PREVENTIVNO                                       | ■ <b>CHROMOSUL 80</b> 0,3 – 0,4% (30 – 40 g u 10 l vode)  | pepelnicu  | 14 dana   |
|   | ■ <b>STROBY WG</b> 0,02 – 0,05% (20 – 50 g na 100 litara vode)  | pepelnicu  | 3 dana  |
| U VEGETACIJI, PREVENTIVNO ILI KOD POJAVE PRVIH SIMPTOMA BOLESTI | ■ <b>SIGNUM</b> 0,1 – 0,15% (10 – 15 g na 10 l vode)  | pepelnicu, sivu plijesan   | 7 dana za sorte slatke paprike, 21 dan za ljute sorte paprike |
| U VEGETACIJI, KOD POJAVE ŠTETNIKA                               | ■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,3 l/ha  | stakleničkog štitastog moljca, duhanovog štitastog moljca  | 7 dana  |
|   | ■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,15 l/ha   | lisnih uši, lisnih sovića, gusjenica sovića pozemljuša   | 7 dana  |
|   | ■ <b>ROTOR SUPER</b> 300 – 500 ml/ha uz utrošak vode 600 – 1000 l/ha<br><br>180 – 300 ml/ha uz utrošak vode 600 – 1000 l/ha | žutu kukuruznu sovicu, sovice, krumpirovu zlaticu, lisne uši, sovice pozemljuše<br>zelenu stjenicu / stjenicu<br>Nezara viridula | 3 dana  |



## NAPOMENA:

Sredstvo ROTOR SUPER može se primijeniti na paprici u zaštićenom prostoru za suzbijanje **stakleničkog štitastog moljca**.