



## PLAN ĐUBRENJA RANOG KUPUSA I KARFIOLA

Navedeni planovi đubrenja su informativnog karaktera. Za detaljne informacije o količinama, načinu i vremenu primene đubriva, molimo vas da se obratite stručnoj službi Timac Agro Balkans.



# PLAN ĐUBRENJA RANOG KUPUSA I KARFIOLA



## OSNOVNO ĐUBRENJE

- **EUROFERTIL 67 N-Process (14:7:16) ili EUROFERTIL TOP 51 (4:10:20)**  
4 - 7 kg/ar
- **PHYSIOMAX (76% CaCO<sub>3</sub> + 3 MgO)**  
3 - 4 kg/ar (startna obezbeđenost biljaka kalcijumom i magnezijumom)
- **SULFAMMO 30 N-process**  
1 - 2 kg/ar

## PROIZVODNJA RASADA

- **FERTIACYL STARTER**  
0,5% (0,5 l/100 l vode) u fazi četiri prava lista
- **FERTIACYL STARTER**  
0,5% - 1% (0,5 - 1 l/100 l vode) pet do sedam dana pred rasađivanje (način primene - zalivanjem rasada rastvorom FERTIACYL STARTER-a) - nakon primene isprati vodom

## FOLIJARNA PRIHRANA

- **FERTIACYL STARTER**  
0,5% - 1% (0,5 - 1 l/100 l vode) 7 - 10 dana posle sadnje
- **FERTILEADER GOLD**  
0,4 - 0,6% (0,4 - 0,6 l/100 l vode) početak formiranja glavice
- **FERTILEADER ELITE**  
0,6% - 1% (0,6 - 1 l/100 l vode) 15 - 20 dana pred početak berbe



## VODOTOPIVA ĐUBRIVA

| Vreme primene                 | Način primene | Đubrivo                                                         | Količina đubriva | Primena                                                             |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5 - 10 dana posle rasađivanja | Kap po kap    | <b>KSC I</b><br>(14:40:5)                                       | 200 - 250 g/ar   | Jednom                                                              |
| Intenzivan porast             | Kap po kap    | <b>KSC II</b><br>(23:5:5)<br>ili<br><b>KSC XX</b><br>(19:20:20) | 250 g/ar         | Jednom do dva puta                                                  |
|                               |               | <b>KSC MIX *</b><br>(15% MgO + mikroelementi)                   | 50 g/ar          | Jednom do tri puta tokom vegetacije (odvojeno od ostalih đubriva) * |
| Od početka zavijanja glavice  | Kap po kap    | <b>KSC III</b><br>(15:5:35)                                     | 300 g/ar         | Nedeljno                                                            |
|                               |               | <b>KSC VI **</b><br>(14:12:14)                                  |                  |                                                                     |
|                               |               | <b>KSC VII PERLA</b><br>(15:0:9 + 20 CaO)                       | 150 g/ar         | Nedeljno (odvojeno od ostalih đubriva)                              |

## NAPOMENA

\* **KSC MIX** - Korektor nedostatka magnezijuma i mikroelemenata. Primenjuje se preventivno dva do tri puta u toku vegetacije ili kada se primećuje nedostatak ovih hraniva na biljkama (šarenilo najstarijeg ili najmlađeg lista). Primenjuje se u količini od 1 kg za 20 ari.

**KSC SULFACID** - Korektor visoke pH vrednosti zemljišta i vode za zalivanje (pH > 6,5). Pomaže bolje usvajanje azota, fosfor i drugih hraniva iz zemljišta i dodaje se rastvoru vodotopivih đubriva u količini od 1 litara za 40 ari.

\*\* **KSC VI (14:12:14)** se preporučuje samostalno i u kombinaciji sa **KSC III**