



## PLAN ĐUBRENJA ZELENE SALATE

Navedeni planovi đubrenja su informativnog karaktera. Za detaljne informacije o količinama, načinu i vremenu primene đubriva, molimo Vas da se obratite stručnoj službi Timac Agro Balkans.



Timac Agro Balkans d.o.o. • Temerinska 76, 21000 Novi Sad, Srbija • Tel/fax: 021 47 27 020

[www.timacagro.rs](http://www.timacagro.rs) Timac Agro Balkans • [www.roullier.com](http://www.roullier.com)



# PLAN ĐUBRENJA ZELENE SALATE

## OSNOVNO ĐUBRENJE

- EUROFERTIL 67 N-Process (14:7:16) ili  
EUROFERTIL TOP 51 (4:10:20)**  
4 - 6 kg/ar
- PHYSIMAX (76% CaCO<sub>3</sub> + 3 MgO)**  
2 - 3 kg/ar (startna obezbeđenost biljaka kalcijumom i magnezijumom)
- SULFAMMO 30 N-process**  
1,5 - 2 kg/ar (na zemljištima sa deficitom azota)

## PROIZVODNJA RASADA

- FERTIACTYL STARTER**  
0,3% (0,3 l/100 l vode) u fazi četiri lista folijarno ili
- FERTIACTYL STARTER**  
0,3% - 0,5% (0,3 - 0,5 l/100 l vode) pet do sedam dana pred rasađivanje, način primene - zalivanjem rasada rastvorum FERTIACTYL STARTER-a ili potopiti kontejnere u rastvor FERTIACTYL STARTER-a neposredno pred sadnju

## FOLIJARNA PRIHRANA

- FERTIACTYL STARTER**  
0,6% - 1% (0,6 - 1 l/100 l vode) 7 - 10 dana posle rasađivanja (brže ukorenjavanje i bolji start biljaka)
- FERTILEADER ELITE**  
0,6% - 1% (0,6 - 1 l/100 l vode) na svakih 10 - 15 dana (čvrstoća i sjaj)
- FERTILEADER VITAL**  
0,3% - 0,5% (0,3 - 0,5 l/100 l vode) jednom do dva puta u toku vegetacije (vitalnost i brži rast biljaka)



## VODOTOPIVA ĐUBRIVA

Vreme primene	Način primene	Đubrivo	Količina đubriva	Primena
10 - 15 dana posle rasađivanja	Kap po kap (mikrorasprskivač)*	<b>KSC I</b> (14:40:5)	250 g/ar	Jednom do dva puta
Vegetativni porast	Kap po kap (mikrorasprskivač) *	<b>KSC II</b> (23:5:5) ili <b>KSC XX</b> (19:20:20)	250 - 300 g/ar	Više puta po potrebi
	Kap po kap	<b>KSC SULFACID **</b>	25 ml/ar	Jednom do dva puta - po potrebi i više puta (zemljište ili voda pH > 6,5)
	Kap po kap (mikrorasprskivač) *	<b>KSC VII PERLA</b> (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	Svakih 7 - 10 dana (odvojeno od ostalih đubriva)
Od početka do kraja berbe	Kap po kap (mikrorasprskivač) *	<b>KSC III</b> (15:5:35)	300 - 400 g/ar	Jednom do dva puta
	Kap po kap	<b>KSC VI ****</b> (14:12:14)	50 g/ar	Jednom do tri puta tokom vegetacije (odvojeno od ostalih đubriva)
	Kap po kap	<b>KSC MIX ***</b> (15% MgO + mikroelementi)	150 g/ar	Svakih 7 - 10 dana (odvojeno od ostalih đubriva)

## NAPOMENA

\* Nakon primene vodotopivih đubriva preko rasprskivača, biljke isprati čistom vodom u trajanju od 20 do 30 minuta.

\*\* KSC SULFACID - Korektor visoke pH vrednosti zemljišta i vode za zalivanje (pH > 6,5). Pomaže bolje usvajanje azota, fosfora i drugih hraniva iz zemljišta i dodaje se rastvoru vodotopivih đubriva u količini od 1 litar za 40 ar.

\*\*\* KSC MIX - Korektor nedostatka magnezijuma i mikroelemenata. Primenjuje se preventivno dva do tri puta u toku vegetacije ili kada se primeti nedostatak ovih hraniva na biljkama (šarenilo najstarijeg ili najmlađeg lista). Primenjuje se u količini od 1 kg za 20 ar.

\*\*\*\* KSC VI (14:12:14) se preporučuje samostalno i u kombinaciji sa KSC III