




## PLAN ĐUBRENJA CRVENE PAPRIKE

Navedeni planovi đubrenja su informativnog karaktera. Za detaljne informacije o količinama, načinu i vremenu primene đubriva, molimo Vas da se obratite stručnoj službi Timac Agro Balkans.



Timac Agro Balkans d.o.o. • Temerinska 76, 21000 Novi Sad, Srbija • Tel/fax: 021 47 27 020

[www.timacagro.rs](http://www.timacagro.rs)  Timac Agro Balkans • [www.roullier.com](http://www.roullier.com)



# PLAN ĐUBRENJA CRVENE PAPRIKE



## OSNOVNO ĐUBRENJE

- **EUROFERTIL 67 N-Process (14:7:16) ili EUROFERTIL TOP 51 (4:10:20)**  
6 - 10 kg/ar
- **PHYSIOMAX (76% CaCO<sub>3</sub> + 3 MgO)**  
3 - 4 kg/ar (startna obezbeđenost biljaka kalcijumom i magnezijumom)
- **SULFAMMO 30 N-process**  
2 - 3 kg/ar gde nije postavljena folija u redove (azotna prihrana - posle zamećanja prvih plodova) ili 8 kg Eurofertil TOP + 3 kg Physiomax + 2 kg Sulfammo po aru, startno pred sadnju

## PROIZVODNJA RASADA

- **FERTIACTYL STARTER**  
0,3% - 0,5% (0,3 - 0,5 l/100 litara vode) u fazi četiri prava lista folijano ili
- **FERTIACTYL STARTER**  
0,5% - 1% (0,5 - 1 l/100 l vode) pet do sedam dana pred rastađivanje (primenjuje se zalivanjem rasada rastvorom FERTIACTYL STARTER-a) - nakon zalivanja rasad isprati vodom.

## FOLIJARNA PRIHRANA

- **FERTILEADER ELITE**  
1% (1 l/100 l vode), nakon formiranja prvih plodova na svakih 14 dana (čvrstoća, sjaj i pravilan oblik ploda)
- **FERTILEADER GOLD**  
0,3% - 0,5% (0,3 - 0,5 l/100 l vode) jednom do dva puta u toku vegetacije (bolja oplodnja i bolje zamećanje ploda)



## NAPOMENA

\* **KSC SULFACID** - Korektor visoke pH vrednosti zemljišta i vode za zalivanje (pH > 6,5). Pomaže bolje usvajanje azota, fosfora i drugih hraniva iz zemljišta i dodaje se rastvoru vodotopivih đubriva u količini od 1 litara za 40 ari.

\*\* **KSC MIX** - Korektor nedostatka magnezijuma i mikroelemenata. Primenjuje se preventivno dva do tri puta u toku vegetacije ili kada se primeti nedostatak ovih hraniva na biljkama (šarenilo najstarijeg ili najmlađeg lista). Primenjuje se u količini od 1 kg za 20 ari.

\*\*\* **KSC VI (14:12:14)** se preporučuje samostalno ili u kombinaciji sa **KSC III** tokom perioda sa visokim temperaturama vazduha.

## VODOTOPIVA ĐUBRIVA I FOLIJARNA ISHRANA RASAĐENIH BILJAKA

Vreme primene	Način primene	Đubrivo	Količina đubriva	Primena
7 - 10 dana posle rastađivanja	Folijarno	<b>FERTIACTYL STARTER</b>	3 l/ha	<b>Jednom</b> (100 ml/10 l vode - leđna prskalica ili 3 l/330 l vode - traktorska prskalica)
10 - 15 dana posle rastađivanja	Kap po kap	<b>KSC I</b> (14:40:5)	150 - 250 g/ar	<b>Jednom</b>
Vegetativni porast	Kap po kap	<b>KSC II (23:5:5)</b> ili <b>KSC XX (19:20:20)</b>	250 - 300 g/ar	<b>Jednom</b>
		<b>KSC SULFACID *</b>	25 ml/ar	<b>Jednom do dva puta - po potrebi i više puta</b> (zemljište ili voda pH >6,5)
		<b>KSC VII PERLA</b> (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	<b>Svakih 10 - 15 dana</b> (odvojeno od ostalih đubriva)
Početak cvetanja i formiranje prvih plodova	Folijarno	<b>FERTILEADER ELITE</b>	3 l/ha	<b>Svakih 15 dana do kraja berbe</b> (100 ml/10 l vode - leđna prskalica ili 3 l/330 l vode - traktorska prskalica)
Razvoj plodova – do početka promene boje ploda	Kap po kap	<b>KSC III</b> (15:5:35)	250 - 300 g/ar	<b>Nedeljno</b>
		<b>KSC VI ***</b> (14:12:14)		
		<b>KSC MIX **</b> (15% MgO + mikroelementi)	50 g/ar	<b>Jednom do tri puta tokom vegetacije</b> (odvojeno od ostalih đubriva)
		<b>KSC VII PERLA</b> (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	<b>Svakih 10 - 15 dana</b> (odvojeno od ostalih đubriva)
Od početka promene boje ploda do kraja berbe	Kap po kap	<b>KSC V</b> (8:16:42)	400 - 500 g/ar	<b>Nedeljno</b>
		<b>KSC VII PERLA</b> (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	<b>Svakih 10 - 15 dana</b> (odvojeno od ostalih đubriva)