



PLAN ĐUBRENJA JAGODE

Navedeni planovi đubrenja su informativnog karaktera. Za detaljne informacije o količinama, načinu i vremenu primene đubriva, molimo vas da se obratite stručnoj službi Timac Agro Balkans.



PLAN ĐUBRENJA JAGODE

OSNOVNO ĐUBRENJE

- EUROFERTIL 67 N-Process (14:7:16) ili EUROFERTIL TOP 51 (4:10:20)**
5 - 7 kg/ar
- PHYSIOMAX (76% CaCO₃ + 3 MgO)**
3 - 4 kg/ar (startna obezbeđenost kalcijumom i magnezijumom, smanjuje kiselost zemljišta)
- SULFAMMO 30 N-process** 2 - 3 kg/ar
Azotna prihrana - pre cvetanja gde nije postavljena folija u redove ili pre postavljanja malč folije
Startno đubrenje - istovremeno sa đubrivom EUROFERTIL TOP i PHYSIOMAX

PROIZVODNJA RASADA (živića)

- FERTIACTYL STARTER**
0,3 - 0,5% (30 - 50 ml/10 l vode) folijarno u fazi tri do četiri prava lista
- FERTIACTYL STARTER**
0,5% - rastvoriti 1 l FERTIACTYL STARTER-a u 200 l vode i potopiti živiće, kontejnere ili čase pred rasađivanje - vrlo uspešan način primene

FOLIJARNA PRIHRANA BILJAKA NA POLJU

- FERTIACTYL STARTER**
0,6% - 1% (60 - 100 ml/10 l vode) nakon rasađivanja i posle prijema biljaka (**jači koren i cvetanje**)
- FERTILEADER GOLD**
0,5 - 0,6% (50 - 60 ml/10 l vode) početak cvetanja ili **1 l na 30 ari** kroz sistem kap po kap (**bolja oplodnja i zamatanje plodova**)
- FERTILEADER ELITE**
0,6 - 1% (60 - 100 ml/10 l vode) od početka cvetanja na svakih 15 dana do kraja berbe (**čvrstoća i sjaj ploda**)
- FERTILEADER VITAL**
0,4 - 0,6% (40 - 60 ml/10 l vode) jednom do dva puta u toku vegetacije (**vitalnost, oporavak i regeneracija biljaka**)



KSC Sulfacid



VODOTOPIVA ĐUBRIVA

Vreme primene	Način primene	Đubrivo	Količina	Primena	Količina KSC-a preko lista (folijarno)
7 - 10 dana posle rasađivanja (ili početak vegetacije kod zasnovanih zasada)	Kap po kap	KSC I (14:40:5)	150 - 200 g/ar	Jednom do dva puta	KSC I 0,3% (30 g/10 l vode)
15 - 20 dana posle rasađivanja (ili početak vegetacije kod zasnovanih zasada)	Kap po kap	KSC II (23:5:5)	200 - 300 g/ar	Jednom	KSC I 0,3 - 0,5% (30 - 50 g/10 l vode)
Vegetativni porast	Kap po kap	KSC XX (19:20:20)	300 g/ar	Jednom do dva puta	KSC II + KSC III 0,3 - 0,5% (30 - 50 g/10 l vode)
		KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	Jednom (odvojeno od ostalih đubriva)	
Zametnuti plodovi - prva polovina berbe	Kap po kap	KSC III (15:5:35)	300 g/ar	Nedeljno	KSC III 0,5% (50 g/10 l vode)
		KSC VI ** (14:12:14)			
		KSC MIX * (15% MgO + mikroelementi)	50 g/ar	Jednom do tri puta tokom vegetacije (odvojeno od ostalih đubriva) *	
		KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	Nedeljno (odvojeno od ostalih đubriva)	
Druga polovina berbe - do kraja berbe (Ubrzano zrenje)	Kap po kap	KSC III (15:5:35) ili KSC V (8:16:42)	300 - 400 g/ar	Nedeljno	KSC V 0,5% (50 g/10 l vode)
		KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	Nedeljno (odvojeno od ostalih đubriva)	

NAPOMENA

***KSC MIX** - Korektor nedostatka magnezijuma i mikroelemenata. Primenjuje se preventivno dva do tri puta u toku vegetacije ili kada se primeti nedostatak ovih hraniva na biljkama (šarenilo najstarijeg ili najmlađeg lista). Primenjuje se u količini od 1 kg za 20 ari.

KSC SULFACID - Korektor visoke pH vrednosti zemljišta i vode za zalivanje (pH > 6,5). Pomaže bolje usvajanje azota, fosfora i drugih hraniva iz zemljišta i dodaje se rastvoru vodotopivih đubriva u količini od 1 litar za 40 ari.

**** KSC VI (14:12:14) se preporučuje samostalno ili u kombinaciji sa KSC III tokom perioda sa visokim temperaturama vazduha.**