



## PLAN ĐUBRENJA KRSTAVACA

Navedeni planovi đubrenja su informativnog karaktera. Za detaljne informacije o količinama, načinu i vremenu primene đubriva, molimo Vas da se obratite stručnoj službi Timac Agro Balkans.



# PLAN ĐUBRENJA KRASTAVACA (SALATARA I KORNIŠONA)

## OSNOVNO ĐUBRENJE

- **EUROFERTIL 67 N-Process (14:7:16) ili EUROFERTIL TOP 51 (4:10:20)**  
6 - 10 kg/ar
- **PHYSIOMAX (76% CaCO<sub>3</sub> + 3 MgO)**  
3 - 4 kg/ar (startna obezbeđenost kalcijumom i magnezijumom)
- **SULFAMMO 30 N-process**  
2 - 3 kg/ar gde nije postavljena folija u redove (azotna prihrana – posle zemetanja prvih plodova) ili 8 kg Eurofertil TOP + 3 kg Physiomax + 2 kg Sulfammo po aru, startno pred sadnju



## PROIZVODNJA RASADA

- **FERTIACTYL STARTER**  
0,3% - 0,5% (0,3 – 0,5 l/100 l vode) u fazi tri prava lista folijarno ili
- **FERTIACTYL STARTER**  
0,5% - rastvoriti 1 l FERTIACTYL STARTER-a u 200 l vode i potopiti kontejnere ili čaše pred rasađivanje - vrlo uspešan način primene

## FOLIJARNA PRIHRANA POSAĐENIH BILJAKA U PLASTENIKU ILI OTVORENOM POLJU

- **FERTIACTYL STARTER**  
0,3% - 0,5% (0,3 – 0,5 l/100 l vode) 5 - 7 dana posle rasađivanja
- **FERTILEADER ELITE**  
1% (1 l/100 l vode) posle formiranja prvih plodova na svakih 14 dana do kraja berbe
- **FERTILEADER GOLD**  
0,3% - 0,5% (0,3 – 0,5 l/100 l vode) jednom do dva puta u toku vegetacije ili 1 l na 30 ari kroz sistem kap po kap (bolja oplodnja i bolje zemetanje ploda)
- **FERTILEADER VITAL**  
0,4% - 0,6% (0,4 - 0,6 l/100 l vode) jednom do dva puta u toku vegetacije (regeneracija i brži porast)



## VODOTOPIVA ĐUBRIVA

| Vreme primene                                                  | Način primene | Đubrivo                               | Količina         | Primena                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Odmah po rasađivanju (prvo zalivanje)                          | Kap po kap    | FERTIACTYL STARTER                    | 150 ml/ar        | Jednom                                                                    |
| 10 – 15 dana posle rasađivanja                                 | Kap po kap    | KSC I (14:40:5)                       | 200 - 250 g/ar   | Jednom                                                                    |
| Vegetativni porast                                             | Kap po kap    | KSC II (23:5:5) ili KSC XX (19:20:20) | 250 g/ar         | Jednom                                                                    |
|                                                                |               | KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)       | 150 g/ar         | Jednom do dva puta (odvojeno od ostalih đubriva - od početka cvetanja)    |
| Formiranje prvih plodova                                       | Kap po kap    | KSC III (15:5:35)                     | 300 g/ar         | Jednom do dva puta                                                        |
|                                                                |               | KSC MIX * (15% MgO + mikroelementi)   | 50 g/ar          | Jednom do tri puta tokom vegetacije                                       |
|                                                                |               | KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)       | 150 g/ar         | Jednom (odvojeno od ostalih đubriva)                                      |
| Intenzivan porast i puna berba plodova (do 2 m visine biljaka) | Kap po kap    | KSC III (15:5:35)                     | 700 - 1.000 g/ar | Nedeljno (100 - 150 gr/ar svakog dana)                                    |
|                                                                |               | KSC VI *** (14:12:14)                 |                  |                                                                           |
|                                                                |               | KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)       | 150 g/ar         | Jednom nedeljno (odvojeno od ostalih đubriva)                             |
| Puna berba plodova (preko 2 m visine)                          | Kap po kap    | KSC V (8:16:42) + KSC II (23:5:5)     | 1.000 + 500 g/ar | Nedeljno (150 - 200 gr/ar svakog dana)                                    |
|                                                                |               | KSC Sulfacid **                       | 25 ml/ar         | Jednom do dva puta - po potrebi i više puta (zemljište ili voda pH > 6,5) |
|                                                                |               | KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)       | 150 - 200 g/ar   | Jednom nedeljno (odvojeno od ostalih đubriva)                             |

## NAPOMENA

\* **KSC MIX** - Korektor nedostatka magnezijuma i mikroelemenata. Primenjuje se preventivno dva do tri puta u toku vegetacije ili kada se primeti nedostatak ovih hraniva na biljkama (šarenilo najstarijeg ili najmlađeg lista). Primenjuje se u količini od 1 kg za 20 ari.

\*\* **KSC SULFACID** - Korektor visoke pH vrednosti zemljišta i vode za zalivanje (pH > 6,5). Pomaže bolje usvajanje azota, fosfor i drugih hraniva iz zemljišta i dodaje se rastvoru vodotopivih đubriva u količini od 1 litar za 40 ari.

\*\*\* **KSC VI (14:12:14)** se preporučuje samostalno ili u kombinaciji sa KSC III tokom perioda sa visokim temperaturama vazduha.