



PLAN ĐUBRENJA LUBENICA I DINJA

Navedeni planovi đubrenja su informativnog karaktera. Za detaljne informacije o količinama, načinu i vremenu primene đubriva, molimo Vas da se obratite stručnoj službi Timac Agro Balkans.



PLAN ĐUBRENJA LUBENICA I DINJA



OSNOVNO ĐUBRENJE

- **EUROFERTIL 67 N-Process (14:7:16) ili EUROFERTIL TOP 51 (4:10:20)**
5 - 7 kg/ar
- **PHYSIOMAX (76% CaCO₃ + 3 MgO)**
3 - 4 kg/ar (startna obezbeđenost kalcijumom i magnezijumom)
- **SULFAMMO 30 N-process**
2 - 3 kg/ar (azotna prihrana - primena na početku cvetanja)

PROIZVODNJA RASADA

- **FERTIACYL STARTER**
0,3 % (0,3 l/100 l vode) u fazi tri do četiri prava lista folijarno ili
- **FERTIACYL STARTER**
0,5% - rastvoriti 1 l FERTIACYL STARTER-a u 200 l vode i potopiti kontejnere ili čaše pred rasađivanje - vrlo uspešan način primene

FOLIJARNA PRIHRANA RASAĐENIH BILJAKA

- **FERTIACYL STARTER**
0,6% - 1% (0,6 - 1 l/100 l vode) 10 - 15 dana posle rasađivanja
- **FERTILEADER ELITE**
1% (1 l/100 l vode) nakon zamatanja prvih plodova - svakih 14 dana (čvrstoća i sjaj ploda)
- **FERTILEADER GOLD**
0,4% - 0,6% (0,4 - 0,6 l/100 l vode) jednom na početku cvetanja (bolja oplodnja i bolje zatanje plodova)
- **FERTILEADER VITAL**
0,4% - 0,6% (0,4 - 0,6 l/100 l vode) jednom do dva puta u toku vegetacije (oporavak i regeneracija biljaka)

VODOTOPIVA ĐUBRIVA

Vreme primene	Način primene	Đubrivo	Količina	Primena
5 - 7 dana posle rasađivanja	Kap po kap	KSC I (14:40:5)	150 - 200 g/ar	Jednom do dva puta
15 - 20 dana posle rasađivanja - do cvetanja	Kap po kap	KSC II (23:5:5)	250 g/ar	Jednom
Vegetativni porast	Kap po kap	KSC II (23:5:5) ili KSC XX (19:20:20)	250 g/ar	Jednom do dva puta
		KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	Jednom (odvojeno od ostalih đubriva)
Formiranje prvih plodova	Kap po kap	KSC III (15:5:35)	300 g/ar	Jednom
		KSC MIX * (15% MgO + mikroelementi)	50 g/ar	Jednom do tri puta tokom vegetacije (odvojeno od ostalih đubriva)
		KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	Jednom (odvojeno od ostalih đubriva)
Porast plodova	Kap po kap	KSC III (15:5:35)	350 - 450 g/ar	Nedeljno
		KSC VI ** (14:12:14)		
		KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	200 g/ar	Nedeljno (odvojeno od ostalih đubriva)
Plod 2/3 veličine do kraja berbe	Kap po kap	KSC V (8:16:42)	400 - 500 g/ar	Nedeljno
		KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	200 - 250 g/ar	Nedeljno (odvojeno od ostalih đubriva)

NAPOMENA

* **KSC MIX** - Korektor nedostatka magnezijuma i mikroelemenata. Primenjuje se preventivno dva do tri puta u toku vegetacije ili kada se primeti nedostatak ovih hraniva na biljkama (šarenilo najstarijeg ili najmlađeg lista). Primenjuje se u količini od 1 kg za 20 ari.

** **KSC VI** (14:12:14) se preporučuje samostalno ili u kombinaciji sa **KSC III** tokom perioda sa visokim temperaturama vazduha.