



Navedeni planovi đubrenja su informativnog karaktera. Za detaljne informacije o količinama, načinu i vremenu primene đubriva, molimo vas da se obratite stručnoj službi Timac Agro Balkans.



Timac Agro Balkans d.o.o. • Temerinska 76, 21000 Novi Sad, Srbija • Tel/fax: 021 47 27 020

[www.timacagro.rs](http://www.timacagro.rs)  Timac Agro Balkans • [www.roullier.com](http://www.roullier.com)

# PLAN ĐUBRENJA MALINE I KUPINE



# PLAN ĐUBRENJA MALINE I KUPINE



## OSNOVNO ĐUBRENJE

### Jesenja primena

- **EUROFERTIL TOP 51 (4:10:20)**  
6 - 8 kg/ar

### Primena u rano proleće

- **EUROFERTIL 67 N-Process (14:7:16)**  
6 - 8 kg/ar
- **PHYSIOMAX (76% CaCO<sub>3</sub> + 3 MgO)**  
3 - 4 kg/ar (startna obezbeđenost kalcijumom i magnezijumom)
- **SULFAMMO 30 N-process**  
2 - 3 kg/ar (azotna prihrana, primena na početku vegetacije)

KGC **Sulfacid**



## FOLIJARNA PRIHRANA BILJAKA

- **FERTILEADER STARTER**  
**0,6 - 1%** (60 – 100 ml/10 l vode) nakon rasađivanja sadnica (zalivanje) ili preko lista na početku vegetacije (zasadi u rodu)
- **FERTILEADER STARTER**  
**0,6 - 1%** (60 – 100 ml/10 l vode) 10 do 15 dana posle prvog tretmana
- **FERTILEADER GOLD**  
**0,5 - 0,6%** (50 – 60 ml/10 l vode) početak cvetanja ili **1 l na 30 ari** kroz sistem kap po kap (**bolja oplodnja i zametanje plodova**)
- **FERTILEADER ELITE**  
**0,8 - 1%** (80 – 100 ml/10 l vode) posle zametanja prvih plodova na svakih 14 dana do kraja berbe (0,8 – 1 l / 100 l vode) - (**čvrstoća i sjaj ploda**)
- **FERTILEADER VITAL**  
**0,4 - 0,6%** (40 – 60 ml/10 l vode) jednom do dva puta u toku vegetacije (**bolji rast i vitalnost biljaka**)





## VODOTOPIVA ĐUBRIVA

Vreme primene	Način primene	Đubrivo	Količina	Primena
Početak vegetacije	Kap po kap	<b>KSC I</b> (14:40:5)	150 - 200 g/ar	<b>Jednom</b>
Posle 15 – 20 dana	Kap po kap	<b>KSC II</b> (23:5:5)	200 - 300 g/ar	<b>Jednom</b>
Vegetativni porast	Kap po kap	<b>KSC XX</b> (19:20:20)	300 g/ar	<b>Jednom do dva puta</b>
		<b>KSC MIX *</b> (15% MgO + mikroelementi)	50 g/ar	<b>Jednom do tri puta tokom vegetacije</b> (odvojeno od ostalih đubriva)*
		<b>KSC VII PERLA</b> (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	<b>Jednom</b> (odvojeno od ostalih đubriva)
Porast plodova (prva polovina berbe)	Kap po kap	<b>KSC III</b> (15:5:35)	400 - 600 g/ar	<b>Nedeljno</b>
		<b>KSC VII PERLA</b> (15:0:9 + 20 CaO)	150 - 200 g/ar	<b>Jednom u 10 - 15 dana</b> (odvojeno od ostalih đubriva)
Zrenje plodova (druga polovina berbe)	Kap po kap	<b>KSC III</b> (15:5:35) ili <b>KSC V</b> (8:16:42)	400 - 600 g/ar	<b>Nedeljno</b> (dva puta po 200 - 300 gr/ar)
		<b>KSC VII PERLA</b> (15:0:9 + 20 CaO)	150 - 200 g/ar	<b>Jednom u 10 - 15 dana</b> (odvojeno od ostalih đubriva)

### NAPOMENA

**\*NOVO - KSC MIX** - Korektor nedostatka magnezijuma i mikroelemenata. Primenjuje se preventivno dva do tri puta u toku vegetacije ili kada se primeti nedostatak ovih hraniva na biljkama (šarenilo najstarijeg ili najmlađeg lista). Primenjuje se u količini od 1 kg za 20 ari.

**NOVO - KSC SULFACID** - Korektor visoke pH vrednosti zemljišta i vode za zalivanje (pH > 6,5). Pomaže bolje usvajanje azota, fosfora i drugih hraniva iz zemljišta i dodaje se rastvoru vodotopivih đubriva u količini od 1 litar za 40 ari.