



PLAN ĐUBRENJA PARADAJZA

Navedeni planovi đubrenja su informativnog karaktera. Za detaljne informacije o količinama, načinu i vremenu primene đubriva, molimo Vas da se obratite stručnoj službi Timac Agro Balkans.



PLAN ĐUBRENJA PARADAJZA

OSNOVNO ĐUBRENJE

- EUROFERTIL 67 N-Process (14:7:16) ili
EUROFERTIL TOP 51 (4:10:20)**
6 - 10 kg/ar
- PHYSIOMAX (76% CaCO₃ + 3 MgO)**
3-4 kg/ar (startna obezbeđenost biljaka kalcijumom i magnezijumom)
- SULFAMMO 30 N-process**
2 - 3 kg/ar gde nije postavljena folija u redove (azotna prihrana - posle zametanja prvih plodova) ili 8 kg Eurofertil TOP + 3 kg Physiomax + 2 kg Sulfammo po aru, startno pred sadnjom



sulfacid



PROIZVODNJA RASADA

- FERTIACTYL STARTER**
0,3% - 0,5% (30 - 50 ml/10 litara vode) u fazi četiri prava lista folijarno ili
- FERTIACTYL STARTER**
0,5% - rastvoriti 1 l FERTIACTYL STRARTER-a u 200 l vode i potopiti kontejnere ili čaše pred rasađivanje - vrlo uspešan način primene



FOLIJARNA PRIHRANA

- FERTIACTYL STARTER**
0,3% - 0,5% (30 -50 ml/10 l vode) nakon rasađivanja, posle prijema biljaka
- FERTIACTYL STARTER**
0,5% - 0,6% (50 - 60 ml/10 l vode) 10 do 15 dana posle prvog tretmana
- FERTILEADER GOLD**
0,5% - 0,6% (50 - 60 ml/10 l vode) početak cvetanja - **bolja oplodnja i zametanje plodova** (ili 1 l na 30 ar na kroz sistem kap po kap)
- FERTILEADER ELITE**
0,6% - 1% (60 - 100 ml/10 l vode) posle formiranja prvih plodova na svakih 14 dana do kraja berbe - **čvrstoća i sjaj ploda** (ili 0,6 – 1 l/100 l vode)
- FERTILEADER VITAL**
0,4% - 0,6% (40 - 60 ml/10 l vode) jednom do dva puta u toku vegetacije - **oporavak i regeneracija biljaka**



VODOTOPIVA ĐUBRIVA

Vreme primene	Način primene	Đubrivo	Količina đubriva	Primena
7 - 10 dana posle rasađivanja	Kap po kap	KSC I (14:40:5)	150 - 200 g/ar	Jednom do dva puta
15 - 20 dana posle rasađivanja	Kap po kap	KSC II (23:5:5)	200 - 300 g/ar	Jednom
		KSC XX (19:20:20)	300 g/ar	Jednom do dva puta
Vegetativni porast i zametanje plodova	Kap po kap	KSC SULFACID **	25 ml/ar	Jednom do dva puta - po potrebi i više puta (zemljište ili voda pH > 6,5)
		KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	Po potrebi (odvojeno od ostalih đubriva)
		KSC III (15:5:35)	400 - 600 g/ar	Nedeljno (dva puta po 300 g/ar)
		KSC VI *** (14:12:14)		
Nalivanje i zrenje plodova	Kap po kap	KSC MIX * (15% MgO + mikroelementi)	50 g/ar	Jednom do tri puta tokom vegetacije (odvojeno od ostalih đubriva)
		KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	150 - 200 g/ar	Jednom u 10 - 15 dana (odvojeno od ostalih đubriva)
		KSC V (8:16:42)	600 - 800 g/ar	Nedeljno (dva puta po 300 - 400 g/ar)
Berba plodova	Kap po kap	KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	150 - 200 g/ar	Jednom u 10 - 15 dana (odvojeno od ostalih đubriva)

NAPOMENA

* **KSC MIX** - Korektor nedostatka magnezijuma i mikroelemenata. Primjenjuje se preventivno dva do tri puta u toku vegetacije ili kada se primeti nedostatak ovih hraniva na biljkama (šarenilo najstarijeg ili najmlađeg lista). Primjenjuje se u količini od 1 kg za 20 ar.

** **KSC SULFACID** - Korektor visoke pH vrednosti zemljišta i vode za zalivanje (pH > 6,5). Pomaže bolje usvajanje azota, fosfora i drugih hraniva iz zemljišta i dodaje se rastvoru vodotopivih đubriva u količini od 1 litar za 40 ar.

*** **KSC VI** (14:12:14) se preporučuje samostalno ili u kombinaciji sa **KSC III** tokom perioda sa visokim temperaturama vazduha.