



## PLAN ĐUBRENJA PAPRIKE (ZELENE, BELE, LJUTE)

Navedeni planovi đubrenja su informativnog karaktera. Za detaljne informacije o količinama, načinu i vremenu primene đubriva, molimo Vas da se obratite stručnoj službi Timac Agro Balkans.



# PLAN ĐUBRENJA PAPRIKE (ZELENE, BELE, LJUTE)

## OSNOVNO ĐUBRENJE

- **EUROFERTIL 67 N-Process (14:7:16) ili EUROFERTIL TOP 51 (4:10:20)**  
6 - 10 kg/ar
- **PHYSIOMAX (76% CaCO<sub>3</sub> + 3 MgO)**  
3 - 4 kg/ar (startna obezbeđenost biljaka kalcijumom i magnezijumom)
- **SULFAMMO 30 N-process**  
2 - 3 kg/ar gde nije postavljena folija u redove (azotna prihrana - posle zametanja prvih plodova) ili 8 kg Eurofertil TOP + 3 kg Physiomas + 2 kg Sulfammo po aru, startno pred sadnju



**Sulfacid**



## PROIZVODNJA RASADA

- **FERTIACTYL STARTER**  
0,3% - 0,5% (0,3 - 0,5 l/100 litara vode) u fazi četiri prava lista folijarno ili
- **FERTIACTYL STARTER**  
0,5% (1 l/200 l vode) pet do sedam dana pred rasađivanje, način primene: zalivanjem rasada rastvorom FERTIACTYL STARTER-a ili potopiti kontejnere ili čaše pred rasađivanje (vrlo uspešan način primene)



## FOLIJARNA PRIHRANA

- **FERTIACTYL STARTER**  
0,5% (1 l/200 litara vode) 10 - 15 dana posle rasađivanja
- **FERTILEADER ELITE**  
1% (1 l/100 l vode), nakon formiranja prvih plodova na svakih 14 dana (čvrstoća, sjaj i pravilan oblik ploda)
- **FERTILEADER GOLD**  
0,3% - 0,5% (0,3 - 0,5 l/100 l vode) jednom do dva puta u toku vegetacije (bolja oplodnja i bolje zametanje ploda)
- **FERTILEADER VITAL**  
0,4% - 0,6% (0,4 - 0,6 l/100 l vode) jednom do dva puta u toku vegetacije (oporavak i regeneracija biljaka)



## VODOTOPIVA ĐUBRIVA

Vreme primene	Način primene	Đubrivo	Količina đubriva	Primena
7 - 10 dana posle rasađivanja	Kap po kap	FERTIACTYL STARTER	150 ml/ar	Jednom
10 - 15 dana posle rasađivanja	Kap po kap	KSC I (14:40:5)	250 g/ar	Jednom
Vegetativni porast	Kap po kap	KSC II (23:5:5)	250 - 300 g/ar	Više puta po potrebi
Formiranje prvih plodova	Kap po kap	KSC MIX * (15% MgO + mikroelementi)	50 g/ar	Jednom do tri puta tokom vegetacije (odvojeno od ostalih đubriva)
		KSC XX (19:20:20)	250 - 300 g/ar	Više puta po potrebi
		KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	Svakih 10 - 15 dana (odvojeno od ostalih đubriva)
Od početka do kraja berbe	Kap po kap	KSC III (15:5:35)	600 g/ar	Nedeljno (dva puta po 300 g/ar)
		KSC VI *** (14:12:14)		
		KSC SULFACID **	25 ml/ar	Jednom do dva puta po potrebi i više puta (zemljište ili voda pH > 6,5)
		KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	Svakih 10 - 15 dana (odvojeno od ostalih đubriva)

## NAPOMENA

\* **KSC MIX** - Korektor nedostatka magnezijuma i mikroelemenata. Primenjuje se preventivno dva do tri puta u toku vegetacije ili kada se primeti nedostatak ovih hraniva na biljkama (šarenilo najstarijeg ili najmlađeg lista). Primenjuje se u količini od 1 kg za 20 ar.

\*\* **KSC SULFACID** - Korektor visoke pH vrednosti zemljišta i vode za zalivanje (pH > 6,5). Pomaže bolje usvajanje azota, fosfora i drugih hraniva iz zemljišta i dodaje se rastvoru vodotopivih đubriva u količini od 1 litar za 40 ar.

\*\*\* **KSC VI (14:12:14)** se preporučuje samostalno ili u kombinaciji sa KSC III tokom perioda sa visokim temperaturama vazduha.