

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE
ORALNO CIJEPLJENJE LISICA U GRADU ZAGREBU
13.-16. LIPNJA 2014. GODINE

- priopćenje-

**NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, ORALNO CIJEPLJENJA
LISICA PROVODIT ĆE SE OD 13.-16. LIPNJA**

PUTEM HELIKOPTERA, KAKO BI SE OSIGURALO BOLJE POKRIVANJE
GUSTO NASELJENIH PODRUČJA, NA KOJIMA JE PRIMIJEĆENA
PRISUTNOST LISICA



Slika 3.- Vakcinalni mamac i pvc kapsula sa cjepivom

Mjere sigurnosti pri rukovanju s mamcima

Mamce koji se pronađu u prirodi ne smije se dirati niti micati! U slučaju da se mamac zatekne u dvorištu obiteljske kuće ili na javnoj površini (npr. igralište), može se ukloniti u najbliži grm van dvorišta ili rub šume, samo ukoliko se može izbjegći izravan dodir kože sa mamcem. Prilikom rukovanja s mamcima obvezno je nošenje zaštitnih rukavica. Neoštećeni mamac nije opasan za zdravlje ljudi, ali miris mamača može se prenijeti na kožu i smetati ljudima.

Ukoliko je vanjski omot mamača oštećen i tekućina (cjepivo) vidljiva, mamač više nije djelotvoran, te se takav mamač, obavezno noseći zaštitne rukavice, može odložiti u nepropusnu vrećicu i odnijeti najbližem veterinaru kako bi se mamač pravilno uklonio.

U slučaju dodirivanja omota mamača, treba dobro oprati ruke vodom i sapunom, a ukoliko je sadržaj mamača (tekućina cjepiva) došao u dodir sa kožom ili sluznicama potrebno se odmah obratiti liječniku.

U slučaju ugriza ili ogrebotine od psa, mačke, lisice ili neke druge divlje životinje postoji RIZIK za infekciju s virusom BJESNOĆE. U takvim slučajevima nužno je odmah temeljito OPRATI RANU s puno sapuna i tekuće vode te se što prije javiti LIJEČNIKU ili najbližoj antirabičnoj jedinici kako bi se pravovremeno poduzele sve potrebne mјere.

Pozivamo građane,

da u dane provođenja vakcinacije u Gradu Zagrebu
(13.-16. lipnja 2014. godine i 30 dana nakon završetka cijepljenja)

pse i kućne ljubimce

drže pod nadzorom prilikom kretanja javnim površinama i parkovima kako bi se spriječio njihov kontakt sa cjepivom.