

# GRAH & GRAŠAK

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE

VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA	KARENCA
NAKON SJETVE, A PRIJE NICANJA	■ <b>AFALON DISPERZIJA</b> 1,35 l/ha (dozvoljeno samo u grašku)	jednogodišnje širokolisne korove te smanjuje zakorovljenost nekim jednogodišnjim travnim korovima	OVP
U FAZI RAZVOJA 1 - 3 TROLISKE KULTURE	■ <b>PULSAR 40 EC</b> 1,0 l/ha jednokratno ■ <b>PULSAR 40 EC</b> 1,2 l/ha u split aplikaciji (0,6+0,6 ili 0,7+0,5 ili 0,8+0,4 l/ha ovisno o poniku korova) iii	jednogodišnje i višegodišnje širokolisne i jednogodišnje uskolisne korove	63 dana
	■ <b>PULSAR 40 EC</b> 0,8 l/ha + ■ <b>BASAGRAN 480</b> 1,0 l/ha	jednogodišnje i višegodišnje širokolisne i jednogodišnje uskolisne korove	63 dana
U FAZI RAZVOJA 4. LISTA KULTURE (BBCH 14)	■ <b>BASAGRAN 480</b> 2,0 l/ha jednokratno iii ■ <b>BASAGRAN 480</b> 2,0 l/ha u split aplikaciji (1+1 l/ha uz dodatak okvašivača kod svake primjene) .	jednogodišnje širokolisne korove	OVP
U FAZI ZELENE MAHUNE	■ <b>AFALON DISPERZIJA</b> 0,8 l/ha (dozvoljeno samo u grahu)	jednogodišnje širokolisne korove te smanjuje zakorovljenost nekim jednogodišnjim travnim korovima	OVP
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO KOD OPASNOSTI OD POJAVE BOLESTI	■ <b>CHROMOSUL 80</b> 0,3 - 0,4% (30 - 40 g na 10 l vode)	pepelnicu	14 dana
	■ <b>SIGNUM</b> 1,0 kg/ha (dozvoljeno samo u grahu)	sivu plijesan, hrđu graha	21 dan
U VEGETACIJI, KOD POJAVE ŠTETNIKA	■ <b>BOXER 200 SL</b> 0,25 - 0,5 l/ha	graškovu zelenu uš, crnu bobovu uš	14 dana
	■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,3 l/ha	stakleničkog štitaštog moljca, duhanovog štitaštog moljca	7 dana za grah, 14 dana za grašak
	■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,15 l/ha	lisne uši, gusjenice sovice pozemljuša, sovice	
	■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,125 l/ha	prugaste pipe mahunarke	
	■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,1 l/ha	crnog graškovo savijača	
U FAZI 95 PREMA BBCH SKALI (kada je grašak suh)	■ <b>DIQUA</b> 2 - 3 l/ha (dozvoljeno samo u grašku)	desikacija graška	10 dana
7 DANA PRIJE ŽETVE (kada je sadržaj vlage u zrnu manji od 30%)	■ <b>HERKULES SUPER</b> 3 - 4 l/ha (dozvoljeno samo u grašku)	predžetveno suzbijanje korova u grašku za kombajniranje	7 dana



## NAPOMENA:

Sredstvo AFALON DISPERZIJA tretirati u grahu isključivo kada je u fazi zelene mahune.  
Sredstvo Boxer 200 SL tretirati isključivo nakon cvatnje.

■ Herbicidi ■ Fungicidi ■ Insekticidi








OVDJE ČUVAM JA



# KRUMPIR

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE

VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA
<b>PRIJE SADNJE</b> (tretiranjem cijele površine uz obavezno unošenje u tlo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>DURSBAN G-7,5</b> 50-60 kg/ha tretiranjem cijele površine ili 15-20 kg/ha tretiranjem u redove</li> <li>■ <b>DURSBAN E-48</b> 6-8 l/ha širom ili 2-3 l/ha u redove</li> </ul>	štetnike u tlu
<b>NAKON SADNJE, PRIJE NICANJA KRUMPIRA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>TOR 70 WG</b> 0,75 - 1,5 kg/ha</li> <li>■ <b>AFALON DISPERZIJA</b> 1,35 l/ha</li> </ul>	sjemenske jednogodišnje širokolisne i uskolisne korove jednogodišnje širokolisne korove i smanjuje zakorovljenost nekim jednogodišnjim travnim korovima
<b>NAKON NICANJA</b> (kada je krumpir visine 10-15 cm, a korovi imaju 2 lista) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>TOR 70 WG</b> 0,5-0,75 kg/ha <b>iii</b></li> <li>■ <b>BASAGRAN 480</b> 2 l/ha (u split aplikaciji)</li> </ul>	sjemenske jednogodišnje širokolisne i uskolisne korove sjemenske jednogodišnje širokolisne korove i smanjuje zakorovljenost nekim višegodišnjim širokolisnim korovima
<b>PRIJE POJAVE BOLESTI</b> (dok je cima još mala) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>CUPRABLAU Z</b> 3-4 kg/ha <b>iii</b></li> <li>■ <b>POLYRAM DF</b> 1,8 kg/ha <b>iii</b></li> <li>■ <b>STAR 80 WP</b> 2-2,5 kg/ha <b>iii</b></li> <li>■ <b>ELECTIS WG</b> 1,8-2 kg/ha</li> </ul>	plamenjaču krumpira
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>SIGNUM</b> 0,25 kg/ha</li> </ul>	koncentričnu pjegavost lista
<b>KOD POJAVE KRUMPIROVE ZLATICE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,15 l/ha <b>iii</b></li> <li>■ <b>BOXER 200 SL</b> 0,25-0,5 l/ha <b>iii</b></li> <li>■ <b>ALVERDE</b> 0,2-0,25 l/ha <b>iii</b></li> <li>■ <b>LASER</b> 0,1-0,15 l/ha <b>iii</b></li> <li>■ <b>CHROMOREL D</b> 0,6 l/ha</li> </ul>	krumpirovu zlaticu (CHROMOREL D se može primjenjivati na području gdje je utvrđena otpornost krumpirove zlatice)
<b>U VEGETACIJI, KOD POJAVE ŠTETNIKA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>TEPPEKI 500 WG</b> 0,16 kg/ha</li> </ul>	lisne uši kao vektore virusa
<b>ZRIOBA GOMOLJA</b> (faza 91 prema BBCH skali) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>DIQUA</b> 4 l/ha</li> </ul>	desikacija cime krumpira



## NAPOMENA:

Sredstvo DURSBAN G-7,5 se smije primjenjivati u krumpiru najkasnije do 01.07.2014.

Sredstvo TOR 70 WG se smije primjenjivati u krumpiru najkasnije do 01.01.2015.

■ Herbicidi ■ Fungicidi ■ Insekticidi




OVDJE ČUVAM JA



# KUPUSNJAČE

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE

VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA
<b>ZAŠTITA U KLIJALIŠTU</b>		
<b>OD NICANJA DO PRESADIVANJA RASADA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>POLYRAM DF</b> 0,20%</li> </ul>	plamenjaču, bolesti polijeganja
<b>PRIJE PRESADIVANJA</b> (potapanjem kontejnera 15 min)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>BOXER 200 SL</b> 0,1% (100 ml na 100 l vode)</li> </ul>	kupusnu muhu
<b>U VEGETACIJI,</b> <b>KOD POJAVE PUŽEVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>PUŽOMOR</b> 3-5 g/m<sup>2</sup></li> </ul>	suzbija sve vrste puževa

<b>ZAŠTITA U POLJU</b>		
<b>PRIJE PRESADIVANJA</b> (10-14 dana)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>OXALIS</b> 4-6 l/ha</li> </ul>	jednogodišnje širokolisne i uskolisne korove
<b>PRIJE PRESADIVANJA</b> (unijeti ravnomjerno u tlo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>DURSBAN G-7,5</b> 50-60 kg/ha tretiranjem cijele površine ili 15-20 kg/ha tretiranjem u redove</li> <li>■ <b>DURSBAN E-48</b> 6-8 l/ha širom ili 2-3 l/ha u redove</li> </ul>	štetnike u tlu
<b>8 - 10 DANA NAKON PRESADIVANJA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>BUTISAN S</b> 2-2,5 l/ha</li> </ul>	uskolisne i neke širokolisne korove
<b>U VEGETACIJI, PREVENTIVNO ILI KOD POJAVE PRVIH SIMPTOMA BOLESTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>SIGNALM</b> 1 kg/ha</li> </ul>	pjegavost i prstenastu pjegavost
<b>U VEGETACIJI, KOD POJAVE ŠTETNIKA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,3 l/ha</li> </ul>	stakleničkog štitastog moljca, duhanovog štitastog moljca
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,15 l/ha</li> </ul>	lisne uši, gusjenice sovicca pozemljuša, sovicca
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,075 l/ha <b>iii</b></li> <li>■ <b>CHROMOREL D</b> 0,6 l/ha</li> </ul>	kupusnog buhača
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,1 l/ha <b>iii</b></li> <li>■ <b>ALVERDE</b> 1 l/ha</li> </ul>	kupusnog moljca
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,1 l/ha <b>iii</b></li> <li>■ <b>RELDAN 40 EC</b> 1,25 l/ha <b>iii</b></li> <li>■ <b>CHROMOREL D</b> 0,5 l/ha <b>iii</b></li> <li>■ <b>ALVERDE</b> 1 l/ha</li> </ul>	kupusnog bijelca, malog kupusara
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>CHROMGOR 40</b> 1 l/ha</li> </ul>	kupusne muhe, lisne uši



## NAPOMENA:

Sredstvo RELDAN 40 EC se smije primjenjivati u kupusnjačama najkasnije do 01.07.2014.  
Sredstvo CHROMGOR 40 se smije primjenjivati u kupusnjačama najkasnije do 01.01.2015.

■ Herbicidi

■ Fungicidi

■ Insekticidi

■ Limacidi





OVDJE ČUVAM JA



# LUK iz sjemena

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE

VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA
PRIJE SJETVE	■ <b>OXALIS</b> 4 - 6 l/ha	jednogodišnje širokolisne i uskolinne korove
PRIJE SJETVE (uz obavezno unošenje u tlo)	■ <b>DURSBAN G - 7,5</b> 50 - 60 kg/ha tretiranjem cijele površine ili 15 - 20 kg/ha tretiranjem u redove ■ <b>DURSBAN E - 48</b> 6 - 8 l/ha širom ili 2 - 3 l/ha u redove	štetnike u tlu
 KAD LUK DOBIJE PRVE LISTOVE I VOŠTANU PREVLAKU	■ <b>STARANE 250 EC</b> 0,5 l/ha (dvokratna primjena)	širokolisne korove
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO ILI KOD POJAVE PRVIH SIMPTOMA BOLESTI	■ <b>SIGNUM</b> 0,75 - 1,0 kg/ha	sivu plijesan, pepelnicu
 POJAVA ŠTETNIKA	■ <b>LASER</b> 0,12 - 0,2 l/ha	kalifornijskog tripsa, duhanovog tripsa, lukovog moljca, sovice
	■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,15 l/ha	lisne uši, gusjenice sovice pozemljuša i sovice



## NAPOMENA:

Sredstvo DURSBAN G-7,5 se smije primjenjivati u luku najkasnije do 01.07.2014.  
POLYRAM DF se može primjenjivati u vlasцу na otvorenom u količini 1,2 kg/ha




■ Herbicidi   ■ Fungicidi   ■ Insekticidi



OVDJE ČUVAM JA

# MRKVA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE

VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA
<b>PRIJE SJETVE</b> (uz obavezno unošenje u tlo)	■ <b>DURBAN G-7,5</b> 50 - 60 kg/ha tretiranjem cijele površine ili 15 - 20 kg/ha tretiranjem u redove ■ <b>DURBAN E-48</b> 6 - 8 l/ha širom ili 2 - 3 l/ha u redove	štetnike u tlu
<b>NAKON SJETVE,</b> <b>PRIJE NICANJA</b> 	■ <b>AFALON DISPERZIJA</b> 1,35 l/ha	jednogodišnje širokolisne korove i smanjuje zakorovljenost nekim jednogodišnjim travnim korovima
<b>SPLIT APLIKACIJA U FAZI</b> <b>3 - 4 LISTA MRKVE</b> 	■ <b>AFALON DISPERZIJA</b> 0,675 l/ha prije nicanja + ■ <b>AFALON DISPERZIJA</b> 0,675 l/ha kada mrkva razvije 3 - 4 lista	jednogodišnje širokolisne korove i smanjuje zakorovljenost nekim jednogodišnjim travnim korovima
<b>KOD POJAVE PRVIH</b> <b>SIMPTOMA BOLESTI</b> 	■ <b>SIGNUM</b> 0,75 - 1,0 kg/ha	palež lista i pepelnicu



## NAPOMENA:

Sredstvo DURBAN G-7,5 se smije primjenjivati u mrkvi najkasnije do 01.07.2014.  
AFALON DISPERZIJA se može primjenjivati u peršinu i pastrnjaku u količini 1,35 l/ha.  
POLYRAM DF se može primjenjivati u peršinu i celeru korijenašu u količini 1,8 kg/ha.

■ Herbicidi ■ Fungicidi ■ Insekticidi



OVDJE ČUVAM JA

# PAPRIKA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE

VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA	KARENCA
OD NICANJA DO PRESADIVANJA RASADA	■ <b>TREPAK 607 SL</b> 0,25% (25 ml sredstva u 10 l vode) zalijevanjem rasada u količini 4 litre 0,25%-tne otopine na m <sup>2</sup> ili zalijevanjem rasadih paprika sa 0,2 litre 0,25%-tne otopine po biljci. Ne smije se koristiti u proizvodnji ljutih papričica i ranih sorata paprika kratke vegetacije.	bolesti polijeganja rasada	35 dana
	■ <b>POLYRAM DF</b> 0,2 g/m <sup>2</sup> u 40 - 60 ml vode/m <sup>2</sup>	polijeganje rasada i plamenjaču	
PRIJE PRESADIVANJA (10-14 dana)	■ <b>OXALIS</b> 4 - 6 l/ha	jednogodišnje širokolisne i uskolisne korove	OVP
PRIJE PRESADIVANJA ILI SJETVE	■ <b>DURSBAN G-7,5</b> 50 - 60 kg/ha primjenom po cijeloj površini ili 15 - 20 kg/ha primjenom u redove. ■ <b>DURSBAN E-48</b> 6 - 8 l/ha širom ili 2 - 3 l/ha u trake. Obavezno unošenje u tlo.	štetnike u tlu (žičnjake, grčice hrušta, rovce, sovice)	42 dana
	a.t. <b>pendimetalin</b> 4 - 5 l/ha	jednogodišnje travne i neke širokolisne korove	63 dana
U VEGETACIJI, KOD POJAVE PUŽEVA	■ <b>PUŽOMOR</b> 3 - 5 g/m <sup>2</sup>	sve vrste puževa	14 dana
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO	■ <b>CHROMOSUL 80</b> 0,3 - 0,4% (30 - 40 g u 10 l vode)	pepelnicu	14 dana
	■ <b>STROBY WG</b> 0,02 - 0,05% (20 - 50 g na 100 litara vode)	pepelnicu	3 dana
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO ILI KOD POJAVE PRVIH SIMPTOMA BOLESTI	■ <b>SIGNUM</b> 0,1 - 0,15% (10 - 15 g na 10 l vode)	pepelnicu, sivu plijesan	7 dana za sorte slatke paprike, 21 dan za ljute sorte paprike
	■ <b>TREPAK 607 SL</b> zalijevanjem sa 0,2 litre 0,25%-tne otopine po biljci. Ne smije se koristiti u proizvodnji ljutih papričica i ranih sorata paprika kratke vegetacije.	gangrena na paprici	35 dana
U VEGETACIJI, KOD POJAVE ŠTETNIKA	■ <b>LASER</b> 0,03 - 0,05% uz dva tretiranja u razmaku 3 - 4 dana.	lisnog minera, kukuruznog moljca, kalifornijskog tripsa	7 dana
	■ <b>ALVERDE</b> 1 l/ha	južnoameričkog moljca rajčice ( <i>Tuta absoluta</i> ), žutu kukuruznu sovicu, kukuruznog moljca, sovice	3 dana
	■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,3 l/ha	stakleničkog štitastog moljca, duhanovog štitastog moljca	7 dana
	■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,15 l/ha	lisnih uši, lisnih sovicu, gusjenica sovicu pozemljuša	7 dana



## NAPOMENA:

Sredstvo DURSBAN G-7,5 se smije primjenjivati u paprici najkasnije do 01.07.2014.

■ Herbicidi

■ Fungicidi

■ Insekticidi

■ Limacidi



OVDJE ČUVAM JA



# RAJČICA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE

VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA	KARENCA
OD NICANJA DO PRESADIVANJA RASADA (do stadija 2 prava lista)	■ <b>POLYRAM DF</b> 0,2 g/m <sup>2</sup> u 40 - 60 ml vode/m <sup>2</sup>	polijeganje rasada i plamenjaču	
PRIJE PRESADIVANJA (10-14 dana)	■ <b>OXALIS</b> 4 - 6 l/ha	jednogodišnje širokolisne i uskolisne korove	OVP
PRIJE PRESADIVANJA ILI SJETVE	■ <b>DURSBAN G-7,5</b> 50-60 kg/ha primjenom po cijeloj površini ili 15-20 kg/ha primjenom u redove. ■ <b>DURSBAN E-48</b> 6-8 l/ha širom ili 2-3 l/ha u trake. Obavezno unošenje u tlo.	štetnike u tlu (žičnjake, grčice hrušta, rovce, sovice)	42 dana
	a.t. <b>pendimetalin</b> 4-5 l/ha	jednogodišnje travne i neke širokolisne korove	49 dana
8 - 10 DANA NAKON PRESADIVANJA	■ <b>TOR 70 WG</b> 750 g/ha. Obavezno prskati pod list rajčice. Nije dozvoljena primjena u proizvodnji rajčice iz sjemena zbog fitotoksičnosti.	sjemenske jednogodišnje širokolisne i uskolisne korove	42 dana
U VEGETACIJI, KOD POJAVE PUŽEVA	■ <b>PUŽOMOR</b> 3-5 g/m <sup>2</sup>	sve vrste puževa	14 dana
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO	■ <b>CUPRABLAU Z</b> 0,3-0,4% (30-40 g u 10 l vode)	plamenjaču i pjegavost lista	14 dana
	■ <b>STAR 80 WP</b> 2,0-2,5 kg/ha (20-25g na 100 m <sup>2</sup> )	plamenjaču i crnu pjegavost	14 dana
	■ <b>CHROMOSUL 80</b> 0,3-0,4% (30-40 g u 10 l vode)	pepelnicu	14 dana
	■ <b>POLYRAM DF</b> 2,0 kg/ha (200 g sredstva u 60-80 l vode na 1.000 m <sup>2</sup> )	plamenjaču	14 dana
	■ <b>STROBY WG</b> 0,02-0,05% (20-50 g na 100 litara vode)	pepelnicu	3 dana
	■ <b>ELECTIS WG</b> 1,5-1,8 kg/ha (150-180 g sredstva na 1.000 m <sup>2</sup> )	plamenjaču i koncentričnu pjegavost	7 dana
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO ILI KOD POJAVE PRVIH SIMPTOMA BOLESTI	■ <b>SIGNUM</b> 0,1-0,15% (10-15 g na 10 l vode)	pepelnicu, sivu plijesan, baršunastu plijesan	3 dana
	■ <b>STROBY WG</b> 0,02-0,05% (20-50 g na 100 litara vode)	pepelnicu	3 dana
U VEGETACIJI, KOD POJAVE ŠTETNIKA	■ <b>LASER</b> 0,03-0,05% uz dva tretiranja u razmaku 3-4 dana.	lisnog minera	3 dana
	■ <b>TEPPEKI 500 WG</b> 0,10-0,12 kg/ha	zelenu breskvinu uš i pamukovu lisnu uš	3 dana
	■ <b>ALVERDE</b> 1 l/ha	južnoameričkog moljca rajčice ( <i>Tuta absoluta</i> ), žutu kukuruznu sovicu, sovice	3 dana
	■ <b>BOXER 200 SL</b> 0,1% (10 ml na 10 l vode).	odrasli stadij cvjetnog štitastog moljca	14 dana
	■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,3 l/ha	stakleničkog štitastog moljca, duhanovog štitastog moljca	7 dana
	■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,15 l/ha	lisnih uši, lisnih sovicu, gusjenica sovicu pozemljuša	7 dana
	■ <b>CHROMOREL - D</b> 0,6 l/ha	gusjenice sovicu na listu i plodu, krumpirovu zlaticu	5 dana



## NAPOMENA:

Sredstvo DURSBAN G-7,5 se smije primjenjivati u rajčici najkasnije do 01.07.2014.

Sredstvo TOR 70 WG se smije primjenjivati u rajčici najkasnije do 01.01.2015.

Sredstvo TEPPEKI 500 WG se još može primjenjivati u krastavcu, krastavcu za preradu-kornišon, tikvici, tikvi, dinji i lubenici (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) u količini od 0,10 kg/ha.

■ Herbicidi

■ Fungicidi

■ Insekticidi

■ Limacidi



OVDJE ČUVAM JA



# SALATA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE

VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA	KARENCA
OD NICANJA DO PRESADIVANJA RASADA (do stadija 2 prava lista)	■ <b>POLYRAM DF</b> 0,2 g/m <sup>2</sup> u 40 - 60 ml vode/m <sup>2</sup>	polijeganje rasada i plamenjaču	OVP
PRIJE PRESADIVANJA	a.t. <b>pendimetalin</b> 4 - 5 l/ha	jednogodišnje travne i neke širokolisne korove	63 dana
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO KOD OPASNOSTI OD POJAVE BOLESTI	■ <b>POLYRAM DF</b> 1,2 kg/ha	plamenjaču	21 dan
	■ <b>CHROMOSUL 80</b> 0,25 - 0,3 % (25 - 30 g u 10 l vode)	pepelnicu	14 dana
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO ILI KOD POJAVE PRVIH SIMPTOMA BOLESTI	■ <b>SIGNUM</b> 1 kg/ha	bijelu trulež i sivu plijesan	14 dana
	■ <b>CUPRABLAU Z</b> 0,25 - 0,3 % (25 - 30 g u 10 l vode)	plamenjaču	14 dana
U VEGETACIJI, KOD POJAVE ŠTETNIKA	■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,15 l/ha	lisnih uši, lisnih sovice, gusjenica sovice pozemljuša	7 dana
	■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,3 l/ha	stakleničkog štitastog moljca, duhanovog štitastog moljca	7 dana
	■ <b>ALVERDE</b> 1 l/ha	sovicu ipsilon, sovice	3 dana

■ Herbicidi

■ Fungicidi

■ Insekticidi

■ Limacidi



OVDJE ČUVAM JA