



# STRNE ŽITARICE

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE



VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA
NAKON SJETVE, PRIJE NICANJA 	■ <b>STOMP AQUA</b> 2,5 - 3,0 l/ha	jednogodišnje uskolisne korove i smanjuje zakoravljenost jednogodišnjim širokolisnim korovima
OD POČETKA DO KRAJA BUSANJA 	■ <b>DEHERBANA EXTRA</b> 1 - 1,2 l/ha	širokolisne korove
OD STADIJA PUNOG BUSANJA DO POJAVE DRUGOG KOLJENCA 	■ <b>LOGO 300</b> 0,3 l/ha ■ <b>BASAGRAN 480</b> 2 l/ha U ranim sortama pšenice, ječma i raži BASAGRAN 480 ne smije se primijeniti u količini većoj od 1,5 l/ha.	širokolisne korove jednogodišnje širokolisne korove
OD POJAVE 3 LISTA DO POJAVE ZASTAVICE 	■ <b>STARANE 250 EC</b> 0,6 - 0,8 l/ha u ozimoj pšenici i ječmu, 0,4 - 0,8 l/ha u jaroj pšenici i ječmu. Za proširenje spektra može se primijeniti: ■ <b>STARANE 250 EC</b> 0,6 l/ha + ■ <b>LOGO 300</b> 0,3 l/ha ■ <b>VEGA</b> 1 - 1,5 l/ha <b>ili</b> ■ <b>ACCURATE 200 WG</b> 30 g/ha	širokolisne korove jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove
OD ZAVRŠETKA VLATANJA DO CVATNJE 	■ <b>BUMPER 25 EC</b> 0,5 l/ha ■ <b>DUETT ULTRA</b> 0,4 - 0,6 l/ha	bolesti lista i stabljike
OD POČETKA KLASANJA DO POČETKA CVATNJE 	■ <b>DUETT ULTRA</b> 0,4 - 0,6 l/ha	bolesti lista i klasa
U VRIJEME POJAVE ŠTETNIKA 	■ <b>CHROMOREL - D</b> 0,5 l/ha <b>ili</b> ■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,15 l/ha ■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,12 l/ha  ■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,125 l/ha	lisne uši žitnog balca  lisne uši kao vektore virusa, zobene lisne uši, ružine lisne uši



## NAPOMENA:

- prskanje zobi provodi se s istim herbicidima kao i ječma i pšenice, ali s 20% umanjenim količinama
- količina vode za primjenu kreće se od 200-400 l/ha, a za prskanje kontaktnim herbicidima 400-600 l/ha
- prskanje ječma u jesen kreće od pojave 3. lista

■ Herbicidi

■ Fungicidi

■ Insekticidi