

SALATA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE

VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA	KARENCA
OD NICANJA DO PRESADIVANJA RASADA (do stadija 2 prava lista)	■ POLYRAM DF 0,2 g/m ² u 40 – 60 ml vode/m ²	polijeganje rasada i plamenjaču	OVP
PRIJE PRESADIVANJA (uz obavezno unošenje u tlo)	■ STOMP AQUA 2,5 – 3,0 l/ha	jednogodišnje uskolisne korove i smanjuje zakorovljenost jednogodišnjim širokolisnim korovima	OVP
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO KOD OPASNOSTI OD POJAVE BOLESTI	■ POLYRAM DF 1,2 kg/ha	plamenjaču	21 dan
	■ CHROMOSUL 80 0,25 – 0,3 % (25 – 30 g u 10 l vode)	pepelnicu	14 dana
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO ILI KOD POJAVE PRVIH SIMPTOMA BOLESTI	■ SIGNUM 1 kg/ha	bijelu trulež i sivu plijesan	14 dana
	■ AVI WG 2,5 – 3,7 kg/ha	plamenjaču	14 dana
U VEGETACIJI, KOD POJAVE ŠTETNIKA	■ FASTAC 10 EC 0,15 l/ha	lisnih uši, lisnih sovice, gusjenica sovice pozemljuša	7 dana
	■ FASTAC 10 EC 0,3 l/ha	stakleničkog štitastog moljca, duhanovog štitastog moljca	7 dana
	■ ROTOR SUPER 250 – 500 ml/ha uz utrošak vode 500 – 1000 l/ha 300 – 500 ml/ha uz utrošak vode 500 – 1000 l/ha	žutu kukuruznu sovicu karadrinu, sovice, salatinu lisnu uš lisne uši (<i>Aphis</i> spp.) lisnu uš (<i>Hyperomyzus lactucae</i>) sovice pozemljuše	3 dana