



Knowledge grows

YaraVita™

nova generacija folijarnih gnojiva za vrhunske prinose



YaraVita™ gnojiva posebno formulirana za folijarnu primjenu, koja zadovoljavaju specifične potrebe pojedinih usjeva, a sadržavaju kombinaciju hranjivih elemenata.



YaraVita™ Zeatrel

Proizvod za folijarno tretiranje kukuruza.
Doza primjene: 3-5 l/ha.
Vrijeme primjene: 1-2 tretmana u fazi 4-8 listova, s pesticidima ili bez njih.



YaraVita™ Gramitrel

Proizvod za folijarno tretiranje strnih žita: pšenica, ječam, tritikale zob i raž.
Doza primjene: 2-4 l/ha.
Vrijeme primjene: u jesen biljke s tri lista, jedno tretiranje pesticidima. U proljeće do klasanja.



YaraVita™ Brassitrel

Proizvod za folijarno tretiranje uljane repice, suncokreta, soje, povrtnarskih kupusnjača.
Doza primjene: 3-5 l/ha.
Vrijeme primjene: u jesen nakon nicanja uljane repice, a u proljeće od početka vegetacije do pred cvjetanje usjeva. Na suncokretu nakon nicanja do butonizacije. Na soji od faze prvog para pravih listova (jednostavni listovi) te tijekom intenzivnog rasta i cvjetanja. Na kupusnjačama od sadnje do kraja formiranja glavnica ili cvasti.



YaraVita™ Frutrel

Posebna formula s visokim sadržajem više elemenata za primjenu na nasadima voća i vinove loze, povrću, intenzivnim kulturama.
Doza: 3-5 l/ha od početka vegetacije, tijekom cvjetanja sve dok se ne razviju plodovi.



YaraVita Solatrel

YaraVita Solatrel je gnojivo iz palete Yara "Folijarni fosfor". YaraVita Solatrel je uravnotežena kombinacija fosfora i drugih esencijalnih hranjiva za primjenu na krumpiru. P je ključni element za folijarnu aplikaciju u krumpiru i vrlo je učinkovit za povećanje broja i veličine gomolja.
Aplikacija: 5 lit/ha u više navrata



YaraVita™ Thiotrac

Folijarni proizvod koji sadržava dušik i sumpor nužne za poboljšanje kvalitete uroda strnih žita, kukuruza i na usjevima osjetljivim na manjak sumpora-S.
Doza: 3-5 l/ha



YaraVita Universal Bio

YaraVita Universal Bio je visokokvalitetna tekuća otopina koja sadrži uravnoteženu kombinaciju esencijalnih hranjiva i ekstrakt alge Ascophyllum nodosum, koja je bogat izvor citokinina, auksina i giberelina dizajnirana za primjenu u većini uzgajanih kultura.
Aplikacija: 3-5 l/ha, ponoviti po potrebi



Kemijski sastav izražen u g/l

Posebno razvijena složena gnojiva	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	CaO	MgO	SO ₃	B	Cu	Mn	Zn	Mo
YaraVita™ Thiotrac	200					300					
YaraVita™ Gramitrel	61				250			50	150	80	
YaraVita™ Zeatrel		440	75		67					46	
YaraVita Universal Bio	100	40	70				0,2	1	1,3	0,7	0,03
YaraVita Brassitrel Pro	69			125	118		60		70		4
YaraVita Frutrel	69	240		280	100		20			40	
YaraVita Solatrel		440	75		67				10	5	

Kemijski sastav izražen u g/l

Gnojiva sa sadržajem jednog hranjivog elementa	CaO	MgO	B	Cu	Mn	Zn
YaraVita™ Stopit	160					
YaraVita™ Magtrac		500				
YaraVita™ Bortrac			150			
YaraVita™ Coptrac				500		
YaraVita™ Mantrac					500	
YaraVita™ Zintrac						700

YaraVita™ folijarna gnojiva koja sadržavaju jedan hranjivi element:



YaraVita™ Stopit

Preporučena upotreba: na voću i povrću da se spriječi nedostatak kalcija-Ca.
Doza: 5 l/ha. Vrijeme primjene: od početka vegetacije ili na kraju cvjetanja do početka intenzivnoga rasta plodova. Koristiti od 3 do 6 puta, ovisno o potrebama usjeva za kalcijem i o količini kalcija u tlu.



YaraVita™ Bortrac

Proizvod za folijarnu ishranu biljaka Borom koristi se na voću, povrću, lozi, ratarskim kulturama, šećernoj repi i uljanoj repici te na drugim usjevima osjetljivim na manjak bora-B.
Doza: 1-2 l/ha u početku vegetacije do cvjetanja, a na višegodišnjim nasadima i poslije berbe.



YaraVita™ Mantrac

Preporučena upotreba: za krumpir, strna žita, voće i druge usjeve osjetljive na nedostatak mangana-Mn.
Doza: 1 l/ha u fazi intenzivnog rasta, u višegodišnjim kulturama nakon berbe, a prije padanja lišća.



YaraVita™ Magtrac

Preporučena upotreba: za sve usjeve koji postaju osjetljivi na manjak magnezija-Mg.
Doza: 4 l/ha.



YaraVita™ Coptrac

Preporučena upotreba: za strna žita, voće i povrće za poboljšanje oplodnje, kao i na drugim usjevima osjetljivim na manjak bakra-Cu.
Doza: 0,25-0,5 l/ha u vegetaciji do 1 l/ha nakon berbe u višegodišnjim nasadima



YaraVita™ Zintrac

Preporučena upotreba: za kulture kukuruza, voće, vinovu lozu, povrće i usjeve osjetljive na manjak cinka-Zn.
Doza: 0,5-1 l/ha.

Stručni savjeti:

stevan.mesarovic@yara.com
tatjana.uljanic@yara.com
suzana.hajvaz@yara.com